







2020 2021 REVUE BIBLIOGRAPHIQUE DES THÈSES EN MÉDECINE SOUTENUES À L'UNIVERSITÉ DE LA RÉUNION Cet ouvrage est strictement réservé au corps médical. Les informations, idées, conseils et autres éléments figurant dans les articles n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs et en aucun cas celle des sociétés dont les produits sont évoqués. Malgré la rigueur de la conception, il se peut que des erreurs se soient glissées. Les auteurs et l'éditeur déclinent toute responsabilité quant aux conséquences qui pourraient en résulter.

Les résumés contenus dans ce volume ont été soumis, par leurs auteurs, en tant que travaux originaux, au comité des thèses de l'université de La Réunion.

#### Comité Scientifique :

Doyen UFR Santé : Pr Bérénice Doray (PU-PH) Vice-doyen formation : Pr Winer Arnaud (PA-PH)

Vice-doyen recherche: Dr Meilhac Olivier (Dir. de recherche INSERM UMR DéTROI U1188)

Directeur département universitaire de médecine spécialisée : Dr Couret David (PH)

Directeur département universitaire de médecine générale : Pr Jean Marc Franco (PU-MG) Responsable de la gestion de l'encadrement des thèses : Dr Leruste Sébastien (MCU-MG)

**Coordinateurs de la revue des thèses :** Dr Florian LEGRAND (CCU-MG, Université de La Réunion) et Emeline DANDEU (SCD)

2

**Traitement documentaire :** Jérôme CHATELLARD (SCD)

# SOMMAIRE

ÉDECINE GÉNÉRALE17
Titre: Étude de l'exposition aux infections cutanées à streptococcus pyogenes chez les patients atteints de rhumatisme articulaire aigu en Nouvelle-Calédonie: étude cas témoins et épidémiologie descriptive dans la province des îles Loyauté. Auteur: Amic-Desvaud, Quentin (1992) Directeur de thèse: Ducrot, Yves-Marie
Titre: Exploration des besoins et des attentes des internes de médecine générale de l'Océan Indien en matière d'accompagnement à la gestion de leurs émotions en situations professionnelles. Auteur: André, Charlotte (1990) Directeur de thèse: Dugrosprez, Gaétan19
Titre : Données cliniques autour de la fièvre Q aiguë à La Réunion : étude de cohorte rétrospective. Auteur : Aubin, Alexandra (1990) Directeur de thèse : Bertolotti, Antoine
Titre: Les infections sexuellement transmissibles bactériennes à La Réunion: prévalence et facteur de risques des infections à Mycoplasma genitalium. Auteur: Begnis, Roxane (1990) Directeur de thèse: Bertolotti, Antoine
Titre: Diagnostic précoce de dengue: étude de la performance du TROD SD Bioline Dengue Duo sur l'île de la Réunion. Auteur: Belot, Jeanne (1991) Directeur de thèse: Adenis, Thibault22
Titre : Contrat Local de Santé, étude d'une co-construction autour de l'obésité infantile. Auteur : Bertrand, Océane (1990) Directeur de thèse : Palma, Vanessa Élodie23
Titre : Volume d'hydratation orale des patients atteints de dengue en médecine générale à La Réunion. Auteur : Besnard, Olivier (1989) Directeur de thèse : Leruste, Sébastien24
Titre: Le médecin généraliste face aux violences conjugales à La Réunion. Auteur: Blottiaux, Aurélie (1991) Directeurs de thèse: Djardem, Yasmina; Humbert, Patrice25
Titre : La médiation de pleine conscience dans la prise en charge des maladies chroniques somatiques en médecine générale. Auteur : Bouvier, Amélie (1988) Directeur de thèse :  Christen, Ludovic
Titre : Renoncements aux soins de premier recours des personnes en situation de précarité à La Réunion, quels leviers ? Auteur : Brunet, Sylvain (1990) Directeur de thèse : Robin, Léo27
Titre : Épidémiologie descriptive de la gale humaine au sein de la Province des Iles Loyauté de Nouvelle-Calédonie. Auteur : Bruno, Enzo (1990) Directeur de thèse : Ducrot, Yves-Marie28
Titre: Devenir à 1 et 3 mois suivant un passage aux urgences au CHU de la Réunion pour chute des patients âgés de plus de 65 ans autonomes vivant à domicile. Auteur: Bulatovich-Gamblin, Julie (1992) Directeur de thèse: De Oliveira, Maria-Fatima
Titre: Acceptabilité par les internes de médecine générale de l'Océan Indien d'un outil d'auto- formation en ligne (e-learning) proposé par l'Institut national du cancer (INCA) sur le dépistage des lésions précancéreuses et cancéreuses cutanées. Auteur: Cassam-Chenai, Chanaël (1991)

Titre : Exacerbations d'asthme à l'île de La Réunion : rôles des facteurs environnementaux. Auteur : Chane-Si-Ken, Nash (1990) Directeur de thèse : André, Michel
Titre: Caractéristiques épidémiologiques des patients atteints d'hépatite C sur le territoire ouest de l'île de La Réunion: cohorte de 412 patients diagnostiqués entre 1995 et 2016. Auteur: Chane-Teng, Thomas (1988) Directeur de thèse: Cuissard, Laurent
Titre : État des lieux des représentations parentales concernant les enfants de moins de 5 ans et les écrans à La Réunion. Auteur : Chapuis, Paul (1992) Directeur de thèse : Baleinier, Michel33
Titre: Connaissances, représentations et attentes des patients à propos des placebos impurs en médecine générale: approche qualitative. Auteur: Cheymol, Lucas (1989) Directeur de thèse: Reix, Grégory
Titre : L'accompagnement des femmes allaitantes en consultation de médecine générale par les internes formés à l'ile de La Réunion. Auteur : Comoz, Aurélie (1992) Directeur de thèse :  Godeluck-Gendre, Anaïs
Titre : Prévalence et facteurs associés aux infections à Treponema pallidum chez les patients consultant en centre de dépistage à La Réunion sur la période janvier 2017 à mars 2020. Auteur : Delfosse, Annabelle Directeur de thèse : Bertolotti, Antoine
Titre : Utilisation de la bibliothérapie en médecine générale. Enquête d'opinion auprès des généralistes de la Réunion. Auteur : Dusart, Clement (1989) Directeur de thèse : Riquel, Line37
Titre : Médecine de soins primaires à distance en milieu isolé : exemple du soutien médical des îles Éparses Juan de Nova et Europa. Auteur : Fauché, Marion (1992) Directeur de thèse : Dubourg, Olivier Joël Jean
Titre: Prévalence et facteurs de risque associés aux infections sexuellement transmissibles à Chlamydia trachomatis à La Réunion. Auteur: Folio, Marine (1990) Directeur de thèse:  Bertolotti, Antoine
Titre: Retour d'expérience des maîtres de stage des universités de la subdivision Océan Indien ayant accueilli un interne de phase socle en stage ambulatoire de niveau 1 depuis la réforme de 2017. Auteur: Fontanille, Etienne Directeur de thèse: Franco, Jean-Marc
Titre : Comment aborder la sexualité des patients en médecine générale ? Étude comparative de deux techniques d'approche. Auteur : Françoise, David (1987) Directeur de thèse : Gaillard, Patrick
Titre : Prévalence et étude des connaissances des infections sexuellement transmissibles en milieu carcéral à l'île de La Réunion. Auteur : Gorlin, Angélique (1988) Directeur de thèse : Moiton,  Marie-Pierre
Titre : Étude CalédoFaine : évaluation clinique du score de Faine chez les patients suspects de leptospirose au Centre Hospitalier de Nouvelle Calédonie, 2018-2019. Auteur : Guibreteau, Hélène (1992) Directeur de thèse : Klement, Élise
Titre: La promotion de l'activité physique en médecine générale: étude qualitative sur les représentations et les pratiques de médecins généralistes de l'île de La Réunion. Auteur: Huet, Marjorie (1993) Directeur de thèse: Simon, Hector
Titre: La transmission des savoirs traditionnels sur les plantes médicinales à La Réunion: étude qualitative réalisée auprès de personnes âgées en EHPAD. Auteur: K/bidy, Murielle (1989)  Directeur de thèse: Franco, Jean-Marc

Titre : Gestion de la privation de sommeil en ultra-trail : étude transversale des habitudes, stratégies et répercussions chez les coureurs du Grand Raid de La Réunion 2018. Auteur : Kishi, Anthony (1989) Directeur de thèse : Lemarchand, Bruno
Titre: La série télévisée "Chababi Project": un renouveau dans le domaine de la promotion de la santé à Mayotte? Auteur: Klee, Paul (1991) Directeur de thèse: Thomas, Valérie47
Titre: L'hyponatrémie: une pathologie de soins primaires? Auteur: Lacheray, Julien (1992)  Directeur de thèse: Marmion, Nicolas48
Titre : Étude descriptive de la maîtrise des médecins généralistes libéraux quant à la sécurité des données personnelles de santé de leurs patients, à l'Île de la Réunion en 2019. Auteur : Lavaud, Léo (1990) Directeur de thèse : Bohrer, Michel
Titre : Vécu des parents d'enfants en situation d'obésité suivis en unité d'obésité infantile de l'Hôpital d'Enfants à La Réunion. Auteur : Lebleu, Mary (1987) Directeur de thèse : Palma, Vanessa50
Titre : Le rôle du médecin généraliste dans la lutte contre la surexposition aux écrans des enfants. Auteur : Macé, Rosalie Directeur de thèse : Espitalier-Noël, Marie-Paule51
Titre: Les médecins généralistes face aux inégalités sociales de la santé: étude quantitative sur le recueil de la situation sociale des patients et les pratiques vis-à-vis des inégalités sociales de santé des médecins généralistes toulousains. Auteur: Mantoux, Mathilde (1989) Directeur de thèse: Chaaban, Samah
Titre : Perception de l'introduction de la vaccination contre le PVH en Polynésie française : enquête auprès des mères d'enfants en âge d'être vaccinés. Auteur : Marceau, Marius (1990) Directeur de thèse : Ségalin, Jean-Marc
Titre : Analyse des données des appels destinés au Centre-15 de Mayotte : profil des appels relevant de la médecine générale. Auteur : Mathelin, Camille (1992) Directeur de thèse : Rajon, Benjamin54
Titre: Prévalence des facteurs de risque d'hépatite C dans différentes populations de l'île de la Réunion et recours au dépistage. Auteur: Miller, Lucy (1986 Directeurs de thèse: Cuissard, Laurent; Gaillard, Patrick55
Titre : Spécificités de la consultation pré-voyage du sénior : étude descriptive au centre de vaccinations internationales du CHU de Bordeaux, 2013-2018. Auteur : Mivielle, Romain (1987) Directeur de thèse : Nguyen, Duc57
Titre : Les représentations des internes du DES de médecine générale de la subdivision Océan Indien vis-à-vis du choix de stage pratique à Mayotte. Auteur : Moustafaoui, Mustapha (1989) Directeur de thèse : Franco, Jean-Marc58
Titre : Connaissances des patients réunionnais sur les symptômes et la conduite à tenir en cas d'infarctus du myocarde. Auteur : Omarjee, Moustapha (1989) Directeur de thèse : Assamaly, Navchad59
Titre : La reconstruction endoscopique du ligament anatomique est une option fiable pour traiter l'instabilité chronique de la cheville latérale. Auteur : Ovigue, Jordan (1990) Directeur de thèse : Cordier, Guillaume60
Titre : Efficacité des outils de prévention primaire des violences sexuelles au cours des études supérieures : revue systématique de littérature. Auteur : Picard, Marine (1989) Directeur de

Titre : Implication et retentissement perçu du père et de la mère dans la prise en charge globale d'un enfant ou adolescent diabétique de type 1 âgé de moins de 18 ans à La Réunion. Auteur : Pougnet, Julie (1992) Directeur de thèse : Pigeon-Kherchiche, Patricia
Titre : Etude sur le vécu et les difficultés rencontrées par des personnes endeuillées par le suicide récent (moins de 3 mois) d'un proche à la Réunion. Auteur : Raison, Morgane (1989) Directeur de thèse : Gokalsing, Erick
Titre: Représentations des femmes nullipares à la Réunion sur la contraception par dispositif intra- utérin. Auteur: Roger, Marion (1992) Directeur de thèse: Thore, Emmanuelle65
Titre : Quel est le vécu des médecins généralistes quand il leur est demandé de remplir des documents socio-administratifs ? Auteur : Rouault, Sandra (1991) Directeur de thèse : Leruste, Sébastien
Titre : Prévalence et facteurs de risque des infections sexuellement transmissibles à gonoccoque la Réunion. Auteur : Saib, Amélie (1990) Directeur de thèse : Bertolotti, Antoine
Titre : Évaluation de la concordance entre la lecture de l'urgentiste et du radiologue pour les radiographies en traumatologie des membres aux urgences du CH de Saint Benoit. Auteur : Szwarc-Ronda, Antoine (1991) Directeur de thèse : Marchal, Christophe
Titre : Cartographie des maîtres de stage des universités dans la subdivision Océan Indien. Auteur : Tadjou, Sami (1990) Directeur de thèse : Domercq, Alain
Titre : Médecines alternatives et complémentaires et lombalgie commune, le point de vue des Internes de médecine générale (IMG) de La Réunion. Auteur : Verrière, Thomas (1990)  Directeur de thèse : Leruste, Sébastien
Titre: Caractéristiques cliniques et épidémiologiques des patients dépistés pour la COVID-19 au CHU de Saint-Pierre à l'île de La Réunion du 23 mars au 10 mai 2020. Auteur: Accot, Frédéric (1989) Directeurs de thèse: Andry, Fanny; Bertolotti, Antoine
Titre: Quels sont les représentations, motivations et freins face à la prévention solaire chez les parents d'élèves à La Réunion? Auteur: Ah-Mouck, Cassie (1993) Directeurs de thèse:  Bertolotti, Antoine; Leruste Sébastien
Titre : Dépistage des IST chez les patients âgés de 15 à 25 ans : pratiques des médecins généralistes à la Réunion. Auteur : Bade, Laurie (1988) Directeur de thèse : Gomard, Philippe.74
Titre : Freins et motivations des médecins généralistes réunionnais dans la prévention des troubles du spectre de l'alcoolisation fœtale. Auteur : Baelen, François (1990) Directeurs de thèse : Spodenkiewicz, Michel (1983) ; Leruste Sébastien
Titre: Les infiltrations à La Réunion: étude des pratiques professionnelles des médecins généralistes libéraux. Auteur: Baranger, Laura (1992) Directeur de thèse: Lemarchand, Bruno
Titre: Continuité des soins des réunionnais durant le premier confinement lors de la crise sanitaire de la Covid-19 du point de vue de la population de l'Ile de la Réunion. Auteur: Barjon, Clarisse (1991) Directeur de thèse: Legrand, Florian
Titre : Déterminants du choix des femmes enceintes concernant le professionnel auquel elles confient leur suivi de grossesse. Auteur : Bekka, Melissa (1991) Directeur de thèse : Plaisantin, Guillaume

Titre : Connaissances des médecins généralistes libéraux installés à La Réunion en 2020 sur le repérage et le signalement des enfants en danger. Auteur : Bellay, Florian (1991) Directeur de thèse : Abrial, Françoise	<b>7</b> 9
Titre : La visite de non-contre-indication à la pratique du trail en médecine générale : état des lieu des difficultés rencontrées par les médecins généralistes de l'île de La Réunion. Auteur : Brénot, Mélanie (1992) ; Collineau, Damien (1993) Directeur de thèse : Bouscaren, Nicolas	
Titre : Évaluation des connaissances et des besoins de formation en nutrition et conseils nutritionnels chez les étudiants en troisième cycle de médecine générale de la subdivision de l'Océan Indien en 2020. Auteur : Caussanel, Guillaume (1988) Directeur de thèse : Montée, Nicolas	81
Titre : Les attentes et les besoins des adolescents sur l'abord de leur éducation affective et sexuelle par leur médecin traitant généraliste. Auteur : Chatelain, Pauline (1993) Directeur de thèse : Ottenwaelder, Christophe	
Titre: Vécu d'un projet artistique de photographie par des patients d'une MSP à La Réunion.  Auteur: Chavot, Clémence (1993) Directeurs de thèse: Leruste, Sébastien; Cochet, Véronique	
Titre : Caractéristiques sociodémographiques et sanitaires des patients d'une permanence d'accè aux soins de santé (PASS) sur l'île de La Réunion. Auteur : Colliac-Chirié, Fanny (1993) Directeu de thèse : Arnoulx de Pirey Gravière, Sarah	es ur
Titre : La visite de non-contre-indication à la pratique du trail en médecine générale : élaboration par méthode Delphi, d'un guide de consultation et d'une fiche d'information patient. Auteur : Collineau, Damien (1993) ; Brénot, Mélanie (1992) Directeur de thèse : Bouscaren, Nicolas	
Titre : Le vécu des médecins généralistes en Isère lors de la première vague de l'épidémie de Covid-19. Auteur : Cuq, Hélène (1991) Directeur de thèse : Bruchon, Mélanie (1989)	86
Titre : Quel est le vécu des médecins généralistes à l'utilisation de la téléconsultation pendant la première vague de la crise Covid ? Auteur : Danjou, Julie (1992) Directeurs de thèse : Leruste, Sébastien ; Legrand, Florian	87
Titre : Comment les médecins généralistes font-ils pour repérer les troubles du spectre de l'alcoolisation foetale à La Réunion ? Auteur : Delfarguiel, Louise (1992) Directeurs de thèse : Leruste, Sébastien ; Spodenkiewicz, Michel	88
Titre : Les femmes accouchant sur l'île de Mayotte sont-elles vaccinées contre la coqueluche en 2020 : étude multicentrique. Auteur : Doucet, Benjamin (1991) Directeur de thèse : Dumez, Jessica	89
Titre : Expériences des professionnels de soins premiers sur l'accès à la santé des personnes sourdes signantes à La Réunion. Auteur : El-Maliki, Clémence (1992) Directeur de thèse : Franco, Jean-Marc	<b>9</b> 0
Titre : Prévalence et facteurs de risque des infections sexuellement transmissibles à gonocoque à La Réunion en médecine générale : étude transversale (PIST-MG). Auteur : Espinasse, Audrey (1991) Directeurs de thèse : Leruste, Sébastien ; Bertolotti, Antoine	
Titre : Vécu du confinement par les patients diabétiques type 2 à La Réunion. Auteur : Ethève, Stéphie (1989) Directeurs de thèse : Montée, Nicolas ; Nobecourt-Dupuy, Estelle	92

litre : Kreolite et medecine generale : representations et ressentis de la langue creole par les patients créolophones en consultation de médecine. Auteur : Fontaine, Gilles (1992) Directeur de thèse : Palma, Vanessa Élodie9
Titre : Troubles anxio-dépressifs à distance d'une épidémie de Chikungunya : étude exposé-non exposé ancillaire à la cohorte réunionnaise CHIKGene. Auteur : Fontaine, Jérémy (1991) Directeurs de thèse : Randrianjohany, Andry ; Gérardin, Patrick
Titre : Représentations du tiers payant généralisé par les médecins généralistes libéraux de La Réunion en 2020. Auteur : Françoise, Simon (1990) Directeur de thèse : Montée, Nicolas9
Titre : Enfants et écrans, qu'en savent les parents ? : étude observationnelle en soins premiers à l'île de La Réunion. Auteur : Gaillard, Céline (1994) Directeur de thèse : Gilli, Yvan9
Titre : Analyse descriptive rétrospective des soins primaires non programmés en milieu isolé : exemple du cirque de Mafate à la Réunion pour les années 2018 et 2019. Auteur : Garcia, Nicolas (1992) Directeur de thèse : Aubert, Cyrille9
Titre : Pratiques et obstacles à la photo-protection chez les ultra-traileurs du Grand Raid de La Réunion. Auteur : Goube, Charles (1989) Directeur de thèse : Dufour, David9
Titre : Expérimentation de la Supervision par observation directe avec enregistrement vidéo (SODEV) pour la formation à la communication en santé en médecine générale. Auteur : Guérin, Vincent (1991) Directeurs de thèse : Leruste, Sébastien ; Reix, Grégory9
Titre : Quel est le vécu du médecin généraliste de l'utilisation de la téléconsultation durant la première vague épidémique de la crise COVID-19 ? Auteur : Hassimaly, Daniss (1993) Directeur de thèse : Leruste, Sébastien ; Legrand, Florian10
Titre : La collaboration entre la médecine de ville et la santé mentale : étude de la satisfaction et des besoins des médecins généralistes de l'est de la Réunion concernant l'équipe de liaison enfants et adultes de psychiatrie de l'Est, ELEAPSE. Auteur : Hermann, Sébastien (1989)  Directeur de thèse : Appavoupoulle, François
Titre : Quelle pourrait être la consultation de prévention annuelle chez le patient de 16 à 25 ans er médecine générale ? Auteur : Hervé-Body, Clémence (1991) Directeur de thèse : Cheymol, Lucas10
Titre : L'accompagnement proposé par le médecin généraliste en matière d'allaitement maternel : l'île de la Réunion. Auteur : Hoarau, Marion (1992) Directeur de thèse : Plaisantin, Guillaume 10
Titre : Vécu des patients participants au programme d'éducation thérapeutique Reucare. Auteur : Jeanneau, Caroline (1993) Directeur de thèse : Palma, Vanessa Élodie10
Titre: La mise en place d'un protocole aux urgences du CHOR a-t-elle permis une amélioration de l'adaptation des antibiothérapies dans le respect des recommandations pour les patients consultant aux urgences pour une infection urinaire de traitement ambulatoire? Auteur: Jossomme Mouton, Albane (1992) Directeur de thèse: Girerd, Rémi
Titre : Élaboration, par la méthode Delphi, d'une méthode dépistage systématique des violences conjugales faites aux femmes à la Réunion. Auteur : Laruelle, Léa (1992) Directeur de thèse : Gomard, Philippe
Titre : L'abord du surpoids par les étudiants de troisième cycle en consultation de médecine générale à travers les portfolios. Auteur : Laurent, Mathilde (1991) Directeur de thèse : Reix,

Titre : Description clinique et biologique de la population pédiatrique atteinte de la dengue à La Réunion durant l'épidémie de 2019. Auteur : Legros, Mathilde (1991) Directeur de thèse : Ruin, Mahé
Titre : Quel modèle de prise en charge pour les femmes enceintes en situation de vulnérabilité sociale, en milieu urbain ? Auteur : M'Roivili, Zaïna (1989) Directeurs de thèse : Adam, Christophe ; Onaisi-Chanterel, Racha
Titre : Étude qualitative de l'expérience de la parentalité d'enfant à haut potentiel intellectuel avec des difficultés comportementales. Auteur : Manikom-Permal, Anne-Sophie (1993) Directeur de thèse : Spodenkiewicz, Michel110
Titre: Description du parcours de soins des patients hospitalisés pour une insuffisance cardiaque aiguë au CHU Felix-Guyon. Auteur: Marot, Jérémy (1993) Directeur de thèse: Corré, Jérôme François
Titre : Étude qualitative des représentations, freins et motivations face à la prévention solaire dans les écoles à La Réunion. Auteur : Marx, Mathilde (1992) Directeurs de thèse : Bertolotti,  Antoine ; Leruste, Sébastien
Titre : États des lieux de la supplémentation en vitamine D chez les enfants et adolescents par les médecins généralistes de l'île de La Réunion. Auteur : Michel, Blandine (1992) Directeur de thèse : Mars, Amaury
Titre : Besoins et attentes des femmes pratiquant la symptothermie vis-à-vis des professionnels de santé en France. Auteur : Moinard, Charline (1992) Directeur de thèse : Thore, Emmanuelle.115
Titre : Place du carnet de vaccination électronique MesVaccins.net dans la pratique des médecins généralistes et pédiatres libéraux à La Réunion. Auteur : Nedelec, Riwal (1990) Directeur de thèse : Manaquin, Rodolphe
Titre : Parcours de soins préhospitalier des patients hospitalisés pour AVC en 2018 au GHER de la Réunion. Auteur : Octobre, Cédric (1991) Directeur de thèse : Côme, Gérard
Titre: Expérimentation de la supervision par observation directe par enregistrement vidéo (SODEV) pour la formation à la communication en santé: étude qualitative auprès des internes de médecine générale à La Réunion. Auteur: Paris, Sarah (1991) Directeurs de thèse: Reix, Grégory; Leruste, Sébastien
Titre : Application des critères de qualité en régulation lors de la permanence des soins ambulatoires à La Réunion. Auteur : Peron, Frédéric (1992) Directeur de thèse : Humbert,  Patrice
Titre : Parcours de soins des personnes âgées consultant aux urgences de Saint-Benoît : étude d'une population évaluée par l'équipe mobile de gériatrie. Auteur : Prévost, Maëlig (1992)  Directeur de thèse : Randrianjohany, Andry
Titre : Prévalence et facteur de risque de la syphilis dans la population générale à La Réunion.  Auteur : Santucci, Cédric (1986) Directeurs de thèse : Bertolotti, Antoine ; Leruste, Sébastien
Titre : État des lieux des connaissances des internes de médecine générale de l'Océan Indien sur le diagnostic et la prise en charge des lésions cutanées mammaires. Auteur : Selle, Charlotte (1991) Directeurs de thèse : Sultan-Bichat, Nathalie ; Nguyen, Anne
Titre : Quels sont les freins et les limitations a la vaccination anti-papillomavirus, dans une population de collégiens ayant été sensibilisée par un programme de promotion de la santé

	sexuelle et de la vaccination ? Auteur : Sitthisone, Julien (1994) Directeur de thèse : Tran,  Phuong Lien
	Titre : Couverture vaccinale antigrippale des infirmiers libéraux de La Réunion. Auteur : Thomas, Anne-Margaux (1992) Directeur de thèse : Manaquin, Rodolphe
	Titre: Prise en charge par Colchicine d'enthésites résistantes aux traitements antalgiques: étude descriptive sur une cohorte de 31 patients. Auteur: Tuambilangana, Fabrice (1989) Directeur de thèse: Randrianjohany, Andry
	Titre : Épidémiologie de l'AVC à Mayotte : incidence, mortalité, caractéristiques et étiologies.  Auteur : Wolff, Améthyste (1990) Directeur de thèse : Angue, Marion
	Titre: Quels sont les représentations, motivations et freins face à la prévention scolaire chez les enfants à La Réunion? Auteur: Yap-Chim, Lindsay (1991) Directeurs de thèse: Leruste, Sébastien; Bertolotti, Antoine
A	NESTHÉSIE RÉANIMATION129
	Titre : ECMO veino veineuse et contusions pulmonaires. Auteur : Djemili, Fares (1990) Directeur de thèse : Vidal, Charles
	Titre : Exacerbation sévère d'asthme nécessitant la ventilation mécanique invasive à l'ère des techniques modernes de réanimation. Auteur : Binachon, Antoine (1984) Directeur de thèse : Persichini, Romain
	Titre : Détermination des facteurs de risque de développer un premier épisode de pneumonie acquise sous ventilation mécanique à stenotrophomonas maltophilia en soins critiques. Auteur : Canivet, Clémence (1992) Directeur de thèse : Puech, Bérénice
	Titre : Embolie gazeuse : épidémiologie au bloc opératoire et analyse des outils de diagnostic.  Auteur : Caro, Pierre (1993) Directeur de thèse : Bonnet, Corentin
	Titre: Comparaison du risque hémorragique sous ticagrelor et du clopidogrel en réanimation chez des patients présentant un syndrome coronarien aigu admis en réanimation. Auteur: Charpentier, Thibault (1990) Directeur de thèse: Allyn, Jérôme
	Titre : Effet de l'indice de masse corporelle sur le devenir en réanimation de patients traités par ECMO veino-artérielle pour choc cardiogénique. Auteur : Girard, Léandre (1990) Directeur de thèse : Vidal, Charles
	Titre : Évaluation de la réponse au remplissage par le doppler carotidien au bloc opératoire du CHU de la Réunion. Auteur : Roubertou, Roxane (1993) Directeur de thèse : Bonnet, Corentin136
В	BIOLOGIE MÉDICALE137
	Titre: Mise en place de la quantification de la mutation NPM1 de type a au CHU de La Réunion: évaluation du kit Ipsogen® NPM1 mutA mutaQuant. Auteur: Prairat, Pierre-Louis (1992)  Directeur de thèse: Mimoun, Aguirre
	Titre : Toxoplasmose maternelle et congénitale à Mayotte : épidémiologie et prise en charge.  Auteur : Kamus, Laure (1991) Directeur de thèse : Vauloup-Fellous, Christelle140
C	HIRURGIE GÉNÉRALE ET INFANTILE141
	Titre : La reconstruction endoscopique du ligament anatomique est une option fiable pour traiter l'instabilité chronique de la cheville latérale. Auteur : Ovigue, Jordan (1990) Directeur de thèse : Cordier, Guillaume

m	itre : Évaluation de la précision du système KneeAlign 2® dans le rétablissement de l'axe nécanique neutre du membre inférieur lors de la réalisation d'une prothèse totale de genou. Auteur : Younan, M'tanioss (1991) Directeur de thèse : Ballas, Richard (1981-)143
	itre : Stratégie analgésique dans la prise en charge des fractures du col du fémur traitées par Prothèses. Auteur : Chirez, Pierre (1989) Directeur de thèse : Felden, Arnaud
	ître : Injection intra-articulaire de moelle osseuse concentrée totale autologue chez des patients tteints de rhizarthrose. Auteur : Daoudi, Ismaël (1989) Directeur de thèse : Pelissier, Philippe
ď	itre : Chirurgie bariatrique en trois temps : anneau, sleeve puis bypass, résultats à moyen terme l'une cohorte rétrospective. Auteur : Dubus, Valentin (1991) Directeur de thèse : Kassir, Ladwan
Ti h	itre : Les complications vasculaires de la transplantation rénale : résultats sur 3 ans au centre- ospitalo-universitaire de La Réunion. Auteur : Mahjoubi, Lilia (1990) Directeur de thèse : Chantalin, Ilya147
р	itre : Étude rétrospective de deux groupes de patients appariés comparant la cystectomie totale our cancer de vessie par voie ouverte ou robot-assistée avec dérivation urinaire intra-corporelle. outeur : Ngo, Léa (1991) Directeur de thèse : Bladou, Franck
Ν	itre : Incidence et facteurs de risque de fistule anastomotique (FA) après Exérèse Totale du Mésorectum (TME) par coelioscopie pour adénocarcinome rectal : évaluation d'un score prédictif le fistule. Auteur : Pluchon, Alisson (1992) Directeur de thèse : Chaisemartin, Cécile de150
	itre : Reflux vésico-urétéral primaire chez l'enfant : évolution dans l'enfance du traitement onservateur. Auteur : Kassir, Rani (1989) Directeur de thèse : Michel, Jean-Luc152
EN	DOCRINOLOGIE DIABÉTOLOGIE NUTRITION153
d d	itre : Évaluation de l'impact de la variation du poids au cours du programme multidisciplinaire l'Education Thérapeutique du Patient en pré-Chirurgie Bariatrique sur l'efficacité et les bénéfices le la chirurgie à 1 an post-opératoire. Auteur : Fontaine, Bénédicte (1993) Directeur de thèse : Bernard, Céline
cl C	itre : Évaluation de la prévalence de la stéatose hépatique et de la stéatohépatite non alcoolique hez les patients asymptomatiques dysmétaboliques hospitalisés dans le service de diabétologie CHU Saint Pierre de novembre 2018 à mai 2019. Auteur : Daubord, Coralie (1990) Directeur de hèse : Nobecourt-Dupuy, Estelle
GÉ	NÉTIQUE MÉDICALE156
V	itre : Le dépistage préconceptionnel génétique (DPCG) : état des lieux clinique et biologique en ue de la mise en place d'une étude pilote sur l'Ile de La Réunion. Auteur : Deiller, Caroline (1990- ) Directeur de thèse : Doray, Bérénice157
	ïtre : Syndrome de Fryns, PIGN, Hernie diaphragmatique congénitale, Océan Indien, lle de La Réunion. Auteur : Méleu, Audrey (1991) Directeur de thèse : Doray, Bérénice158
GY	NÉCOLOGIE MÉDICALE ET OBSTÉTRIQUE159
e <sup>-</sup>	itre : Impact du terme d'adressage et autres facteurs prédictifs d'issues maternelles, obstétricales et néonatales défavorables chez les patientes obèses. Auteur : Lepinette, Anaïs (1989) Directeur de thèse : Theobald, Peter von160

Titre : Satisfaction des patientes accouchant à La Réunion concernant la prise en charge de la douleur avec ou sans analgésie péridurale. Auteur : Louvel, Lauriane (1990) Directeur de thèse : Boukerrou, Malik
Titre : Évaluation de la place actuelle de l'HyFoSy à La Réunion et des obstacles à sa diffusion afin d'améliorer le parcours des couples consultant pour infertilité. Auteur : Pestre, Camille (1990)  Directeur de thèse : Levaillant, Jean-Marc
Titre : Apport d'un nouveau compte rendu type pour l'évaluation échographique préopératoire de l'endométriose pelvienne dans un contexte d'auto- apprentissage. Auteur : Langlais, Eva (1992) Directeur de thèse : Eidesheim-Flye Sainte Marie, Hélène
Titre : Association entre le score d'Aletti et les complications post-opératoires : proposition d'une prise en charge post-opératoire adaptée au risque pour les patientes opérées d'un cancer épithélial de l'ovaire. Auteur : Castel, Mathilde (1992) Directeur de thèse : Hudry, Delphine .166
Titre: Rôle du médecin gynécologue non spécialisé en médecine légale dans la prise en charge en urgence des victimes d'agression sexuelle en zone dépourvue d'UMJ. Auteur: Guichardière, Elisabeth (1990) Directeur de thèse: Laffitte, Annick
Titre : Évaluation des pratiques de prise en charge des cancers du sein localisés HER2 positif en Côte-d'Or : étude rétrospective à partir du registre des cancers du sein et gynécologiques de Côte-d'Or. Auteur : Jacinto, Sarah (1992) Directeur de thèse : Costaz, Hélène
Titre : Issues maternelles et fœtales des grossesses avec malformation utérine : une cohorte de 111 patientes et 191 accouchements sur 19 ans, au CHU de Saint Pierre de La Réunion. Auteur : Khaled, Samy (1992) Directeur de thèse : Tran, Phuong Lien
Titre : Place de l'exploration endoscopique dans la prise en charge de l'infertilité idiopathique : données de la littérature et méta-analyse de 25 études. Auteur : L'hirondel, Blandine (1990)  Directeur de thèse : Gabriel, Marc (1960)
Titre : Évaluation des effets tératogènes et du taux de transmission materno-fœtale de la dengue en cours de grossesse : étude rétrospective. Auteur : Lemoine, Luna (1990) Directeur de thèse : Lafont, Marine
Titre: Devenir global à 2 ans des enfants diagnostiqués RCIU isolés en anténatal au centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal de La Réunion. Auteur: Mariani, Lola (1992) Directeur de thèse: Lafont, Marine
Titre : Le dépistage multiparamétrique de la maladie vasculaire placentaire au premier trimestre de la grossesse au Centre Hospitalier Ouest Réunion. Auteur : Odelin, Natacha (1991) Directeur de thèse : Lefebvre, Sophie
Titre: La voie d'éjection gauche en échocardiographie fœtale de dépistage: audit des pratiques et critères de qualité. Auteur: Regouin, Maud (1990) Directeur de thèse: Quarello, Edwin175
Titre: L'interruption volontaire de grossesse entre 9 et 12 semaines d'aménorrhée par méthode médicamenteuse à La Réunion. Auteur: Remy, Agathe (1994) Directeur de thèse: Theobald, Peter von
Titre: Prise en charge du cancer du col de l'utérus à la Réunion de 2016 à 2020. Auteur: Turpin, Adeline (1990) Directeur de thèse: Tran, Phuong Lien

MEDECINE D'URGENCE179
Titre : Étude du transfert de compétence médecin-infirmier à travers la pose de voies veineuses périphériques échoguidées. Auteur : Chabaud, Vincent (1992) Directeur de thèse : Nativel, Frédéric
Titre : Evaluation des délais de prise en charge des accidents vasculaires cérébraux bénéficiant d'une thrombolyse intraveineuse aux urgences de Saint-Pierre du CHU de la Réunion. Auteur : Folio, Benjamin (1993) Directeur de thèse : Poupel, Antoine
Titre : Étude descriptive rétrospective d'une cohorte de patients pédiatriques noyés de 2014 à 2020. Auteur : Laval, Alexandra (1989) Directeur de thèse : Perruchetti, Damien
Titre : Prévalence du Mycoplasma genitalium, facteurs de risque de contamination et signes cliniques associés à l'infection : étude au sein d'un centre de dépistage de La Réunion. Auteur : Torregrossa, Emilie (1989) Directeur de thèse : Bertolotti, Antoine
Titre: Les diagnostics différentiels de COVID-19 graves en zone tropicale lors de la première vague : l'expérience de La Réunion. Auteur: Krol, Pauline (1993) Directeur de thèse: Allyn, Jérôme184
Titre: Prévalence et cinétique d'évolution de la dysfonction diaphragmatique échographique chez le patient âgé admis aux urgences pour détresse respiratoire aiguë. Auteur: Le Corre, Mathieu Directeurs de thèse: Mathieu, Daniel; Groseil, Thomas
Titre : Évaluation d'une méthode de réorientation vers la médecine de ville, pour des patients non urgents consultant aux urgences du Centre Hospitalier Ouest Réunion (CHOR). Auteur : Thibaud, Joachim (1993) Directeur de thèse : Girerd, Rémi
Titre : Évaluation de la pertinence des radiographies anticipées dans les traumatismes de cheville chez les adultes aux urgences de Félix Guyon, La Réunion : étude RATAC. Auteur : Vincent, Pauline (1992) Directeur de thèse : Lubrano di Scampamorte, Olivier
IEUROLOGIE188
Titre : La neuromyélite optique de Devic à la Réunion. Auteur : Cuvier, Victor (1990) Directeur de thèse : Gradel, Antoine
Titre: Description clinique, génétique et électroneuromyographique de 21 patients présentant une maladie de Charcot-Marie-Tooth par mutation du gène de la Périaxine. Auteur: Martin, Joana (1992) Directeur de thèse: Choumert, Ariane
PÉDIATRIE193
Titre : Évaluation de l'utilisation de la mesure du glucose interstitiel sur l'équilibre glycémique de la cohorte pédiatrique de patients diabétiques suivie dans l'unité d'endocrinopédiatrie du CHU Sud Réunion. Auteur : Andral, Léna (1991) Directeur de thèse : Houdon Nguyen, Laure192
Titre : Anémie hémolytique due au déficit en G6PD chez les enfants à Mayotte : une complication fréquente et sévère. Auteur : Boyadjian, Marie (1991) Directeur de thèse : Blondé, Renaud193
Titre: Prise en charge diagnostique de la fièvre chez le nourrisson de moins de 3 mois: étude observationnelle rétrospective au Centre Hospitalier de Mayotte entre janvier 2016 et décembre 2018. Auteur: Haji, Soumeya (1989) Directeur de thèse: Chamouine, Abdourahim194
Titre: Les infections invasives sévères à Staphylococcus aureus sécréteur de la toxine de Panton et Valentine à La Réunion. Auteur: Lacoste, Rosalie (1992) Directeur de thèse: Ramful, Duksha 199

	Titre : Etude de la croissance staturale de la cohorte réunionnaise de patients atteints du syndrome de Larsen de La Réunion : analyse de la réponse et tolérance au traitement par hormone de croissance. Auteur : Périer, Elodie (1990) Directeur de thèse : Houdon Nguyen, Laure196
	Titre : Fiabilité des paramètres échocardiographiques chez des patients porteurs de ventricule droit systémique : étude prospective multicentrique. Auteur : Pommier, Victor (1993) Directeur de thèse : Amedro, Pascal
	Titre : Étude descriptive de la première cohorte pédiatrique et néonatale traitée par assistance extracorporelle de type ECMO à la Réunion et mise en place d'un programme de formation spécifique médico-paramédicale. Auteur : Reynaud, Alexandre (1990) Directeur de thèse : Levy, Yaël
	Titre: Les troubles du sommeil chez les enfants et les jeunes adultes atteints de pneumopathies interstitielles diffuses. Auteur: Abdel-Latif Thomasson, Diane (1989) Directeur de thèse:  Fauroux, Brigitte
	Titre: Évaluation de la mise en place des échanges transfusionnels automatisés dans la prise en charge des enfants drépanocytaires à Mayotte. Auteur: Darrieumerlou, Mélanie (1989)  Directeur de thèse: Chamouine, Abdourahim (1971)
	Titre : État des lieux sur la population pédiatrique, originaire de l'Océan Indien, ayant bénéficié d'un transfert en France métropolitaine au cours d'une prise en charge de pathologie hématologique ou oncologique. Auteur : Dréan-Papin, Maureen (1993) Directeur de thèse :  Reguerre, Yves
	Titre: Petite taille à 5 ans des enfants nés grands prématurés avec ou sans restriction de croissance fœtale. Auteur: Euvrard, Coralie (1992) Directeur de thèse: Pigeon-Kherchiche, Patricia
	Titre : Étude rétrospective descriptive de la première cohorte pédiatrique de patients opérés pour cardiopathies congénitales et acquises à l'île de la Réunion entre 2015 et 2020. Auteur : Laforest, Gérald (1991) Directeur de thèse : Levy, Yaël
	Titre : Diagnostic échographique des pneumopathies acquises sous ventilation mécanique en réanimation pédiatrique. Auteur : Uguen, Justine (1989) Directeur de thèse : Peipoch, Lise205
P	NEUMOLOGIE
	Titre : Survie et caractéristiques épidémiologiques des femmes atteintes de cancer pulmonaire à La Réunion. Auteur : Kienlen, Aurélie (1993) Directeur de thèse : Huchot, Eric207
	Titre : Le dosage des micro-ARNs plasmatiques pour améliorer le diagnostic des nodules pulmonaire. Auteur : Morellec, Laura (1989) Directeur de thèse : Mazières, Julien208
	Titre : Facteurs prédictifs de réponse au décubitus ventral chez les patients atteints d'un syndrome de détresse respiratoire aiguë sévère lié à la Covid-19. Auteur : Gabenesch, Matthieu (1993)  Directeur de thèse : Timsit, Jean-François
	Titre : Épidémiologie de la tuberculose et sensibilité aux antituberculeux à La Réunion de 2014 à 2018. Auteur : Moreea, Loukman (1992) Directeur de thèse : Allou, Nathalie211
	Titre : Grippes graves prises en charge en réanimation à la Réunion de 2010 à 2019. Auteur : Verdier, Victor (1992) Directeur de thèse : Paganin, Fabrice212

SYCHIATRIE	213
Titre: Marqueurs biologiques et cliniques associés à la composition membranaire érythrocytair en acide gras poly-insaturés dans une population ambulatoire de patients schizophrènes traités stabilisés. Auteur: Bosc, Nicolas (1976) Directeur de thèse: Nuss, Philippe	s et
Titre : Communiquer un diagnostic de schizophrénie aujourd'hui : une revue systématisée de la littérature. Auteur : Moreno, Rachel (1992) Directeur de thèse : Blum, Laurent (1978)	
Titre : L'expérience d'une souffrance par le corps à l'adolescence. Auteur : Merlo, Médérick (1990)) Directeur de thèse : Ludot Gégoire, Maude	
Titre : Scoping review des outils de dépistage des conduites suicidaires des adolescents en milie carcéral. Auteur : Miranne Guivarc'h, Adrien (1992) Directeur de thèse : Spodenkiewicz, Mic	hel
Titre: L'expérience du confinement à La Réunion: étude qualitative. Auteur: Roche, Margot (1993) Directeur de thèse: Spodenkiewicz, Michel	.219
Titre: Electroconvulsivothérapie et anticoagulants: étude naturalistique observationnelle. Auto Saddiki, Salim (1994) Directeurs de thèse: Sauvaget-Oiry, Anne; Bulteau, Samuel	
IROLOGIE	.221
Titre : Étude des facteurs de risque prédictifs de complications post opératoires après cystector pour cancer. Auteur : Le Quellec, Antoine (1990) Directeur de thèse : Pignot, Géraldine	
Titre : Description des délais de prise en charge des cancers de la prostate en pratique courante aux CHU de Bordeaux et de La Réunion. Auteur : Lonca, Laëtitia (1992) Directeur de thèse : Bladou, Franck	

# **EDITORIAL**

Chèr.e.s lecteur.trice.s,

Après avoir partagé avec vous en 2021, la première Revue bibliographique des thèses d'exercice en médecine 2017-19, c'est avec plaisir que nous vous adressons cette Revue bibliographique des thèses d'exercice en médecine soutenues à l'université de La Réunion 2020 et 2021. Cette revue est issue d'un travail collaboratif entre la Faculté de Santé dirigé par Pr Doray Bérénice et le service commun de la documentation (SCD) dirigé par Mme Menant Joëlle. Il a été coordonné par Mme Dandeu Emeline et moimême.

Ce projet naît en 2020 de la volonté du bureau des thèses de valoriser les thèses d'exercice de médecine. Les praticiens qui participent aux projets de recherche étaient peu informés des résultats de ces derniers. Bien sûr, les thèses d'exercice de médecine sont maintenant disponibles en ligne grâce au formidable travail de l'équipe du SCD mais il nous tenait à cœur de les valoriser sous forme d'une revue bisannuelle diffusée à l'ensemble des professionnels de santé de l'océan Indien.

L'objectif premier de cette revue est donc d'informer les professionnels de santé de l'océan Indien de l'immense travail réalisé par les étudiant.e.s de 3ème cycle d'un diplôme d'étude spécialisé en médecine et de leur directrice et directeur de thèse. Nous espérons aussi que le partage de ces travaux fera naître de nouvelles idées de recherche et incitera les professionnels de santé à proposer des études et pourquoi pas à diriger des thèses.

Nous tenons à remercier Mme Dandeu Emeline pour son travail de coordination ainsi que le Pr Franco Jean-Marc, le Dr David Couret, les membres du Département universitaire de médecine générale et du Département universitaire de médecine spécialisée pour leur soutien dans ce projet.

Nous vous souhaitons une bonne lecture.

#### Dr LEGRAND Florian

Chef de Clinique Universitaire de Médecine générale

#### Dr LERUSTE Sébastien

Maître de conférences des Universités de Médecine générale Responsable du bureau des thèses

Faculté de Santé. Département Universitaire de Médecine Générale dirigé par le Pr Franco Jean-Marc / Université de la Réunion

Le Service Commun de la Documentation, et plus particulièrement la bibliothèque universitaire de Terre-Sainte, propose de la documentation, mais pas seulement, aux étudiants, enseignants chercheurs en santé et praticiens hospitaliers.

Bientôt, une nouvelle BU va ouvrir, dans un campus neuf à Saint-Pierre, ce qui va permettre de développer de nouveaux services, d'offrir davantage de places assises, des salles de travail en groupe, une excellente connexion wifi et des matériels numériques. Les personnels ont à cœur de valoriser les productions scientifiques en santé, voici donc la deuxième édition de la revue bibliographique des thèses en médecine soutenues à l'Université de La Réunion, fruit d'un travail collaboratif entre l'UFR Santé, le CHU et le SCD.

À la date du mois de juin 2022, ce sont **271 thèses d'exercice** en santé de l'université de La Réunion qui sont consultables en ligne, sur le site <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/</a> ou sur l'intranet de l'Université.

Voici un aperçu des dernières thèses soutenues en 2020 et 2021 : bravo aux étudiants !

Et merci aux personnels de la BU de Terre-Sainte, Jean-Michel Dolbeau, Jérôme Châtellard, Catherine Bègue et Catherine de Boisvilliers pour leur travail.

#### Joëlle MENANT

Directrice du Service Commun de la Documentation Université de La Réunion

# MÉDECINE GÉNÉRALE

Titre: Étude de l'exposition aux infections cutanées à streptococcus pyogenes chez les patients atteints de rhumatisme articulaire aigu en Nouvelle-Calédonie: étude cas témoins et épidémiologie descriptive dans la province des îles Loyauté.

Auteur : Amic-Desvaud, Quentin (1992-....)

Directeur de thèse : Ducrot, Yves-Marie

Spécialité : Médecine générale

Date: 2020

Nombre de pages : 109

Bibliographie : 97 références

Résumé : Introduction : Le rhumatisme articulaire aigu (RAA) est un problème majeur de santé publique dans le Pacifique sud. De nouvelles publications réalisées dans cette région soulèvent le rôle potentiel des infections cutanées à streptocoque béta hémolytique de groupe A (SGA) dans la genèse de la maladie. En Nouvelle-Calédonie, les dispensaires de la province des îles Loyauté disposent d'une base de données informatique exhaustive permettant de connaître le suivi médical de chaque patient depuis 1998. Nous avons réalisé une étude cas témoins multicentrique afin de comparer l'exposition aux infections cutanées à SGA précédant l'apparition de la maladie. Méthode : Chaque cas était apparié à 3 témoins comparables sur l'âge le sexe et le lieu d'habitation. L'exposition aux infections cutanées et aux angines était calculée grâce à l'utilisation de requêtes informatiques. Résultats : Sur un effectif de 311 cas, on observe une surexposition aux infections cutanées présumées à SGA depuis la naissance, dans les 6 mois, l'année et les 5 ans précédant le diagnostic. L'odds ratio est calculé à 2,182 (1,461-3,259). De plus, on note une forte incidence des infections cutanées sur ce territoire contrastant avec l'incidence faible des angines. Enfin, on observe une corrélation entre les saisonnalités du RAA et des infections cutanés et une superposition des zones à forte incidence de RAA et à forte incidence d'infection cutanée. Conclusion : Nos résultats appuient l'hypothèse selon laquelle les infections cutanées à SGA joueraient un rôle direct ou indirect dans la physiopathologie du RAA. Aux regards de ces résultats, il paraît urgent de mettre en place des mesures visant à diminuer l'incidence des infections cutanées dans la province des îles.

**Sujets:** Streptococcus pyogenes

Rhumatisme articulaire aigu

Angine -- Îles Loyauté (Nouvelle-Calédonie)

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03121571">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03121571</a>

Titre : Exploration des besoins et des attentes des internes de médecine générale de l'Océan Indien en matière d'accompagnement à la gestion de leurs émotions en situations professionnelles.

**Auteur :** André, Charlotte (1990-....) **Directeur de thèse :** Dugrosprez, Gaétan

Spécialité : Médecine générale

Date: 2020

Nombre de pages : 79

Bibliographie: 79 références

Résumé: Introduction: La souffrance des internes en lien avec leur travail est connue, étudiée et médiatisée. Des moyens de prévention sont mis en place mais paraissent insuffisants en regard de la persistance de ce mal-être. Une des trois composantes du burn out étant l'épuisement émotionnel de la personne, un travail sur la gestion des émotions des internes semblait intéressant. Ce travail avait pour but d'explorer chez les internes de l'Océan Indien, leurs besoins et leurs attentes en matière d'accompagnement à la gestion de leurs émotions en situations professionnelles. Méthode : Il s'agit d'une analyse qualitative en focus group.19 internes de médecine générale, ont participés à 4 groupes d'échanges, structurés par un canevas abordant le vécu des situations professionnelles, les ressources, les besoins et attentes des internes. L'analyse des données utilisait le principe de la théorisation ancrée. Résultats : Les besoins des internes naissaient de quatre types de difficultés : la gestion des émotions d'autrui, la confrontation à leurs limites, le manque de formation et la charge de travail. Pour face faire à ces difficultés et mieux gérer les émotions en découlant, les internes exprimaient trois besoins principaux : pouvoir en parler, être accompagnés et y être préparés. Conclusion : Un meilleur accompagnement à la gestion des émotions des internes est indispensable. Un travail sur les représentations du rôle de médecin, un accompagnement pédagogique plus humain et une préparation psychologique à l'exercice de la médecine sont nécessaires. Une libération de la parole invitant chacun à pouvoir exprimer et accepter ses limites, semble un préalable inéluctable à l'accueil des difficultés des autres.

Sujets: Internes (médecine) -- Stress lié au travail

Épuisement professionnel

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03066694">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03066694</a>

Titre : Données cliniques autour de la fièvre Q aiguë à La Réunion : étude de cohorte rétrospective.

Auteur : Aubin, Alexandra (1990-....)

Directeur de thèse : Bertolotti, Antoine

Spécialité : Médecine générale

Date: 2020

Nombre de pages : 61

Bibliographie: 76 références

Résumé: Introduction: La fièvre Q est une pathologie négligée, la présence de C.burnetii a été démontrée à La Réunion mais peu de données cliniques sont disponibles. Le but de cette étude était de rapporter les données cliniques et épidémiologiques de la fièvre Q aigue à La Réunion entre 2004 et 2017. Matériels/Méthodes: Les cas de cette étude de cohorte rétrospective ont été inclus à partir des bases de données informatiques des quatre hôpitaux de l'île à partir des termes « Coxiella burnetii » et « Fièvre Q ». L'inclusion s'est basée sur une sérologie Coxiella burnetii positive (IgG phase II≥ 200 et IgM phase II ≥ 50) ou une séroconversion ou une PCR positive des patients hospitalisés. Résultats: Quarante-deux patients ont été inclus. L'incidence cumulée a été estimée à 9,3 pour 100 000 habitants (95%IC: 6,4-12,1). La présentation clinique la plus fréquente était l'atteinte pulmonaire (n=26 avec 45,2% de pneumopathie) puis digestive (n=11) et cardiaque (endocardite n=2). Conclusions: La fièvre Q est présente sous forme endémique à La Réunion, la présentation pulmonaire est la plus fréquente.

Sujets: Fièvre Q -- La Réunion (France; île)

Coxiella

Coxiella burnetii

Titre : Les infections sexuellement transmissibles bactériennes à La Réunion : prévalence et facteur de risques des infections à Mycoplasma genitalium.

Auteur : Begnis, Roxane (1990-....)

Directeur de thèse : Bertolotti, Antoine

Spécialité : Médecine générale

Date: 2020

Nombre de pages : 57

Bibliographie: 79 références

Résumé: Introduction: Mycoplasma genitalium (Mg) est une infection sexuellement transmissible émergente (IST) et controversée avec des données limitées disponibles. Objectif : Évaluer la prévalence et les facteurs de risque de Mg dans un centre de dépistage des IST de La Réunion. Méthodes : De janvier 2017 à décembre 2018, tous les patients consultant au centre de dépistage furent testés pour Mg, Chlamydia trachomatis (Ct) et Neisseria gonorrhoeae par échantillon urétral/vaginal, pharyngé et/ou anal et analysés par PCR multiplex. Les variables furent recueillies anonymement par questionnaires standardisés. Résultats : La prévalence totale de Mg était de 4,88% [3,98-5,93] sur les 2069 échantillons recueillis. La prévalence urétérale/vaginale était de 5,33% chez les femmes et de 3,22% chez les hommes (PR 1,66; p=0,02). La prévalence anale et pharyngée étaient respectivement de 3,06% et 0,61%. En analyse multivariée, la prévalence totale de Mg était associée : au nombre de partenaires élevé (>10 partenaires, aPR 4,33; p<0,004), aux antécédents médicaux d'IST (aPR 1,89; p<0,0026), à l'absence de l'usage du préservatif (aPR 2,56; p<0,001), associé à une infection à Ct (aPR 2,56; p<0,001). Conclusion : Cette étude indique une forte prévalence de Mg chez les femmes consultant dans un centre de dépistage d'IST à La Réunion et s'associant à une co-infection avec Ct. Avec un taux élevé d'interruption volontaire de grossesse et une précarité majeure, l'observance médicamenteuse est insuffisante à La Réunion. L'absence de dépistage systématique pour Mg ne permet pas d'adapter l'antibiothérapie par azithromycine sur 3 jours et risque l'émergence d'une résistance sur une île où cette dernière est encore faible.

Sujets: Maladies sexuellement transmissibles -- Prévention -- La Réunion (France; île)

Maladies sexuellement transmissibles – Diagnostic

Mycoplasma genitalium -- Diagnostic

Mycoplasma genitalium -- Prévention

Lien vers la ressource : Intranet de l'Université (accès restreint)

Titre : Diagnostic précoce de dengue : étude de la performance du TROD SD

Bioline Dengue Duo sur l'île de la Réunion.

Auteur : Belot, Jeanne (1991-....) Directeur de thèse : Adenis, Thibault

Spécialité : Médecine générale

Date: 2020

Nombre de pages : 56

Bibliographie: 57 références

**Résumé** : Introduction : La dengue est un problème de santé publique majeur avec plus de 55 % de la population mondiale exposée. A la Réunion, une épidémie est en cours depuis 2018. Les établissements de santé réunionnais sont confrontés aux problématiques de gestion d'un afflux massif de patients et d'une charge de soins accrue. Le but de cette étude était d'évaluer la performance du TROD SD Bioline dengue duo chez les patients adultes consultant aux urgences pendant l'épidémie 2019. Matériels/Méthodes : Cette étude de cohorte rétrospective incluait les patients majeurs, ayant consulté entre le premier janvier et le 30 juin aux urgences de Saint Pierre pour une suspicion de dengue et ayant bénéficié d'un TROD et d'une RT-PCR. Résultats : 2021 patients ont été analysés rétrospectivement, 321 patients répondaient aux critères d'inclusion. La composante NS1 avait une sensibilité de 48% (IC95% 36-60) et une spécificité de 58% (IC95% : 50-67). La composante IgM était hautement sensible 86% (IC95% : 79-94), mais très peu spécifique 6% (IC 95% : 3-9). Il n'y avait pas d'amélioration de la performance du TROD durant la phase aiguë (dans les 5 premiers jours) par rapport à la phase tardive (après le 5ème jour). Conclusion : Le TROD SD Bioline dengue duo présentait une faible sensibilité et une faible spécificité. Ces données suggèrent qu'il n'est pas performant pour confirmer ou infirmer le diagnostic de dengue aux urgences pendant une épidémie.

Sujets: Dengue -- Diagnostic -- La Réunion (France; île)

Dengue -- Symptômes

Titre : Contrat Local de Santé, étude d'une co-construction autour de l'obésité infantile.

Auteur : Bertrand, Océane (1990-....) Directeur de thèse : Palma, Vanessa Élodie

Spécialité : Médecine générale

Date: 2020

Nombre de pages : 90

Bibliographie: 32 références

**Résumé**: Introduction: L'obésité infantile est un enjeu national de santé publique. A La Réunion dans la commune de la Possession, elle constitue un des axes prioritaires du contrat local de santé signé en 2015, et est au cœur du projet de Maison de santé Pluriprofessionnel Sakisoigne. Elle est à l'origine de la création d'un Comité de Pilotage dont le but est d'organiser une prévention et une prise en charge coordonnée avec tous les acteurs locaux du monde médicosocio-institutionnel travaillant sur ce sujet. Le but de cette étude est d'évaluer le vécu des participants à ce COPIL, d'identifier les freins et leviers de son organisation pour la rendre pérenne Méthode : Analyse qualitative phénoméno-pragmatique à partir d'entretiens semi dirigés recueillis auprès de 9 professionnels ayant assisté à au moins 2 réunions du COPIL Résultats: La perspective d'un travail synergique et d'un apprentissage commun ont été source d'enthousiasme. Un maillage des réseaux s'est créé. Cependant l'engouement initial des acteurs a été freiné par des difficultés organisationnelles inhérentes à chacun telle que le manque de disponibilité lié à des temporalités peu compatibles, notamment chez les médecins généralistes, ainsi que par une absence de financement. Conclusion : Le COPIL a perduré et ses projets se sont concrétisés grâce aux volontés de chacun, et à l'expérimentation "Mission Retrouve ton Cap" de l'Assurance Maladie. Néanmoins, il sera nécessaire de renforcer la communication entre les mondes médical et socio-institutionnel afin de permettre aux médecins de pouvoir participer aux actions locales, ainsi que trouver des financements facilitant le développement de ce type de projet à long terme.

Sujets : Inégalités sociales de santé

Politique sanitaire – La Possession (Réunion)

Sociologie de la santé

Santé publique -- Administration -- La Possession (Réunion)

Enfants obèses -- La Possession (Réunion)

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03065899">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03065899</a>

Titre : Volume d'hydratation orale des patients atteints de dengue en médecine générale à La Réunion.

Auteur : Besnard, Olivier (1989-....)

Directeur de thèse : Leruste, Sébastien

Spécialité : Médecine générale

Date: 2020

Nombre de pages : 61

Bibliographie: 64 références

Résumé: Introduction: La dengue est une arbovirose en expansion dans le monde. Depuis 2017, La Réunion fait face à l'épidémie la plus importante depuis 1977. Une étude réalisée au Nicaragua suggérait une diminution du risque d'hospitalisation par la prise de 5 verres de liquide par jour (1 183 ml). En 2003, l'OMS a fixé cet objectif d'hydratation. L'objectif de cette étude était d'estimer le volume d'hydratation des réunionnais atteints de dengue. Méthode : Une étude observationnelle descriptive transversale a été menée. Des patients présentant un syndrome « dengue-like » ont été recrutés par des médecins généralistes. Un questionnaire médical et un auto-questionnaire d'hydratation ont été remplis à deux reprises, avant et après la confirmation biologique de la dengue. L'analyse statistique était descriptive et bivariée. Résultats: 174 patients ont été inclus du 01/04/19 au 01/07/19. Le volume d'hydratation orale moyen était de 1 863 ml et 1 944 ml en 1ère et 2nde consultation. 70 % et 85 % des patients consommaient plus de 5 verres en 1ère et 2nde consultation. L'eau simple était le liquide le plus consommé. Les patients consommant plus de 5 verres ont significativement moins de signes cliniques d'alertes en 1ère consultation (p = 0,044). Conclusion : Le volume d'hydratation des réunionnais semblait conforme aux recommandations de l'OMS. Les recommandations locales devraient sensibiliser les patients à l'hydratation orale, par un objectif minimal de volume et la prise de solutés isotoniques. Une étude observationnelle et/ou interventionnelle de plus grande ampleur, associée à une mesure objective de l'hydratation, seraient nécessaires.

Sujets: Dengue -- La Réunion (France; île)

Déshydratation -- Lutte contre -- La Réunion (France ; île)

Médecins généralistes -- La Réunion (France ; île)

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02888852">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02888852</a>

Titre : Le médecin généraliste face aux violences conjugales à La Réunion.

Auteur: Blottiaux, Aurélie (1991-....)

Directeurs de thèse : Djardem, Yasmina ; Humbert, Patrice

Spécialité : Médecine générale

Date: 2020

Nombre de pages: 102

Bibliographie : 49 références

Résumé: Introduction: Les violences conjugales constituent un véritable enjeu de santé publique. Récemment mis en avant lors du Grenelle des violences conjugales en 2019, elles sont actuellement au centre de plusieurs discussions entre des acteurs politiques, sociaux, judiciaires, associatifs et professionnels de santé. En 2017, La Réunion se situait à la troisième place des régions les plus touchées par les violences conjugales. Souvent consulté en premier recours par les victimes, le médecin généraliste est un acteur central dans la prise en charge. L'objectif de cette étude était de déterminer comment le médecin généraliste prend en charge des situations de violences conjugales à la Réunion. Méthode : Étude qualitative avec une approche par la théorisation ancrée. Elle a donné lieu à la réalisation de 14 entretiens auprès de médecins généralistes installés dans différents secteurs de l'île de la Réunion. Résultats : L'analyse ouverte et l'étiquetage initial ont permis de réaliser un livre de 100 codes. L'analyse de ces codes a permis de faire émerger 5 catégories : accueillir la révélation de violences conjugales, pouvoir orienter, oser aborder le sujet, exercer à la Réunion et faire évoluer sa pratique. Ces résultats ont été modélisés sous la forme de schéma, ce qui permet de mieux appréhender les processus mis en jeu et les besoins du médecin généraliste. Conclusion : Sensibilisé au sujet des violences conjugales, le médecin généraliste possède de bonnes connaissances théoriques, mais peut parfois se sentir isolé. Afin de créer ou de renforcer des liens avec les partenaires du réseau, nous proposons de fournir aux médecins généralistes un outil d'aide à la pratique spécifique à La Réunion.

Sujets: Violence conjugale -- La Réunion (France; île)

Médecins généralistes -- La Réunion (France ; île)

Risques pour la santé -- La Réunion (France ; île)

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03070842">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03070842</a>

Titre : La médiation de pleine conscience dans la prise en charge des maladies chroniques somatiques en médecine générale.

Auteur : Bouvier, Amélie (1988-....) Directeur de thèse : Christen, Ludovic

Spécialité : Médecine générale

Date: 2020

Nombre de pages : 126

Bibliographie: 139 références

**Résumé** : Introduction : Les maladies chroniques, du fait de l'augmentation de leur prévalence et incidence, représentent un problème majeur de santé publique ainsi qu'une souffrance psychologique pour les patients. La méditation de pleine conscience est un programme psycho éducatif standardisé de huit semaines appartenant à la troisième vague des thérapies cognitivo- comportementales. Nous avons évalué la place de cette pratique dans la prise en charge des pathologies chroniques somatiques fréquentes en médecine générale. Méthode : Nous avons réalisé une revue de la littérature à partir de la base de données Medline. Nous avons inclus 40 articles comprenant des essais contrôlés randomisés et des revues de la littérature avec ou sans méta analyse qui étudiaient la méditation de pleine conscience chez des patients atteints de diabète, maladie cardio-vasculaire, cancer et douleur chronique. Résultats : Les études ont révélé un effet positif significatif sur la réduction des symptômes de stress, d'anxiété et de dépression après l'intervention, et ce d'autant plus quand le niveau de souffrance psychologique était élevé au départ. Les effets sur les paramètres physiques et la qualité de vie étaient mitigés. Discussion/Conclusion : Cette méthode pourrait s'intégrer aux soins primaires en tant qu'approche thérapeutique complémentaire aux traitements habituels pour le développement des compétences psychosociales ayant pour objectif une amélioration du bien-être psychologique et de la gestion de la maladie. Le médecin généraliste pourrait se former à cette technique lui permettant de renforcer ses compétences empathiques et de prévenir un épuisement professionnel, au service de la relation de soin.

**Sujets:** Maladies chroniques

Médiation thérapeutique

Psychothérapie

Médecine générale

Lien vers la ressource : <u>Intranet de l'Université (accès restreint)</u>

Titre : Renoncements aux soins de premier recours des personnes en situation de précarité à La Réunion, quels leviers ?

Auteur : Brunet, Sylvain (1990-....) Directeur de thèse : Robin, Léo

Spécialité : Médecine générale

Date: 2020

Nombre de pages : 157

Bibliographie: 130 références

Résumé: Introduction: A La Réunion, un tiers des habitants renoncent aux soins au moins une fois par an. Les inégalités sociales de santé renforcent ce phénomène dans les populations en situation de précarité. L'objectif était d'identifier les facteurs modifiables limitant l'accès aux soins de premier recours des personnes en situation de précarité à Saint Louis, commune connaissant des indicateurs de précarité parmi les plus élevés. Méthode : Une étude qualitative a été réalisée avec des entretiens semi-dirigés. Des personnes en situation de précarité selon le score EPICES ont été interrogés. L'analyse des données anonymisées s'inspirait du principe de la théorisation ancrée. Résultats: Des facteurs individuels et systémiques exposaient les personnes aux renoncements aux soins. Ces déterminants survenaient à tout niveau du parcours de soins. Les points critiques étaient le maintien d'une couverture maladie, les soins dentaires, la prévention et l'accès aux traitements. Le recours aux soins était tardif. Les connaissances du système étaient disparates. La population migrante décrivait des causes spécifiques. Discussion : L'étude est originale sur La Réunion. En complément des études sur le score EPICES et les refus de soins pourraient être menées. Pour pallier les freins, un atout serait d'accroître la sensibilité des professionnels aux sciences humaines, aux inégalités sociales et à la transculturalité. La relation de soins et la communication seraient également renforcées par une diffusion de médiateurs pairs-aidants et d'interprètes en ville. La barrière administrative serait amoindrie par une simplification du renouvellement des droits ou la mise en place d'une PASS de ville.

Sujets: Exclusion sociale -- La Réunion (France; île)

Soins de santé primaires -- Renonciation (droit) -- La Réunion (France ; île)

Droit à la santé -- La Réunion (France ; île)

Soins médicaux -- Droit -- La Réunion (France ; île)

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02885896">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02885896</a>

Titre : Épidémiologie descriptive de la gale humaine au sein de la Province des lles Loyauté de Nouvelle-Calédonie.

Auteur: Bruno, Enzo (1990-....)

Directeur de thèse : Ducrot, Yves-Marie

Spécialité : Médecine générale

Date: 2020

Nombre de pages : 140

Bibliographie: 179 références

Résumé : Introduction : La gale est un problème de santé publique en Océanie mais aucune donnée n'existe en Nouvelle-Calédonie. Il s'agissait d'une première étude dans la Province des lles Loyauté (PIL) de 20000 habitants. Méthode : Nous avons réalisé une étude descriptive et exhaustive de 1999 à 2018 par un algorithme recherchant les cas de gale dans la base de données informatisée des dispensaires. Une validation des données, un calcul d'incidence spécifique par sexe, âge et îlots géographiques, une recherche de corrélation avec les données climatiques et celles issues des recensements ainsi qu'un auto-appariement sur les < 5 ans concernant la présence ou non d'infection cutanée à 1 an du traitement ont été effectuées. Résultats : 20988 cas de gale ont été extraits par l'algorithme avec une sensibilité de 100 % et une spécificité de 94 %. Le taux d'incidence global moyen était de 6 % et de 32 % chez les < 2 ans. A 14 ans, plus de 62 % des enfants avaient déjà fait l'expérience de la gale. Les femmes étaient plus atteintes (SR > 1.2). Il existe une forte saisonnalité (+30 % en hiver), avec une évolution endémique. La géolocalisation montre des disparités d'incidences mais non corrélées aux indicateurs moyens de chaque îlot géographique concernant la promiscuité, l'habitat, ou le niveau socio-économique. Après traitement, chez les <5 ans les infections cutanées étaient 4 fois moins fréquentes. Conclusion : La gale a une forte endémicité dans la PIL à l'instar des pays voisins. Elle est responsable de nombreuses infections cutanées chez l'enfant. Un traitement de masse pourrait être envisagé. Cette étude montre la faisabilité et la puissance de l'utilisation des données médicales électroniques.

**Sujets :** Gale -- Îles Loyauté (Nouvelle-Calédonie)

Médecine générale -- Îles Loyauté (Nouvelle-Calédonie)

Peau -- Infections -- Îles Loyauté (Nouvelle-Calédonie)

Titre: Devenir à 1 et 3 mois suivant un passage aux urgences au CHU de la Réunion pour chute des patients âgés de plus de 65 ans autonomes vivant à domicile.

Auteur : Bulatovich-Gamblin, Julie (1992-....)

Directeur de thèse : De Oliveira, Maria-Fatima

Spécialité : Médecine générale

Date: 2020

Nombre de pages : 76

Bibliographie: 83 références

Résumé : Méthode : Il s'agit d'une étude prospective observationnelle bi centrique au CHU de la Réunion. Les patients ayant accepté de participer à l'étude ont été rappelés à 1 mois et 3 mois. Un questionnaire téléphonique de suivi leur a été proposé. Résultats : Nous avons eu une cohorte de 56 participants. L'âge moyen était de 75.9 ans avec 53.4% de femmes. 53.8% présentaient au moins un critère de fragilité au moment de la chute. La polymédication était le facteur prédisposant majoritairement présent. 62.5% des patients ont eu au moins 1 conséquence immédiate de la chute. 3.9% des patients ont présenté une nouvelle chute dans le mois suivant le passage aux urgences. 13% ont déclaré avoir subi une nouvelle chute lors du rappel à 3 mois. A 3 mois, 19.6% ont présenté une aggravation pour de leur dépendance pour les activités instrumentales et 21.7% pour les activités basales. 100% des patients présentaient un syndrome post-chute à 3 mois. 51.2% des patients présentaient un syndrome dépressif à 3 mois de suivi. Depuis le passage aux urgences 52.2% ont déclaré avoir bénéficié des séances de kinésithérapie et 17.4% ont bénéficié d'une supplémentation en vitamine D. Conclusion : Le taux de récidive de chute à 3 mois est de 13%. 1 personne âgée sur 5 présentera dans les suites de chute une aggravation de sa dépendance tant pour les activités instrumentales de la vie quotidienne que pour les activités basales, ainsi qu'une aggravation du syndrome dépressif. Les besoins réunionnais en termes de prise en charge des patients chuteurs continueront à augmenter. La création d'un réseau de prise en charge des patients chuteurs pourrait être une réponse adaptée à ces besoins croissants.

Sujets: Chutes chez la personne âgée -- La Réunion (France; île)

Urgences en gériatrie -- La Réunion (France ; île)

Urgences médicales -- La Réunion (France ; île)

Prise en charge personnalisée du patient -- La Réunion (France ; île)

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02991620">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02991620</a>

Titre: Acceptabilité par les internes de médecine générale de l'Océan Indien d'un outil d'auto-formation en ligne (e-learning) proposé par l'Institut national du cancer (INCA) sur le dépistage des lésions précancéreuses et cancéreuses cutanées.

Auteur : Cassam-Chenai, Chanaël (1991-....)

Directeur de thèse : Osdoit-Médart, Sophie

Spécialité : Médecine générale

Date: 2020

Nombre de pages : 74

Bibliographie : 60 références

Résumé: Introduction: L'incidence des cancers cutanés est croissante à La Réunion. La formation initiale au dépistage de ces lésions est jugée insuffisante par de nombreux médecins généralistes et internes de médecine générale. L'objectif de notre étude était d'évaluer l'acceptabilité d'un outil d'auto-formation en ligne proposé par l'Institut national du cancer (INCA) concernant le dépistage des lésions précancéreuses et cancéreuses cutanées (LPCC), par les internes de médecine générale de l'Océan Indien (IMGOI) de 1ère et 2ème année. Matériels et méthodes : Cette étude expérimentale non randomisée monocentrique a inclus les IMGOI de 1ère et 2ème année. Le recueil de données a été réalisé sur 25 semaines entre mars et septembre 2019. Deux questionnaires composés de questions à choix multiples et de cas cliniques ont été envoyés par e-mail aux participants, avant et après la formation en ligne. L'outil de formation, validé par l'INCA et gratuitement accessible en ligne, contenait des cours, des photos et des cas cliniques. La formation était jugée acceptable si au moins 70 % des inclus effectuaient au moins 70 % de la formation. Résultats : Sur 126 IMGOI inclus, 42 (33 %) ont participé au premier questionnaire, 13 (10 %) formés en ligne, ont répondu au deuxième questionnaire. Parmi eux, 4 IMGOI (3,2 % des inclus) ont fait plus de 70 % de la formation. Discussion : Selon le critère de jugement principal, notre étude a jugé cet outil de formation non acceptable par les IMGOI de 1ère et 2ème année. Néanmoins, notre travail a montré l'intérêt des participants pour un complément de formation sur le dépistage des LPCC, notamment via le e-learning.

Sujets: Peau -- Cancer -- Dépistage

Médecine générale

Titre : Exacerbations d'asthme à l'île de La Réunion : rôles des facteurs environnementaux.

Auteur : Chane-Si-Ken, Nash (1990-....) Directeur de thèse : André, Michel

Spécialité : Médecine générale

Date: 2020

Nombre de pages : 31

Bibliographie : 44 références

Résumé: Introduction: L'île de La Réunion est un département Français doté d'un climat de type tropical avec deux saisons distinctes. La prévalence de l'asthme à la Réunion dans la population adulte est proche de celle retrouvée en métropole mais avec des taux de mortalité et d'hospitalisation deux fois plus élevés. Cependant, aucune étude épidémiologique évaluant l'impact sanitaire des facteurs environnementaux à l'île de la Réunion sur les exacerbations d'asthme n'existe. Méthodes: Nous avons analysé de janvier 2010 à juin 2013, 1157 passages aux urgences adultes et pédiatriques au CHU Nord. Les enfants de moins de 3 ans ont été exclus. Ont été corrélés à ces consultations les données quotidiennes suivantes: pollens et moisissures, variables atmosphériques qui sont température, hauteurs de précipitations, le taux d'humidité et humidité relative, le vent, les polluants comme le dioxyde de souffre (SO2), l'oxyde d'azote (NOx) et les particules fines PM10 et PM2.5, et enfin le facteur infectieux qu'est la grippe. Les méthodes DLNMs et GO-GARCH ont été utilisées pour évaluer la corrélation entre les variables. Résultats: Sur ces 1157 passages, il y a eu 864 passages pour asthme dont 532 pour la population pédiatrique âgés de 3 à 16 ans et 332 pour la population adulte. Concernant les pollens chez l'adulte, Urticaceae, Oleaceae, Moraceae et Chenopodiaceae, sont liés positivement aux consultations aux urgences pour exacerbation d'asthme. Chez l'enfant, il s'agit d'Urticaceae, Oleaceae, Poaceae et Myrtaceae. Concernant les moisissures chez l'adulte, Ascospores et Basidiospores sont liés positivement et chez l'enfant, seul Basidiospores l'est. La température influence positivement les exacerbations tant chez l'adulte que chez l'enfant, ce qui n'est pas le cas de la pollution où seuls PM10 et NOx sont corrélés positivement chez les enfants. Les épidémies de grippe sont fortement corrélées aux exacerbations d'asthme. Conclusion: L'analyse des exacerbations d'asthme montre l'influence des pollens (Urticaceae, Oleaceae, Moraceae, Chenopodiaceae chez l'adulte; Urticaceae, Oleaceae, Poaceae et Myrtaceae chez l'enfant), des spores (Ascospores et Basidiospores), du virus grippal et de la pollution chez l'enfant.

```
Sujets : Asthme -- La Réunion (France ; île)

Allergie respiratoire -- La Réunion (France ; île)

Air -- Qualité -- La Réunion (France ; île)

Environnement -- Qualité -- La Réunion (France ; île)
```

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02611092">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02611092</a>

Titre: Caractéristiques épidémiologiques des patients atteints d'hépatite C sur le territoire ouest de l'île de La Réunion: cohorte de 412 patients diagnostiqués entre 1995 et 2016.

Auteur : Chane-Teng, Thomas (1988-....) Directeur de thèse : Cuissard, Laurent

Spécialité : Médecine générale

Date: 2020

Nombre de pages : 41

Bibliographie : 26 références

Résumé: Introduction: Depuis 2011, aucune étude sur les caractéristiques épidémiologiques des patients porteurs d'une hépatite C (VHC) à La Réunion n'a été réalisée. Devant l'évolution démographique de la population réunionnaise et le constat d'une modification des caractéristiques des patients VHC vus en pratique clinique, nous avons réactualisé ces données. Objectif: Poursuivre, chez les patients VHC dépistés entre le 1er Janvier 2011 et le 31 Décembre 2016, le travail épidémiologique initié par le Dr Thurieau avant 2011. Comparer secondairement les caractéristiques épidémiologiques des populations diagnostiquées avant et après 2011. Conclusion : Les caractéristiques épidémiologiques des patients porteurs d'une hépatite C dans l'Ouest de La Réunion diagnostiquée après 2011 ont évolué par rapport aux résultats de l'étude du Dr Thurieau. La toxicomanie et la transfusion ne sont plus les facteurs majeurs de contamination du fait d'une sécurité transfusionnelle renforcée et d'une quasiabsence de toxicomanie active sur l'île. La contamination par iatrogénie mineure pourrait représenter près de 6 nouveaux cas sur 10. La situation géographique particulière de La Réunion (région Océan Indien à forte prévalence du virus de l'hépatite C) pourrait en être la principale cause. Les futures campagnes de dépistage de l'hépatite C à La Réunion devront tenir compte de ces nouvelles données.

**Sujets :** Hépatite C -- Réunion (ouest)

Épidémiologie -- Réunion (ouest)

Titre : État des lieux des représentations parentales concernant les enfants de moins de 5 ans et les écrans à La Réunion.

Auteur : Chapuis, Paul (1992-....)

Directeur de thèse : Baleinier, Michel

Spécialité : Médecine générale

Date: 2020

Nombre de pages : 45

Bibliographie: 30 références

Résumé: L'exposition des enfants aux écrans, et en particulier des jeunes enfants, est un sujet d'actualité sensible qui touche l'ensemble de la population. Les parents sont-ils bien informés des conséquences de cette utilisation? Ce travail est une étude qualitative par entretiens semidirigés avec des parents d'enfants de moins de 5 ans. 12 entretiens ont été réalisés. Les écrans sont considérés par les parents comme une source d'apprentissage, un moment de détente et de calme. Ils ont un rôle de baby-sitter et de lutte contre la solitude. Ils ont des effets sur la santé physique et mentale et modifient le comportement des enfants qui y sont exposés. Le risque d'addiction est fortement évoqué. Les parents déclarent que l'écran est une fenêtre sur le monde et qu'il fait partie de la famille. Sa rencontre avec l'enfant est inévitable. Il existe un déni des parents sur leurs difficultés ainsi qu'une culpabilité face à l'exposition. Les parents disent qu'ils ont peur de perdre l'amour de leur enfant en cas de conflit. Certains parents considèrent qu'ils doivent être un modèle pour l'enfant et donc de fixer des limites pour son éducation. Cette étude a permis de mettre en évidence que les connaissances sur les risques et les précautions d'utilisation sont très disparates dans la population. Il parait donc important de rappeler aux parents les recommandations d'usage des écrans en fonction de l'âge des enfants.

Sujets: Médias et enfants

**Enfants internautes** 

Télévision et enfants

Parents et enfants

Rôle parental

Éducation des enfants

Titre : Connaissances, représentations et attentes des patients à propos des placebos impurs en médecine générale : approche qualitative.

Auteur : Cheymol, Lucas (1989-....) Directeur de thèse : Reix, Grégory

Spécialité : Médecine générale

Date: 2020

Nombre de pages : 74

Bibliographie: 66 références

Résumé: Introduction: Les placebos impurs sont des substances ou méthodes ayant une efficacité connue, mais dont les preuves d'un effet spécifique manquent dans les affections pour lesquelles ils sont prescrits. Ils sont couramment prescrits par les médecins généralistes. L'objectif était d'étudier les connaissances, représentations et attentes des patients à propos des placebos impurs. Méthode : Une étude qualitative s'inspirant de la théorisation ancrée a été réalisée par entretiens semi-directifs. L'analyse des entretiens était réalisée indépendamment par deux chercheurs pour la triangulation des données. Résultats : Quatorze entretiens ont été réalisés. Les placebos impurs étaient placés imprécisément entre placebos et médicaments. L'efficacité ressentie était variable et d'interprétation personnelle. Les « autres patients » étaient considérés comme plus demandeurs de placebos impurs. Les patients attendaient une efficacité personnelle et un bénéfice, selon un raisonnement pragmatique plus que scientifique. Ils faisaient confiance à leur médecin. L'effet médecin jouait un rôle important lors de la prescription. La prescription de placebos impurs pouvait être éthique sous conditions, lorsque la relation médecin malade était de qualité. Conclusion : Ce travail retrouvait des représentations variées et instables des placebos impurs. L'efficacité était propre à chacun. L'attente principale était l'efficacité personnelle allant vers un bénéfice. L'administration ouverte de placebos impurs pourrait permettre l'utilisation du placebo impur dans certaines situations cliniques, pour améliorer l'efficacité du soin, éthiquement, dans une perspective d'Evidence Based Medicine optimisée.

Sujets: Effet placebo

Pharmacologie clinique

Médecine générale

Titre : L'accompagnement des femmes allaitantes en consultation de médecine générale par les internes formés à l'ile de La Réunion.

Auteur: Comoz, Aurélie (1992-....)

Directeur de thèse : Godeluck-Gendre, Anaïs

Spécialité : Médecine générales

Date: 2020

Nombre de pages : 65

Bibliographie: 51 références

Résumé: Introduction: L'allaitement maternel exclusif pendant six mois est l'alimentation la plus adaptée aux besoins du nourrisson. Les médecins généralistes ont un rôle de soutien qui influence positivement l'initiation et la prolongation de l'allaitement maternel. L'objectif de cette étude est de décrire les connaissances des internes de médecine générale formés à La Réunion, concernant l'allaitement. Méthode : L'étude est quantitative, déclarative, descriptive et transversale, réalisée du 1er mai 2019 au 31 octobre 2019. Des questionnaires numériques ont été envoyés aux internes de médecine générale inscrits à l'université de La Réunion en 2018-2019. Résultats: Deux cent trente-huit internes étaient inscrits à l'université et 132 questionnaires ont été remplis. L'allaitement maternel était important pour 86% des internes et 67% se considéraient pro-allaitement. Cependant les internes ne se sentaient pas à l'aise avec l'allaitement maternel (76,5%) en dehors de ceux ayant eu des enfants. Seuls 16% des internes connaissaient le taux réel d'insuffisance de lait primaire, première cause d'arrêt de l'allaitement maternel. La moitié des internes se sentaient capable de prendre en charge seuls les douleurs et plaies du sein chez la femme allaitante. 95,5% des internes étaient intéressés par une formation complémentaire sur l'allaitement maternel et les recours possibles aux questions d'allaitement à La Réunion. Conclusion : Les connaissances des internes de l'étude étaient limitées concernant la physiologie de la lactation, la prise en charge du couple mèreenfant et les recours disponibles. La majorité des internes sollicitaient une formation complémentaire concernant l'allaitement maternel

Sujets: Allaitement maternel -- La Réunion (France; île)

Médecine générale -- La Réunion (France ; île)

Internes (médecine) -- La Réunion (France; île)

Nourrices -- La Réunion (France ; île)

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02648242">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02648242</a>

Titre: Prévalence et facteurs associés aux infections à Treponema pallidum chez les patients consultant en centre de dépistage à La Réunion sur la période janvier 2017 à mars 2020.

Auteur: Delfosse, Annabelle

Directeur de thèse : Bertolotti, Antoine

Spécialité : Médecine générale

Date: 2020

Nombre de pages : 92

Bibliographie : 108 références

Résumé: Introduction: La syphilis est une infection sexuellement transmissible dont la prévalence mondiale est estimée à 0,5% en 2012. Alors que la syphilis est en augmentation dans la littérature nationale et internationale dans les pays développés parmi les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, la situation diffère à la Réunion. Objectif : Déterminer la prévalence de la syphilis, ses caractéristiques cliniques et ses facteurs de risque dans un centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles du Sud de la Réunion. Méthode : Étude transversale, monocentrique à partir des données cliniques et biologiques recueillies chez tous les patients ayant consulté entre 2017 et 2020, à travers un auto-questionnaire standardisé et par la réalisation d'une sérologie syphilitique. Résultats : Sur les 3 ans, 2593 patients ont été inclus. La prévalence de la syphilis était de 7,52% (n = 195; 95% IC 6,50-8,65) dans la population d'étude, de 11,76% (n = 18; 95% CI 6,97-18,59) chez les mineurs et de 36,36% (n = 16, IC95[21-59]) chez les femmes enceintes. Les facteurs de risque identifiés en analyse multivariée étaient le sexe féminin (Odd Ratio (OR) = 1,85, 95% IC 1,10-3,11), un âge inférieur à 18 ans (OR = 3,54, 95% IC 1,90 6,57), la précarité (OR = 3,12, 95% IC 2,11 4,62) et l'origine Réunionnaise (OR = 2,43 95% IC 1,42 4,13). La description clinique était variée (ulcérations atypiques, ulcérations multiples, condyloma lata, syphilides...) Conclusion: Il existe une forte prévalence de la syphilis à La Réunion parmi les mineurs et les femmes laissant craindre une résurgence des syphilis congénitales.

Sujets: Syphilis -- La Réunion (France; île)

Maladies sexuellement transmissibles -- La Réunion (France ; île)

Médecine générale -- La Réunion (France ; île)

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02942512">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02942512</a>

Titre : Utilisation de la bibliothérapie en médecine générale. Enquête d'opinion auprès des généralistes de la Réunion.

Auteur : Dusart, Clement (1989-....) Directeur de thèse : Riquel, Line

Spécialité : Médecine générale

Date: 2020

Nombre de pages : 67

Bibliographie: 61 références

Résumé: Introduction: La bibliothérapie désigne l'utilisation de supports écrits à des fins thérapeutiques. L'effet curatif des livres, mentionné dès l'antiquité, est objectivé par plusieurs études. Elle est beaucoup utilisée en Angleterre en soins primaires alors qu'en France elle semble peu exploitée. L'objectif principal de l'étude était de faire l'état des lieux des connaissances et de l'utilisation de la bibliothérapie par les médecins généralistes de la Réunion. Méthode : Une enquête d'opinion a été menée avec un questionnaire numérique. La population cible comprenait l'ensemble des généralistes libéraux à la Réunion. Un échantillon a été constitué en utilisant des répertoires d'adresses mails. Le recueil de données était anonyme. Résultats : 68 réponses ont été collectées. L'échantillon semblait représentatif de la population cible pour le sexe et l'âge. 43 médecins (63%) avaient déjà utilisé des livres en consultation, surtout pour des patients atteints de troubles psychologiques. Les principaux obstacles identifiés étaient la méconnaissance de l'existence de la technique, le manque d'intérêt pour les livres (côté patient), l'incompréhension à se voir prescrire des livres. À la fin du sondage 79% des médecins envisageaient d'utiliser ces supports, et 87% plébiscitaient un site web référençant des ouvrages à conseiller. Conclusion : Notre étude a permis de dresser un état des lieux inédit de cette pratique à la Réunion. La majorité des médecins sondés l'avait déjà utilisée, notamment pour des troubles psychologiques. Afin de développer cette pratique, il faudrait créer un référentiel de livres pour guider les praticiens et les patients dans leur choix.

Sujets: Bibliothérapie

Médecine générale

Titre : Médecine de soins primaires à distance en milieu isolé : exemple du soutien médical des îles Éparses Juan de Nova et Europa.

Auteur: Fauché, Marion (1992-....)

Directeur de thèse : Dubourg, Olivier Joël Jean

Spécialité : Médecine générale

Date: 2020

Nombre de pages : 88

Bibliographie: 42 références

Résumé: Introduction: 15 personnels militaires sont postés sur chacune de ces îles, dont un infirmier depuis mai 2016. Il y prodigue les soins de santé primaires pour le personnel militaire et les scientifiques de passage. Si nécessaire, il peut faire appel à un médecin de la Réunion, joignable en permanence, voire demander l'évacuation du patient par avion vers la Réunion. L'objectif principal était de déterminer l'épidémiologie des demandes d'avis médical. Méthode : étude transversale descriptive épidémiologique des demandes d'avis médical envoyées par mail de l'infirmier au médecin, entre mai 2016 et janvier 2020. Tous les mails indiquant un motif de demande ont été inclus. Résultats : 124 demandes d'avis médical ont été analysées. La moyenne d'âge des consultants était de 26 ans et la population était à 96% masculine. Les demandes d'avis médical étaient principalement d'ordre traumatologique à 37,9%, puis dermatologique, ORL et infectieux à 12,1% chacun. 57,4% des patients ayant reçu un traitement ont reçu un antalgique et, dans 53,7% des cas, un traitement relatif à la traumatologie (désinfection, suture, immobilisation). Un transport sanitaire a été nécessaire pour 5,6% des demandes d'avis médical. Il n'y a eu aucun décès Conclusion : La particularité de ce système de santé est la distanciation du médecin, en lien avec l'infirmier par le biais de la télémédecine. L'épidémiologie décrite sur ces îles semble correspondre aux données de la littérature médicale en milieu isolé et souligne la cohérence globale du système mis en place.

Sujets: Armées -- Services médicaux et sanitaires -- Îles Éparses de l'océan Indien (France)

Médecine militaire -- Îles Éparses de l'océan Indien (France)

Soins médicaux -- Îles Éparses de l'océan Indien (France)

Bases militaires -- Îles Éparses de l'océan Indien (France)

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02991440">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02991440</a>

Titre : Prévalence et facteurs de risque associés aux infections sexuellement transmissibles à Chlamydia trachomatis à La Réunion.

Auteur : Folio, Marine (1990-....)

Directeur de thèse : Bertolotti, Antoine

Spécialité : Médecine générale

Date: 2020

Nombre de pages : 65

Bibliographie: 106 références

Résumé: Introduction: Chlamydia trachomatis (Ct) est responsable d'un nombre important d'infections sexuellement transmissibles (IST) en France et en particulier en Outre-Mer. L'objectif de cette étude était de déterminer la prévalence de Ct à La Réunion et les facteurs de risque (FDR) associés à l'infection en 2017 et 2018. Méthode : Nous avons mené une étude transversale dans les quatre centres de dépistage de l'île entre janvier 2017 et décembre 2018. Les données ont été recueillies à partir d'auto- questionnaires standardisés et de prélèvements biologiques avec analyse par PCR multiplex chez tous les sujets ayant consulté dans un de ces centres et ayant eu un dépistage pour Ct. Résultats : La prévalence globale de Ct dans la population de l'étude était de 8,6% (IC95% 7,7- 9,5%). La prévalence uro-génitale de Ct était plus importante chez les femmes mineures (13,2%, IC95% 9,3-18,1%) et les homosexuels masculins mineurs âgés de 15 à 17 ans (13,3%, IC95% 1,6-48,2%). Le sexe féminin, l'origine réunionnaise, un nombre élevé de partenaires sexuels au cours de l'année et les co-infections par d'autres IST constituaient les principaux FDR identifiés. Conclusion : La prévalence en CeGIDD de Ct est plus importante à La Réunion qu'en métropole, en particulier chez les mineurs, d'où la nécessité des campagnes de prévention, de dépistage et le traitement des IST dans la population générale et surtout dans les collèges et les lycées.

Sujets: Chlamydia trachomatis -- La Réunion (France; île)

Maladies sexuellement transmissibles -- La Réunion (France ; île)

Maladies infectieuses -- Prévention -- La Réunion (France ; île)

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02920092">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02920092</a>

Titre: Retour d'expérience des maîtres de stage des universités de la subdivision Océan Indien ayant accueilli un interne de phase socle en stage ambulatoire de niveau 1 depuis la réforme de 2017.

Auteur: Fontanille, Etienne

**Directeur de thèse :** Franco, Jean-Marc

Spécialité : Médecine générale

Date: 2020

Nombre de pages : 107

Bibliographie : 69 références

**Résumé** : Introduction : La réforme du 3ème cycle des études médicales de 2017 a modifié le stage ambulatoire de niveau 1 pour les maîtres de stage des universités exerçant dans la subdivision Océan Indien qui accueillent désormais des internes de 1er ou 2ème semestre. Cette étude visait à analyser leur retour d'expérience. Méthode : Étude qualitative inspirée de la théorisation ancrée par entretien semi-dirigé auprès de maîtres de stage des universités exerçant depuis au moins trois ans dans l'Océan Indien et ayant accueilli au moins un interne de phase socle de Novembre 2017 à Juin 2020 en stage ambulatoire de niveau 1. Résultats : Onze entretiens ont été réalisés. Les maîtres de stage des universités avaient une expérience positive de leur pratique, grâce à une valorisation de leur rôle depuis l'accueil d'internes novices moins habitués aux pratiques hospitalières. La maîtrise de stage était plus chronophage, l'encadrement pédagogique des phases d'observation active et de supervision directe étant plus long. Les objectifs de stage variaient : la mise en autonomie était parfois prioritaire quand d'autres lui préféraient des objectifs d'initiation à la médecine générale. Ils n'utilisaient pas les outils pédagogiques et enseignaient de manière intuitive. Ils regrettaient l'absence de retour sur leur pratique. Certains méconnaissaient la réforme et n'ont pas identifié de changement. Conclusion : Cette étude a montré une satisfaction des maîtres de stage des universités à exercer leur rôle depuis la réforme, devenu cependant plus chronophage. Définir de nouveaux objectifs et outils pédagogiques adaptés permettrait d'améliorer leur expérience tout en uniformisant leur enseignement.

Sujets: Internes (médecine) -- La Réunion (France; île)

Maîtres de stage des universités -- La Réunion (France ; île)

Médecine -- Étude et enseignement -- La Réunion (France ; île)

Soins médicaux ambulatoires -- La Réunion (France ; île)

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03127231">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03127231</a>

Titre : Comment aborder la sexualité des patients en médecine générale ? Étude comparative de deux techniques d'approche.

Auteur : Françoise, David (1987-....) Directeur de thèse : Gaillard, Patrick

Spécialité : Médecine générale

Date: 2020

Nombre de pages : 55

Bibliographie : 26 références

Résumé: Introduction: L'abord systématique de la sexualité en médecine générale permet aux patients entre autres de savoir qu'ils peuvent consulter leur médecin traitant pour des questions du domaine de la santé sexuelle. L'objectif de l'étude est de déterminer quel type d'interrogatoire est le plus acceptable pour le patient lors de l'abord de la sexualité par le médecin généraliste. L'objectif secondaire est de déterminer l'influence du type d'interrogatoire sur la surprise, la gêne du patient et sur le déroulement de la consultation. Méthode: Une étude quantitative, transversale, descriptive, déclarative, monocentrique a été réalisée. Un groupe a reçu une question à thème unique et l'autre groupe une question à thèmes multiples. L'étude a été menée par le biais de questionnaire autoadministré au sein d'un cabinet de médecine générale situé à Saint Drézéry, Hérault, France par un médecin remplaçant homme. Le taux de patients évaluant la démarche du médecin comme acceptable était le critère de jugement principal. Résultats : 171 patients ont été inclus dans l'étude dont 85 pour le groupe « thème unique » et 86 pour le groupe « thèmes multiples ». Les deux groupes étaient statistiquement similaires. 97,5 % des patients du groupe « thème unique » et 100 % des patients du groupe « thèmes multiples » ont déclaré considérer la question comme acceptable (p = 0,25). Conclusion : L'étude n'a pas permis de démontrer une différence significative entre les deux méthodes pour l'acceptabilité. La méthode « thèmes multiples » semble entraîner moins de gêne chez le patient. Elle permet au médecin de se sentir plus à l'aise et elle entraîne un taux de discussion sur la sexualité équivalent.

Sujets : Sexualité

Relations médecin-patient

Médecins généralistes

Titre : Prévalence et étude des connaissances des infections sexuellement transmissibles en milieu carcéral à l'île de La Réunion.

Auteur : Gorlin, Angélique (1988-....)

Directeur de thèse : Moiton, Marie-Pierre

Spécialité : Médecine générale

Date: 2020

Nombre de pages : 93

Bibliographie: 79 références

Résumé : Introduction : Les données de la littérature retiennent les populations carcérales comme étant à risque d'infections sexuellement transmissibles (IST). L'objectif principal de notre étude était de déterminer la prévalence des IST chez les personnes détenues majeures, à l'entrée en milieu carcéral sur l'île de La Réunion. Méthode : Il s'agit d'une étude monocentrique, prospective. Nous avons proposé un prélèvement génito-urinaire et un questionnaire à toutes les personnes majeures lors de la visite médicale d'entrée au centre pénitentiaire de Saint Denis. Le prélèvement urinaire chez l'homme ou vaginal chez la femme a permis le dépistage par Polymerase Chain Reaction (PCR) des infections uro génitales à Chlamydia trachomatis (Ct), Neisseria gonorrhoeae (Ng) et Mycoplasma genitalium (Mg). Les sérologies VIH, syphilis et des hépatites B et C étaient également proposées. Résultats : Entre juin 2018 et juin 2019, 426 personnes détenues ont été inclus dans l'étude. Parmi les 78,9% (n=336) personnes détenues qui ont réalisé le prélèvement génito-urinaire, 2,7% (n=9) avaient un prélèvement positif pour Ng, 8,0% (n=27) pour Ct et 10,7% (n=36) pour Mg. Parmi celles ayant réalisé le prélèvement sanguin, 1,9% (n=7) des sérologies étaient positives pour la syphilis. Une personne détenue a eu une sérologie VIH positive et une autre une hépatite B active. Aucune sérologie n'est revenue positive pour l'hépatite C. Conclusion : La population carcérale à la Réunion fait partie des populations à risque d'IST. La mise en place d'un dépistage systématique des infections uro-génitales à l'entrée en milieu carcéral semble présenter un intérêt.

Sujets: Maladies sexuellement transmissibles -- Prisons -- La Réunion (France ; île)

Maladies sexuellement transmissibles -- Dépistage -- La Réunion (France ; île)

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02995120">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02995120</a>

Titre : Étude CalédoFaine : évaluation clinique du score de Faine chez les patients suspects de leptospirose au Centre Hospitalier de Nouvelle Calédonie, 2018-2019.

Auteur : Guibreteau, Hélène (1992-....) Directeur de thèse : Klement, Élise

Spécialité : Médecine générale

Date: 2020

Nombre de pages : 89

Bibliographie : 59 références

Résumé : Le diagnostic de la leptospirose est cliniquement difficile et l'évolution peut être rapidement fatale en l'absence d'un traitement spécifique. Le score de Faine, basé sur des critères cliniques et épidémiologiques pour ses parties A et B, a été proposé par l'OMS pour évaluer la probabilité qu'un patient soit atteint de leptospirose. L'étude CalédoFaine a évalué la pertinence des critères cliniques et épidémiologiques du score de Faine chez les patients suspects de leptospirose dans une étude cas-témoin réalisée en 2018 et 2019 au CHT de Nouvelle Calédonie. Tous les patients suspects admis dans les 7 premiers jours de la maladie été inclus puis classés dans la catégorie cas ou témoin en fonction du résultat de la PCR sanguine leptospirose. 35 cas et 70 témoins sélectionnés par tirage au sort pour respecter le ratio 2 témoins par cas ont été analysés. L'analyse multivariée par régression logistique a retrouvé une association significative entre un score « SF A+B » pris dans les catégories « leptospirose possible » (score 20-25) et « leptospirose présumée » (score>26) et le statut cas ou témoin (p<0,0001). La performance du modèle était élevée avec une aire sous la courbe à 99,27%, une sensibilité de 93,55% et une spécificité de 96,36%, permettant de classer correctement les sujets dans 95,35% des cas. L'étude CaledoFaine a donc permis de valider la pertinence du score épidémio-clinique de Faine comme un outil simple pour identifier les cas possibles de leptospirose dès leur entrée dans le système de soin. Ce score doit être testé dans d'autres régions où les diagnostics différentiels et les modes de vie sont différents.

Sujets: Leptospiroses -- Diagnostic -- Nouvelle-Calédonie

Leptospiroses -- Thérapeutique -- Nouvelle-Calédonie

Antibiothérapie -- Nouvelle-Calédonie

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02885782">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02885782</a>

Titre : La promotion de l'activité physique en médecine générale : étude qualitative sur les représentations et les pratiques de médecins généralistes de l'île de La Réunion.

Auteur : Huet, Marjorie (1993-....) Directeur de thèse : Simon, Hector

Spécialité : Médecine générale

Date: 2020

Nombre de pages : 85

Bibliographie: 88 références

Résumé: Introduction: Conscients de l'accroissement de la sédentarité et de ses conséquences sur la santé de la population, les pouvoirs publics se mobilisent afin de promouvoir l'activité physique. En tant que coordonnateur du parcours de soin. Méthode : Il s'agissait d'une étude observationnelle qualitative avec recueil des données sous formes de 12 entretiens individuels semi-dirigés. L'analyse des données s'inspirait de la théorisation ancrée. Résultats : 12 médecins généralistes ont été interrogés durant la période de janvier à mai 2020. Les médecins se désignaient eux-mêmes comme les interlocuteurs privilégiés. Ils ont appris de la science les bienfaits de l'activité physique mais leur expérience personnelle influençait également leur pratique clinique. De nombreux facteurs pouvaient entraver leur pratique comme l'absence de formation, l'absence de rentabilité financière, le patient jugé comme non motivé, le coût perçu comme trop élevé ou encore l'absence d'infrastructure. Certains médecins pouvaient au contraire s'appuyer sur des dispositifs « Sport sur Ordonnance » et accroitre la pratique de l'activité physique en levant certaines barrières. La pratique d'une activité physique par le médecin et son affinité pour la thématique lui conférait une certaine légitimité à la promouvoir et lui permettait d'orienter sa pratique clinique en ce sens. Conclusion : Cette étude a permis de soulever l'influence de l'expérience professionnelle et personnelle des médecins généralistes sur leurs représentations et donc sur leurs pratiques cliniques au sujet de la promotion de l'activité physique.

Sujets: Santé publique -- La Réunion (France; île)

Politique sanitaire -- La Réunion (France ; île)

Médecins généralistes -- La Réunion (France ; île)

Promotion de la santé -- La Réunion (France ; île)

Éducation physique et sportive -- La Réunion (France ; île)

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03043593">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03043593</a>

Titre : La transmission des savoirs traditionnels sur les plantes médicinales à La Réunion : étude qualitative réalisée auprès de personnes âgées en EHPAD.

Auteur : K/bidy, Murielle (1989-....)

Directeur de thèse : Franco, Jean-Marc

Spécialité : Médecine générale

Date: 2020

Nombre de pages : 72

Bibliographie: 46 références

Résumé: Introduction: L'utilisation des plantes médicinales, en plein essor, est largement répandue à La Réunion. Les personnes âgées paraissent être les détentrices de ces savoirs traditionnels et la question de leur transmission se pose. L'objectif de cette étude était de comprendre, de leur point de vue, comment s'effectuait la transmission de ces connaissances entre générations. Méthode : Il s'agissait d'une étude qualitative par entretiens individuels semi-dirigés auprès des personnes âgées de l'EHPAD Saint-François d'Assises à Saint-Denis de La Réunion. L'analyse des données s'inspirait du principe de la théorisation ancrée. Résultats : Neuf personnes âgées ont été interrogées entre juin et août 2019. Leurs savoirs se sont avérés riches. Ils leur ont été transmis par leur entourage géographique et social proche par le boucheà-oreille, l'observation ou la consommation au sein de leur famille. À l'époque, la transmission était justifiée par la nécessité de recourir aux plantes pour se soigner car le système de santé « moderne » était peu développé et coûteux. Depuis, le développement socio-économique de l'île a altéré la transmission entre les générations. Le désintérêt actuel pour les remèdes traditionnels et la confiance dans la médecine moderne ont nourri un sentiment d'illégitimité chez les personnes âgées, qui considèrent leurs savoirs comme obsolètes. Conclusion : Cette étude révèle que les modalités de transmission des savoirs traditionnels sur les plantes médicinales ont changé. Les nombreux freins actuels à la transmission entraînent une perte des connaissances traditionnelles. Les personnes âgées et les générations actuelles devraient être sensibilisées sur l'importance de ces savoirs traditionnels pour leur préservation.

**Sujets :** Établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes -- La Réunion (France ; île)

Personnes âgées -- La Réunion (France ; île)

Médecine traditionnelle -- La Réunion (France ; île)

Plantes médicinales -- La Réunion (France ; île)

Phytothérapie -- La Réunion (France ; île)

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02469037">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02469037</a>

Titre : Gestion de la privation de sommeil en ultra-trail : étude transversale des habitudes, stratégies et répercussions chez les coureurs du Grand Raid de La Réunion 2018.

Auteur: Kishi, Anthony (1989-....)

Directeur de thèse : Lemarchand, Bruno

Spécialité : Médecine générale

Date: 2020

Nombre de pages : 140

Bibliographie : 146 références

Résumé : La gestion du sommeil en ultra-trail est un critère de réussite et de prévention face aux troubles liés à la privation de sommeil. L'objectif de cette étude était de décrire les habitudes et stratégies de sommeil adoptées avant, pendant et après un ultra-trail. Une identification des stratégies apparaissant en lien avec une diminution de survenue des troubles liés à la dette cumulée de sommeil était un objectif secondaire. Il s'agissait d'une étude épidémiologique descriptive transversale déclarative par questionnaire auto-administré ciblant les participants de la Diagonale des fous et du Trail de Bourbon du Grand Raid de La Réunion 2018. L'analyse a porté sur 1153 coureurs finisseurs dont 882 sur la Diagonale des fous et 272 coureurs finisseurs du Trail de Bourbon. L'extension de la durée journalière de sommeil avant l'épreuve était majoritaire avec 54,3% (n=627) des concurrents sur les deux courses. Les siestes courtes de moins de 30 minutes pendant l'épreuve étaient les plus pratiquées (37,5% pour les siestes de 0 à 15 min et 40,7% pour les siestes de 15 à 30min). Le délai de récupération d'un état d'éveil sans somnolence était très majoritairement d'un à trois jours après l'épreuve concernant 83,8% (n=967) des sujets sur les deux épreuves. La majorité des concurrents ont adapté leur rythme de sommeil à l'occasion de leur épreuve. Le sommeil, en matière de rythme, qualité et durée est un paramètre à prendre en compte dans la préparation d'un ultra-trail dans le but d'appréhender les troubles de vigilance et réduire l'accidentologie. L'extension de la durée de sommeil avant le départ, la mise en place de siestes durant l'épreuve, et le repos minimal de trois jours après l'arrivée sont les axes de prévention prioritaires.

**Sujets:** Sommeil -- Privation

Course en montagne

La Diagonale des Fous -- La Réunion (France ; île

Sommeil -- Sports

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02922397">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02922397</a>

Titre : La série télévisée "Chababi Project" : un renouveau dans le domaine de la promotion de la santé à Mayotte ?

**Auteur :** Klee, Paul (1991-....)

Directeur de thèse : Thomas, Valérie

Spécialité : Médecine générale

Date: 2020

Nombre de pages : 181

Bibliographie: 131 références

Résumé: Introduction: Mayotte est un département disqualifié. Dans ce contexte, la série télévisée Chababi Project visait à promouvoir la santé de façon innovante. L'objectif principal était la mise en valeur d'éléments favorisant la bonne réception de cet outil et la création d'un climat propice à la promotion de la santé. Matériel et méthode : Notre étude qualitative s'inscrivait dans le cadre de la «théorisation ancrée». Elle comprit 8 entretiens exploratoires, 2 observations non participantes, 3 observations participantes et 14 entretiens semi-dirigés. Résultats : La série a reçu un accueil favorable et a ouvert la voie à des évolutions concrètes dans les domaines socio-économique et sanitaire. Ses participants ont eu l'opportunité d'intégrer une démarche professionnalisante. Ils représentent de nouveaux modèles positifs à Mayotte, porteurs d'une vision progressiste de la société. La série a initié un dialogue inédit sur des sujets tabous, tels la sexualité ou les violences. Elle a aussi sorti de l'isolement des victimes. Le succès de la démarche communautaire consiste en la pérennisation d'actions de promotion de la santé par ses participants et par l'apparition de nouveaux acteurs, dont la filiation avec la série n'est pas fortuite. Nous avons pu explorer certains déterminants de santé, notamment le vécu des violences. Conclusion : La fiction audiovisuelle apparaît comme le support privilégié de la promotion de la santé mahoraise. Elle vit actuellement une révolution et donne le change à des conceptions enracinées faisant l'éloge de comportements à risques et de rapports de genre inégalitaires.

Sujets: Santé publique -- Mayotte

Séries télévisées -- Mayotte

Promotion de la santé -- Mayotte

Éducation pour la santé -- Mayotte

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03014177">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03014177</a>

Titre : L'hyponatrémie : une pathologie de soins primaires ?

Auteur : Lacheray, Julien (1992-....)

Directeur de thèse : Marmion, Nicolas

Spécialité : Médecine générale

Date: 2020

Nombre de pages : 99

Bibliographie: 87 références

Résumé: Introduction: L'hyponatrémie est le désordre électrolytique le plus fréquemment rencontré dans l'exercice de la médecine. En raison, de sa fréquence et de sa morbi-mortalité, le médecin se doit de prévenir, diagnostiquer et prendre en charge cette pathologie. Cette prise en charge doit commencer dès le premier maillon de la chaîne, avec le médecin généraliste. Objectifs : L'objectif principal de cette étude est de déterminer les caractéristiques épidémiologiques, cliniques, et étiologiques des patients souffrant d'hyponatrémie < 135 mmol/L dans le service de médecine polyvalente de l'hôpital Saint Louis à la Réunion sur une durée de 1 an. Les objectifs secondaires, estimer la part d'hospitalisation évitable ainsi que d'évaluer la fréquence des patients hyponatrémiques dans les services de médecine polyvalente sur la même période. Nous proposons un algorithme de prise en charge diagnostique de l'hyponatrémie en soins primaires. Méthode : Notre étude transversale observationnelle a été menée du 2 novembre 2018 au 2 novembre 2019. 124 patients ont été hospitalisés avec une natrémie d'entrée inférieure ou égale à 134 mmol/L. Résultats : Au final, ce sont 109 patients qui ont été inclus. La prévalence des hyponatrémies était de 8%. La natrémie médiane d'entrée était de 128 mmol/L. L'âge médian des patients était de 81 ans. La première cause était la iatrogénie avec les diurétiques et les antagonistes du système rénine angiotensine-aldostérone comme spécialités les plus fréquemment retrouvées. Conclusion : Cette étude met en évidence un nombre important d'hyponatrémie iatrogènes évitables avec la création d'un algorithme de prise en charge de l'hyponatrémie en soins primaires afin de la prévenir et de la diagnostiquer.

Sujets: Hyponatrémie -- La Réunion (France; île)

Troubles de l'équilibre hydroélectrolytique -- La Réunion (France ; île)

Soins de santé primaires -- La Réunion (France ; île)

Titre : Étude descriptive de la maîtrise des médecins généralistes libéraux quant à la sécurité des données personnelles de santé de leurs patients, à l'Île de la Réunion en 2019.

Auteur : Lavaud, Léo (1990-....)

Directeur de thèse : Bohrer, Michel

Spécialité: médecine générale

Date: 2020

Nombre de pages : 64

Bibliographie : 43 références

Résumé : Objectif : Décrire la maîtrise des médecins généralistes libéraux quant à la sécurité des données personnelles de santé (DPS) de leurs patients. Méthode : Étude déclarative, réalisée de mai à septembre 2019 auprès des médecins généralistes libéraux installés à La Réunion. Questionnaire anonyme réalisé à l'aide des recommandations de la CNIL et diffusé via la lettre d'information de l'Union Régionale des Médecins Libéraux. Analyse statistique descriptive réalisée pour un niveau de confiance de 95 %. Résultats et discussion : Sur 757 médecins inclus, 49 ont répondu au questionnaire. 95,9 % IC[84,4-99] étaient informatisés. D'une part, les résultats suggéraient principalement une maîtrise quant à l'utilisation de logiciels non-obsolètes et à jour, dont un anti-virus (74,5 % IC[59,6-85,2]). Les médecins réalisaient au moins une sauvegarde par semaine (82,9 %). D'autre part, cette maîtrise était améliorable principalement concernant la robustesse et le renouvellement du mot de passe, l'utilisation d'une messagerie sécurisée de santé (MSS) (46,9 % IC[30,1-64,4]) et la déidentification des DPS (5,9 % IC[0,8-33,7]). Le principal frein retrouvé était le manque de connaissance technique (70,2 %). Le principal biais de l'étude est constitué par la petite taille de l'échantillon. Conclusion : La maîtrise de la sécurité des DPS des patients est améliorable, probablement par la sous-traitance à un informaticien, la sensibilisation des médecins, un design sécurisé des applications de santé, une généralisation des MSS et par la poursuite de la réflexion concernant le numérique en général.

Sujets: Médecine générale

Protection de l'information (informatique)

Droit à la vie privée

Secret médical

Santé publique -- Droit

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02611553">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02611553</a>

Titre: Vécu des parents d'enfants en situation d'obésité suivis en unité d'obésité infantile de l'Hôpital d'Enfants à La Réunion.

Auteur : Lebleu, Mary (1987-....) Directeur de thèse : Palma, Vanessa

Spécialité : Médecine générale

Date: 2020

Nombre de pages : 55

Bibliographie: 47 références

Résumé : L'obésité infantile mondiale a été multipliée par dix au cours des quatre dernières décennies. Elle est un facteur de risque majeur d'obésité à l'âge adulte et de ses conséquences morbides. La prévalence de l'obésité infantile est significativement plus élevée à La Réunion qu'en métropole. La multiculturalité réunionnaise rend cruciale l'adaptation des prises en charge aux représentations socioculturelles. L'objectif de cette étude était donc d'explorer les représentations et l'expérience vécue des parents dont les enfants sont pris en charge au sein de l'unité d'obésité infantile de l'Hôpital d'Enfants à La Réunion. Cette étude qualitative a utilisé une approche par analyse inductive générale avec un échantillonnage en variation maximale. Neufs entretiens de parents de 5 garçons et de 3 filles, d'origines sociales très diverses, ont été conduits par téléphone. L'analyse ouverte et l'étiquetage initial ont abouti à la constitution d'un livre de 79 codes. L'analyse des codes ouverts a fait émerger 4 catégories : l'histoire, l'acceptation, l'implication et le militantisme. L'analyse axiale explicitait une histoire de vie entre justifications et culpabilité, entrainant difficultés et souffrance. L'implication des parents dans la prise en charge de leur enfant faisait ressortir la notion inattendue de plaisir. Enfin, les compétences acquises au cours de la prise en charge leur permettaient de pouvoir combattre les préjugés, source d'exclusion. Au-delà des aspects nutritionnels, la prise en charge de l'enfant obèse à La Réunion devrait passer par celle d'un parent en difficulté, voire en souffrance, et s'attacher à faire renaitre le plaisir dans leur relation.

Sujets: Surpoids -- Chez l'enfant -- La Réunion (France; île)

Enfants obèses -- La Réunion (France; île)

Parents et enfants -- La Réunion (France ; île)

Rôle parental -- La Réunion (France ; île)

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02624816">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02624816</a>

Titre : Le rôle du médecin généraliste dans la lutte contre la surexposition aux écrans des enfants.

Auteur: Macé, Rosalie

Directeur de thèse : Espitalier-Noël, Marie-Paule

Spécialité:

Date: 2020

Nombre de pages : 56

Bibliographie: 70 références

Résumé: Introduction: La surexposition aux écrans des enfants est responsable de nombreux effets indésirables. Il existe en France des recommandations pour encadrer leur usage. Les médecins généralistes pratiquent peu de prévention vis à vis des écrans. Méthode: Une étude quantitative avant/après a été réalisée auprès des parents d'enfants de moins de 6 ans. Un questionnaire sur leurs habitudes d'utilisation était rempli suivi d'une information listant les effets indésirables et les recommandations d'usage des écrans. Le même questionnaire était réalisé 3 mois plus tard. Résultats: 80 enfants ont été inclus. Il y a une amélioration à 3 mois sur au moins un des critères d'utilisation des écrans pour 71 % des enfants, surtout sur l'arrêt des écrans pendant le repas (p=0,019) et avant de dormir (p=0,02). Les parents connaissent mieux les effets indésirables d'une surexposition. Conclusion: L'information apportée par le médecin généraliste a une efficacité dans la prévention de la surexposition aux écrans. Il faut en parler en consultation dès le plus jeune âge.

Sujets: Terminaux à écran de visualisation

Télévision et enfants

Risque

Risques pour la santé

Médecine générale

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03135983">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03135983</a>

Titre: Les médecins généralistes face aux inégalités sociales de la santé: étude quantitative sur le recueil de la situation sociale des patients et les pratiques vis-àvis des inégalités sociales de santé des médecins généralistes toulousains.

Auteur : Mantoux, Mathilde (1989-....) Directeur de thèse : Chaaban, Samah

Spécialité : Médecine générale

Date: 2020

Nombre de pages : 129

Bibliographie : 114 références

Résumé: Introduction: Le médecin généraliste (MG) a un rôle-clé dans la réduction des inégalités sociales de santé (ISS). Le Collège de médecine générale a édité des recommandations incitant les MG à recueillir sept informations « indispensables » et neuf « utiles » sur la situation sociale des patients et à adapter leurs pratiques. Peu d'études quantitatives ont évalué ce recueil et les pratiques vis-à-vis des ISS. L'objectif principal était de décrire le recueil des informations sociales des patients suivis en médecine générale. Les objectifs secondaires étaient de décrire les connaissances, pratiques et attitudes vis-à-vis des ISS. Méthode: Nous avons mené une étude quantitative observationnelle descriptive auprès des MG de Toulouse par questionnaire auto-administré. Résultats : 391 MG ont été inclus. 106 questionnaires ont été remplis. Les MG n'avaient pas reçu de formation initiale sur les ISS. Ils estimaient ce recueil utile voire indispensable. Six des sept informations « indispensables » étaient majoritairement recueillies contre trois des neuf informations « utiles ». Penser que la réduction des ISS fait partie du rôle des soins primaires était associé à un meilleur recueil pour certains items. La plupart des MG avaient des plages de consultations sans rendez-vous, pratiquaient le tiers-payant généralisé, et vérifiaient la protection maladie. Une bonne connaissance des ISS et la perception du rôle des soins primaires dans leur réduction influaient sur ces pratiques. Les MG ne se sentaient pas à même de répondre aux besoins sociaux de leurs patients. Conclusion : Une meilleure formation est nécessaire ainsi qu'un mode d'exercice adapté à la prise en charge des ISS.

**Sujets**: Médecins généralistes -- Toulouse (Haute-Garonne)

Inégalités sociales de santé -- Toulouse (Haute-Garonne)

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02920118">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02920118</a>

Titre : Perception de l'introduction de la vaccination contre le PVH en Polynésie française : enquête auprès des mères d'enfants en âge d'être vaccinés.

Auteur : Marceau, Marius (1990-....)

Directeur de thèse : Ségalin, Jean-Marc

Spécialité : Médecine générale

Date: 2020

Nombre de pages : 76

Bibliographie: 70 références

**Résumé** : Introduction : Le cancer du col de l'utérus a été responsable de 311 365 décès dans le monde en 2018. Les méta-analyses ont mis en évidence une association forte entre une infection persistante par un PVH et l'apparition du cancer du col de l'utérus. Cependant la vaccination PVH ne fait pas partie des recommandations en Polynésie française. Méthode : Une étude qualitative par analyse inductive générale, par des entretiens semi-dirigés individuels, a été réalisée sur l'île de Moorea auprès des mères ayant des filles âgées de 9 à 14 ans. L'objectif de l'étude était d'étudier l'acceptabilité de la vaccination contre le PVH en Polynésie française. Résultats : 4 catégories ont été mises en évidence pour caractériser les motivations des mères à la vaccination anti-PVH : la notion de protection acquise, une approche critique des connaissances, des événements biographiques solidifiant l'utilité vaccinale et des facteurs socio-culturels polynésiens. Ces motivations sont beaucoup plus souvent mentionnées que les freins potentiels à la vaccination retrouvés : le prix des vaccins, le geste traumatique du vaccin, le rapport à la sexualité et la remise en cause de l'utilité de certains vaccins. Conclusion : Les motivations des mères à vacciner leur fille avec le vaccin PVH l'emportent sur leurs freins. Malgré une acceptation importante du vaccin PVH, un phénomène de remise en cause de l'utilité vaccinale est observable. Une communication efficace sur le vaccin anti-PVH devra être réalisée pour améliorer l'acceptabilité du vaccin en Polynésie française pour préparer son introduction dans le calendrier vaccinal.

Sujets: Papillomavirus humains -- Vaccination -- Polynésie française

Col de l'utérus -- Cancer -- Polynésie française

Titre : Analyse des données des appels destinés au Centre-15 de Mayotte : profil des appels relevant de la médecine générale.

Auteur : Mathelin, Camille (1992-....) Directeur de thèse : Rajon, Benjamin

Spécialité : Médecine générale

Date: 2020

Nombre de pages : 74

Bibliographie: 34 références

Résumé: Introduction: La régulation médicale libérale, en place dans la quasi-totalité des Centres de Réception et Régulation des Appels (CRRA) français, est le pivot central de la PDSA. A Mayotte, elle est inexistante. L'objectif de cette étude est de déterminer la proportion d'appels passés au CRRA de Mayotte relevant de la médecine générale parmi la totalité des appels ouvrant lieu à la création d'un Dossier de Régulation Médicale (DRM), dans l'hypothèse qu'une proportion suffisante pourrait ainsi être régulée par un médecin libéral. Méthode : Étude descriptive rétrospective transversale s'intéressant à la totalité des DRM ouverts au CRRA de Mayotte de mars 2018 à mars 2019, puis analyse de différentes données des dossiers classés « P2 ». Résultats : 37,3% (n= 8272/22174) des DRM ouverts entre le 1er mars 2018 et le 31 mars 2019 relevaient de consultation en médecine de secteur ou aux urgences en dernier recours, de conseil médical ou prescription téléphonique. Une recrudescence de ces dossiers étaient visible de 8 à 12h puis de 18 à 22h. Seulement 0,005% des appels « R3 » nécessitant l'envoi d'un transport relevaient finalement d'un transport médicalisé urgent. Conclusion : La proportion d'appels relevant de la médecine générale semble être suffisante pour justifier l'instauration d'une régulation médicale libérale, avec toutefois des ajustements spécifiques au territoire.

Sujets: Régulation médicale -- Mayotte

Services d'urgence médicale -- Mayotte

Urgences en médecine générale -- Mayotte

Médecine générale -- Mayotte

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02624684">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02624684</a>

Titre : Prévalence des facteurs de risque d'hépatite C dans différentes populations de l'île de la Réunion et recours au dépistage.

Auteur: Miller, Lucy (1986-....

Directeurs de thèse : Cuissard, Laurent ; Gaillard, Patrick

Spécialité : Médecine générale

Date: 2020

Nombre de pages : 169

Bibliographie: 160 références

Résumé: Introduction: L'élimination du virus de l'hépatite C est un objectif national français. Il faut pour cela diagnostiquer les cas méconnus. L'association française pour l'étude du foie conseille un dépistage généralisé une fois dans la vie. La HAS recommande un dépistage ciblé sur facteurs de risque. La mise en évidence d'une prévalence élevée de facteurs de risque d'hépatite C dans une population ou dans certains sous-groupes pourrait permettre de lever certains freins au dépistage. A notre connaissance il n'y a pas de données sur ce sujet à La Réunion. Méthode : Un questionnaire a été proposé à des habitants de la Réunion dans les situations suivantes : patients consultant leur médecin traitant (un cabinet en zone rurale et un en zone urbaine), patients vus en consultation d'anesthésie dans une clinique privée, en consultation de gastro-entérologie et au Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit du Centre Hospitalier de Saint-Paul, et personnes « tout-venants » rencontrées en gare routière à St Denis et St Paul lors de journées de sensibilisation grand public. Les facteurs de risque suivants étaient recherchés : antécédents de transfusion avant 1992, de chirurgie, endoscopies avec biopsies, acupuncture, mésothérapie, avant 1997, de soins en pays à risque, de toxicomanie intraveineuse ou per-nasale, de tatouage et piercing, d'incarcération, de rapports sexuels à risque, d'entourage familial à risque. Le questionnaire anonyme recueillait les données sociodémographiques suivantes : sexe, année et pays de naissance. L'objectif était d'analyser la prévalence des facteurs de risque d'hépatite C. Résultats : 22 des 750 questionnaires colligés étaient incomplets. Les personnes ayant rempli les 728 questionnaires retenus pour analyse avaient les caractéristiques suivantes : 423 femmes et 305 hommes, 286 ayant moins de 40 ans, 267 ayant entre 40 et 60 ans et 151 personnes de plus de 60 ans (année de naissance non renseignée sur 24 questionnaires). 76 % avaient au moins un facteur de risque d'hépatite C, surtout chez les femmes (79%). Cette prévalence atteignait 80 % chez les plus de 60 ans sans différence liée au sexe, dépassait 80 % chez les femmes de moins de 40 ans (82%), et culminait chez les personnes de plus de 60 ans originaires de métropole (90%). Conclusion : Trois quarts des personnes réunionnaises de cette étude avaient au moins un facteur de risque d'hépatite C. Dans certains sous-groupes, cette prévalence atteignait 80 voire 90 %. Ces résultats nous semblent suffisants pour lever, à la Réunion, d'éventuels freins au dépistage de l'hépatite C selon les dernières recommandations de l'association française pour l'étude du foie.

Sujets : Hépatite C

Prévention primaire

Dépistage

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03135996">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03135996</a>

Titre : Spécificités de la consultation pré-voyage du sénior : étude descriptive au centre de vaccinations internationales du CHU de Bordeaux, 2013-2018.

Auteur : Mivielle, Romain (1987-....) Directeur de thèse : Nguyen, Duc

Spécialité : Médecine générale

Date: 2020

Nombre de pages : 51

Bibliographie: 65 références

Résumé: Introduction : Le voyageur sénior présente des spécificités socio-médicales insuffisamment prises en compte lors de sa consultation pré-voyage (CPV). L'objectif de cette étude est de décrire les pratiques de vaccination et de prévention du paludisme lors de la CPV du sénior. Méthode : Nous avons réalisé une étude transversale observationnelle avec recueil des données rétrospectif de la CPV du sénior > 60 ans au centre de vaccinations internationales du CHU de Bordeaux. Un tirage au sort aléatoire a permis de sélectionner 70 voyageurs par année sur la période 2013–2018. Résultats : Un total de 414 voyageurs séniors ont été inclus dans l'étude. Leur âge médian était de 65 ans [IIQ: 62-68] avec un sexe-ratio H/F de 1,03. Une pathologie chronique était présente chez 60,9 % (n=252) des voyageurs et un traitement chronique était pris par 62,8 % (n=260) d'entre eux. Le vaccin antiamaril a été administré chez 43,7 % (n=181) des consultants. Les vaccins contre la fièvre typhoïde et contre l'hépatite A ont été prescrits chez respectivement 38,2 % (n=158) et 20,3 % (n=84) des voyageurs. Un rappel dTPca a été prescrit chez 68,9 % (n=84) des consultants non à jour de vaccination. Une chimioprophylaxie antipaludique a été prescrite chez 55,6 % (n=230) des voyageurs. Son indication n'était pas modifiée selon la présence d'un antécédent médical (p=0,54) ou la prise d'un traitement chronique (p=0,75). Conclusion : Cette étude apporte un éclairage sur la CPV du sénior au travers des pratiques d'un centre de vaccinations internationales.

Sujets: Voyages -- Aspect médical

Maladies tropicales -- Prévention

Connaissances, attitudes et pratiques en santé

Vaccination des personnes âgées

Consultation médicale

Voyages -- Aspect médical

Titre: Les représentations des internes du DES de médecine générale de la subdivision Océan Indien vis-à-vis du choix de stage pratique à Mayotte.

Auteur : Moustafaoui, Mustapha (1989-....) Directeur de thèse : Franco, Jean-Marc

Spécialité : Médecine générale

Date: 2020

Nombre de pages : 66

Bibliographie: 26 références

**Résumé** : Introduction : Mayotte permet la formation d'internes de médecine générale depuis 2004 et est département d'outre-mer depuis 2011. Mayotte et La Réunion forment la Subdivision Océan Indien (SOI) depuis 2014. L'Agence Régionale de Santé et le Département Universitaire de Médecine Générale (DUMG) rencontrent des difficultés devant la réticence d'internes à effectuer un stage pratique à Mayotte. Ainsi, cette étude, permet d'explorer les freins et les motivations des internes de médecine générale (IMG) de la SOI à effectuer un stage pratique à Mayotte. Méthode : Il s'agit d'une recherche qualitative utilisant le principe de théorisation ancrée, réalisée avec des données recueillies par des entretiens semi-structurés auprès des IMG de la SOI. Résultats : Les données étaient saturées avec 12 internes. Les internes qui n'ont pas effectué de stage à Mayotte évoquaient des freins d'ordre professionnel, universitaire et personnel. Ceux ayant déjà réalisé un stage, évoquaient des problématiques sociales et géopolitiques. Les motivations de ceux ne connaissant pas Mayotte, portaient principalement sur l'envie de découverte. Tandis que, pour les internes ayant vécu l'expérience mahoraise, le stage pratique apparaissait comme une source de motivation à séjourner à Mayotte. Conclusion : Le stage pratique à Mayotte semblerait intéressant au niveau pédagogique pour la formation des IMG de la SOI malgré les craintes exprimées. Cependant, répondre aux attentes des internes, encouragerait ces derniers à effectuer un stage à Mayotte. Le DUMG et le Syndicat des Internes de l'Océan Indien proposent des solutions pour que le stage à Mayotte se déroule dans les meilleures conditions.

Sujets: Internes (médecine) -- Mayotte

Internat (médecine) -- Mayotte

Médecine -- Étude et enseignement -- Mayotte

Titre : Connaissances des patients réunionnais sur les symptômes et la conduite à tenir en cas d'infarctus du myocarde.

Auteur: Omarjee, Moustapha (1989-....) Directeur de thèse: Assamaly, Navchad

Spécialité : Médecine générale

Date: 2020

Nombre de pages: 81

Bibliographie: 77 références

Résumé: Introduction: L'infarctus du myocarde (IDM) représente une problématique majeure de santé publique à La Réunion. Pourtant, aucune enquête n'avait encore été réalisée sur notre île afin de décrire les connaissances des patients réunionnais sur cette pathologie. Méthode : Une étude descriptive transversale a été réalisée à l'aide d'un questionnaire auto administré chez des patients consultant en médecine générale, dans dix-sept cabinets répartis sur toute l'île. Résultats : 593 patients ont été inclus dans l'analyse. Les trois symptômes les plus cités étaient douleur dans la poitrine (52,9%), trouble de la parole (40,8%) et douleur dans l'épaule (40,6%). Le symptôme douleur dans la poitrine n'était cité que par un patient sur deux. Une confusion majeure avec l'Accident vasculaire cérébral a été retrouvée, avec le symptôme trouble de la parole qui était en deuxième position et trois des cinq premiers symptômes cités qui étaient des signes d'AVC. Plus de quatre réunionnais sur dix (45,4%) ne savaient pas qu'il fallait appeler le 15 immédiatement en cas d'IDM. Les patients ayant déjà fait un IDM n'avaient pas de connaissances significativement différentes sur les symptômes ou la conduite à tenir en cas d'IDM. Les patients à haut risque cardiovasculaires connaissaient significativement moins le symptôme douleur dans la poitrine et l'urgence vitale que représente l'IDM. Conclusion : Les connaissances des patients réunionnais sur l'IDM sont déficitaires, particulièrement chez ceux à haut risque cardiovasculaire. Une éducation des patients à haut risque pourrait être utile afin d'améliorer leurs connaissances, dans l'espoir de réduire les délais de prise en charge en cas d'IDM.

Sujets: Infarctus du myocarde -- Réunion

Éducation des patients

Symptômes

Titre : La reconstruction endoscopique du ligament anatomique est une option fiable pour traiter l'instabilité chronique de la cheville latérale.

Auteur : Ovigue, Jordan (1990-....)

Directeur de thèse : Cordier, Guillaume

Spécialité : Médecine générale

Date: 2020

Nombre de pages : 38

Bibliographie: 53 références

Résumé: Introduction: La reconstruction anatomique du ligament talofibulaire antérieur et du ligament calcanéo-fibulaire est un traitement fiable de l'instabilité chronique de l'arrière-pied. Le but de cette étude était d'étudier les résultats de cette procédure effectuée par une technique endoscopique. Méthodes : Cette étude est une évaluation rétrospective d'une base de données prospective. Les sujets étaient tous des patients ayant subi une reconstruction endoscopique du ligament latéral entre 2013 et 2016. Tous les patients présentaient des symptômes d'instabilité de la cheville avec test de stress manuel positif et échec du traitement conservateur pendant au moins 6 mois. Lors du suivi final, les résultats ont été évalués à l'aide du score visuel analogique (VAS), du score AOFAS (American Orthopaedic Foot and Ankle Society) et des scores de Karlsson – Peterson. Résultats : Après un suivi moyen de 31,5 ± 6,9 mois, tous les patients ont rapporté une amélioration significative par rapport à leur statut préopératoire. Le score AOFAS préopératoire est passé de 76,4 ± 15 à 94,7 ± 11,7 en postopératoire (p = 0,0001). Le score Karlsson – Peterson préopératoire a augmenté de 73,0 ± 16,0 à 93,7  $\pm$  10,6 en postopératoire (p = 0,0001). Le score VAS s'est amélioré de 1,9  $\pm$  2,5 à 0,8 ± 1,7 (p <0,001). Deux patients avaient des plaintes d'instabilité récurrente. Conclusion : La reconstruction ligamentaire endoscopique pour l'instabilité chronique de la cheville latérale est une procédure sûre et donne de bons résultats cliniques avec un minimum de complications. En outre, l'approche endoscopique permet une évaluation de l'articulation de la cheville et le traitement des lésions.

Sujets: Cheville (anatomie) -- Chirurgie

Cheville (anatomie) -- Lésions et blessures -- Chirurgie

Ligaments -- Chirurgie

Ligaments -- Lésions et blessures -- Chirurgie

Ténodèse

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02978449">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02978449</a>

Titre : Efficacité des outils de prévention primaire des violences sexuelles au cours des études supérieures : revue systématique de littérature.

Auteur : Picard, Marine (1989-....)

Directeur de thèse : Coutellier, Martin

Spécialité : Médecine générale

Date: 2020

Nombre de pages : 121

Bibliographie: 166 références

Résumé: Introduction: Les violences sexuelles ont une forte prévalence à l'université, en particulier dans les facultés de médecine. Les efforts de prévention se multiplient mais semblent insuffisants. Objectif principal: répertorier les outils de prévention primaire des violences sexuelles dans l'enseignement supérieur, au regard du meilleur niveau d'efficacité défini par l'Organisation Mondiale de la Santé, c'est-à-dire permettant une réduction de la victimisation et de déterminer les outils les plus efficaces. Méthode : Revue systématique de la littérature sur l'efficacité des outils de prévention primaire des violences sexuelles dans l'enseignement supérieur, publiée jusqu'en juin 2020. Exclusion des études qualitatives. Recherche effectuée dans trois bases de données (PUBMED, EMBASE, PSYCINFO). Résultats : Inclusion de 33 articles parmi 2741 articles sélectionnés, correspondant à l'analyse de 26 outils de prévention. Il n'existe aucune étude européenne et seulement quatre études ont été réalisées dans des facultés de médecine. La prévention des violences sexuelles se fait principalement au niveau individuel et secondairement au niveau communautaire, par la lutte contre le harcèlement sexuel et le mésusage de l'alcool. Les interventions multiples, de durées plus longues, menées par un animateur spécialisé semblent les plus efficaces. Aborder le thème de la sexualité et dispenser des interventions sous forme d'entretien motivationnel et de rétroaction personnalisée permettrait de diminuer la prévalence des violences sexuelles. Conclusion : Des outils de prévention des violences sexuelles ont démontré leur efficacité et devraient être mis en place dans les universités.

Sujets: Violences sexuelles -- Enseignement supérieur

Violences sexuelles -- Prévention

Violence en milieu scolaire

Titre: Implication et retentissement perçu du père et de la mère dans la prise en charge globale d'un enfant ou adolescent diabétique de type 1 âgé de moins de 18 ans à La Réunion.

Auteur: Pougnet, Julie (1992-....)

Directeur de thèse : Pigeon-Kherchiche, Patricia

Spécialité : Médecine générale

Date: 2020

Nombre de pages : 91

Bibliographie : 122 références

**Résumé** : PDF

Résumé : Introduction : Le diabète de type 1 (DT1) est une pathologique chronique contraignante dont l'incidence est en constante augmentation depuis plusieurs années. Il bouleverse le quotidien des parents qui sont au premier plan de la prise en charge. L'objectif primaire de cette étude est de décrire l'implication et le retentissement perçu du père et de la mère des enfants et adolescents diabétiques de type 1 (EADT1) de moins de 18 ans à La Réunion. Les objectifs secondaires sont de réaliser des comparaisons entre les réponses des groupes pères et mères et de réaliser des analyses de comparaison entre les taux d'HbA1c des EADT1 et les réponses des parents. Méthode : Il s'agit d'une étude observationnelle descriptive transversale réalisée par entretiens directifs sous forme de questionnaire par téléphone auprès des parents des EADT1 suivis sur le CHU Félix Guyon, le GHSR et le CHOR. Le questionnaire était à réponses fermées et abordait les différents domaines de la prise en charge du DT1. Ont été inclus dans l'étude, tous les pères et mères (ou figures maternelles ou paternelles) d'un EADT1 de moins de 18 ans résidant à La Réunion, avec un diagnostic de DT1 posé depuis au moins un an. Ont été exclus de l'étude, les parents mineurs, les majeurs protégés, toutes personnes ne maîtrisant pas la langue française ou ne pouvant répondre au questionnaire pour raison médicale ou judiciaire. Certains résultats ont été analysés en fonction de strates d'âge (< 7 ans, 7- 13 ans, ≥ 13 ans) qui correspondent à des degrés d'autonomie différents. Le relevé de données s'est fait sur la période du 6 juillet 2020 au 17 août 2020. 208 parents ont été contactés pour obtenir 93 réponses de mères (dont 4 refus) et 89 réponses de pères (dont 20 refus). Résultats : La mère était la principale personne à contacter dans 65 % des dossiers médicaux. 60,8 % des parents ne connaissaient pas le dernier taux d'HbA1c de leur enfant avec une différence significative entre le groupe mère et père (49,4 % des mères ne connaissaient par le dernier taux d'HbA1c versus 75,4 % des pères, p-value 0,003). Concernant la gestion du traitement, la mère est principalement impliquée dans sa prise en charge au quotidien dans la strate d'âge < 7 ans avec une autonomisation progressive de l'enfant entre la deuxième et la troisième strate d'âge quelque soit le type de traitement (pompe à insuline ou multi-injections). Respectivement 55,1 % des mères versus 20,3 % des pères déclarent préparer dans « 100 % des cas » les repas pris à la maison (p-value < 0,001). 79,1 % des parents interrogés partagent toujours les repas pris à la maison avec leur enfant sans différence significative entre le groupe

père et mère (83,1 % des mères versus 73,9 % des pères, p-value 0,075). Les mères effectuent plus fréquemment les modifications de dose d'insuline en fonction des variations glycémiques liées à l'activité physique (58,4 % des mères versus 36,2 % des pères, p-value 0,006). Concernant les consultations chez le diabétologue, pédiatre, médecin généraliste ou hospitalisations, les mères étaient significativement plus présentes que les pères. L'évaluation du retentissement perçu de la maladie a mis en évidence une inquiétude permanente sans différence significative entre les pères et les mères. Les mères ressentent une implication significativement plus importante que les pères dans la gestion du diabète [mères : 9,1/10 (ds : 1,628) – pères : 6,6/10 (ds : 2,6), p-value < 0,001]. Les pères déclarent avoir moins confiance en eux concernant la gestion du traitement avec une différence significative avec le groupe mères [pères : 7,4/10 (ds : 2,0) - mères : 8,4/10 (ds : 1,5), p-value < 0,001]. 47,2 % des mères et 24,6 % des pères déclarent avoir un sommeil altéré depuis le diagnostic de DT1 avec une différence significative entre les deux groupes (p-value : 0,004). Conclusion : Les mères sont souvent au premier plan de la prise en charge des EADT1. Il serait pertinent de réaliser des études prospectives sur de plus grands effectifs et d'envisager la mise en place d'aide et de soutien pour ces familles.

Sujets: Enfants diabétiques -- La Réunion (France; île)

Diabètes -- Thérapeutique-- La Réunion (France; île)

Titre : Etude sur le vécu et les difficultés rencontrées par des personnes endeuillées par le suicide récent (moins de 3 mois) d'un proche à la Réunion.

Auteur : Raison, Morgane (1989....) Directeur de thèse : Gokalsing, Erick

Spécialité : Médecine générale

Date: 2020

Nombre de pages : 113

Bibliographie: 88 références

Résumé : Introduction : Le suicide est un problème de santé publique, du fait du nombre de décès évitables qu'il entraine. A la Réunion, en moyenne 100 personnes décèdent par suicide chaque année. Le deuil pour ceux qui restent est inattendu, brutal et violent. Il nous questionne donc sur la façon dont il est vécu et les difficultés entrainées. Dans le but de pouvoir améliorer la postvention en suicidologie, il est important de mieux comprendre comment les endeuillés du suicide traversent cette épreuve. L'objectif principal de notre étude a été de mettre en avant les difficultés rencontrées à 3 mois du décès de leur proche. Méthode : Une enquête qualitative a été réalisée, basée sur des entretiens individuels semi-dirigés. Les participants sont volontaires, majeurs et ont perdu un proche au 1er degré par suicide depuis 3 mois, à la Réunion. Les participants ont été appelés et il leur a été proposé de participer à l'étude après recueil de leurs coordonnées via l'institut médico-légal ou la cellule d'urgence médicopsychologique. Résultats : 6 personnes ont participé à l'étude. Même si les vécus du deuil sont uniques, on retrouve une symptomatologie dépressive récurrente ainsi que des signes de stress post-traumatique. Certains éléments comme la culpabilité, les questionnements et l'incompréhension sont assez spécifiques du deuil post suicide. Des difficultés particulières ont été mises en avant comme le manque de soutien professionnel et d'informations initiales, ainsi que des difficultés à gérer l'annonce et les comportements de deuil des enfants. Par ailleurs, même présent, le soutien familial semble insuffisant dans ce deuil particulier. Nombreux sont ceux qui y allient une prise en charge professionnelle, ou en sont demandeurs. Conclusion : L'étude montre qu'il serait nécessaire pour pallier aux difficultés initiales des endeuillés postsuicide de mettre en place des mesures de soutien professionnelle dès l'annonce du décès de leur proche. Il semble également important de pouvoir communiquer auprès d'eux les diverses possibilités d'accompagnement existantes.

**Sujets :** Suicide -- La Réunion (France ; île)

Suicide -- Prévention -- La Réunion (France ; île)

Connaissances, attitudes et pratiques en santé -- La Réunion (France ; île)

Lien vers la ressource : <u>Intranet de l'Université (accès restreint)</u>

Titre : Représentations des femmes nullipares à la Réunion sur la contraception par dispositif intra-utérin.

Auteur: Roger, Marion (1992-....)

Directeur de thèse : Thore, Emmanuelle

Spécialité : Médecine générale

Date: 2020

Nombre de pages : 102

Bibliographie: 75 références

Résumé: Introduction: La Réunion est composée d'une population jeune présentant une grande précarité et un faible niveau d'étude avec une sexualité précoce et un recours aux interruptions volontaires de grossesse bien plus élevé qu'en Métropole (21,8 IVG pour 1000 femmes à la Réunion en 2018 contre 15 pour 1000 femmes en Métropole). La tranche d'âge la plus concernée par les IVG se situe entre 20-29 ans, la majorité se produisant sous couverture contraceptive et particulièrement sous pilule qui est la méthode contraceptive la plus utilisée chez ces femmes. Malgré une bonne offre de soin sur l'ile, l'utilisation du DIU par les femmes nullipares reste faible alors que celui-ci est 2 fois plus efficace en pratique courante que la pilule. L'objectif de cette étude était d'identifier les freins à l'utilisation du DIU chez les femmes nullipares réunionnaises ainsi que de connaître leur source de jugement et de proposer des pistes afin de faire évoluer la contraception à la Réunion. Méthode : Il s'agit d'une étude qualitative réalisée par des entretiens semi-dirigés auprès de femmes nullipares majeures à la Réunion. L'analyse des données s'est faite selon les principes de la théorisation ancrée. Résultats et discussion : L'étude a été réalisée entre août et octobre 2019 auprès de 25 femmes nullipares majeures à la Réunion. L'utilisation du DIU était conditionnée avant tout par le niveau de connaissances sur la contraception, celui-ci étant étroitement lié au niveau socioprofessionnel ou au vécu des femmes de par leur âge ou leur expérience contraceptive. Les femmes de niveau socio-professionnel élevé ou ayant une bonne connaissance sur la contraception mettaient en valeur un certain nombre d'avantages à cette méthode tandis que les femmes très jeunes ou de niveau socio-professionnel bas ne voyaient que des freins à l'utilisation du DIU, principalement subjectifs véhiculés par les a priori de l'entourage familial et amical. Conclusion : Les freins principaux à l'utilisation du DIU identifiés dans notre étude sont le manque de connaissance sur cette méthode contraceptive et la surestimation de la douleur à la pose. Pour pallier cela, le médecin généraliste et le système scolaire ont un rôle primordial d'information dès l'adolescence. Afin d'encourager cette méthode contraceptive, il parait important d'en améliorer les conditions de pose en valorisant l'information sur la méthode de pose, la position gynécologique en décubitus latéral respectant plus l'intimité des femmes, l'utilisation d'hypnose, de méopa ou de détournement d'attention durant la pose et le recours à la méthode directe de pose dite « en torpille » plus rapide et moins douloureuse pour les jeunes femmes.

Sujets: Contraception -- La Réunion (France; île)

Femmes nullipares -- La Réunion (France ; île)

Dispositifs intra-utérins -- La Réunion (France ; île)

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03019305">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03019305</a>

Titre : Quel est le vécu des médecins généralistes quand il leur est demandé de remplir des documents socio-administratifs ?

Auteur : Rouault, Sandra (1991-....) Directeur de thèse : Leruste, Sébastien

Spécialité : Médecine générale

Date: 2020

Nombre de pages : 60

Bibliographie: 33 références

Résumé: Introduction: Les médecins généralistes en France ont une activité médicale qui comporte un volet socio-administratif. Cette charge administrative est décrite comme lourde mais il n'y a pas d'étude à ce jour qui étudie le vécu des médecins. L'objectif de cette étude était d'explorer le vécu des médecins généralistes quand ils sont confrontés à ces documents socio-administratifs demandés par leurs patients. Méthode : Étude qualitative par entretiens compréhensifs, individuels, menés auprès de médecins généralistes thésés en France et Outremer. L'analyse des données utilisait le principe de la phénoménologie. Résultats : Onze médecins ont été interrogés entre février et mai 2019. Le vécu des médecins était unanime sur le caractère chronophage, compliqué, inintéressant, dévalorisé des documents socioadministratifs, mais ils décidaient de le vivre plus ou moins bien en fonction des rôles et de leurs représentations, ainsi que des valeurs qui les sous-tendent. Ainsi, ceux qui se voulaient protecteurs pour leurs patients et empathiques vivaient mieux la charge de travail administrative, et insistaient sur les conséquences sociales et financières que ces documents avaient pour les patients. Le vécu dépendait aussi des relations qu'entretenaient les médecins avec les autres acteurs de soin, la sécurité sociale, leurs confrères, ainsi que de la relation de confiance qu'ils nouaient avec les patients. Conclusion : Le vécu des médecins était mixte, mitigé, complexe et dépendait de multiples facteurs intrinsèques et extrinsèques aux médecins. Il serait intéressant d'étudier ces facteurs spécifiquement, et d'évaluer de vécu à plus grande échelle puis de manière quantitative afin de proposer des améliorations des conditions de travail des médecins.

**Sujets:** Actes administratifs

Médecins généralistes

Sécurité sociale -- Médecins

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02650444">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02650444</a>

Titre : Prévalence et facteurs de risque des infections sexuellement transmissibles à gonoccoque la Réunion.

Auteur: Saib, Amélie (1990-....)

Directeur de thèse : Bertolotti, Antoine

Spécialité : Médecine générale

Date: 2020

Nombre de pages: 62

Bibliographie : 51 références

Résumé : Objectif : Déterminer la prévalence des infections sexuellement transmissibles (IST) à Neisseria gonorrhoeae (Ng), ses facteurs de risque à la Réunion et l'antibiorésistance associée. Méthodes : Recueil des données chez les individus ayant consulté en centre de dépistage entre janvier 2017 et décembre 2018, à partir d'un auto-questionnaire standardisé et une PCR multiplex sur prélèvements biologiques. Résultats : La prévalence de Ng dans la population générale (N=4289) était de 2,8% (IC 95% [2,3-3,3]). Les mineurs étaient les plus atteints (4,4%, IC 95% [2,6-7]). Les principaux facteurs de risque identifiés tout site confondu, étaient l'âge (< à 18 ans, p=0,03), la précarité (p=0,002), lesantécédents d'IST (p=0,006). Toutes les souches testées étaient sensibles à la ceftriaxone. Conclusion : La prévalence des infections à Ng reste élevée à la Réunion tout comme dans le reste du monde. Il convient ainsi de renforcer la prévention et le dépistage avec un effort prononcé en milieu scolaire.

Sujets: Maladies sexuellement transmissibles -- La Réunion (France; île)

Gonocoque -- La Réunion (France ; île)

Résistance aux antibiotiques -- La Réunion (France ; île)

Titre: Évaluation de la concordance entre la lecture de l'urgentiste et du radiologue pour les radiographies en traumatologie des membres aux urgences du CH de Saint Benoit.

Auteur : Szwarc-Ronda, Antoine (1991-....)

Directeur de thèse : Marchal, Christophe

Spécialité : Médecine générale

Date: 2020

Nombre de pages : 56

Bibliographie : 30 références

Résumé: Introduction: Aux urgences du GHER, les radiographies prescrites par les médecins urgentistes ne sont interprétées par les radiologues qu'après la sortie du patient. Cette étude a donc pour objectif d'évaluer la concordance entre le diagnostic de l'urgentiste et celui du radiologue. Elle évalue le retentissement pour le patient des discordances si elles existent et également indirectement le protocole qualité mis en place aux urgences. Méthode : Il s'agit d'une étude rétrospective monocentrique au Centre hospitalier de Saint Benoit réalisée entre le 01/07/2017 et le 31/08/2017. Ont été inclus tous les patients ayant consultés pour un motif de traumatologie des membres et ayant eu au moins une radiographie de prescrite. Les dossiers informatisés nous ont permis de comparer le diagnostic de l'urgentiste et du radiologue et de suivre la prise en charge à distance de la sortie des urgences. Nous avons utilisés l'indice de kappa de Cohen pour étudier la concordance inter-observateur. Résultats : Nous avons inclus 534 dossiers, parmi ces dossiers nous avons retrouvés 26 dossiers discordants soit 4,7% de l'ensemble des dossiers, 19 faux positifs et 7 faux négatifs. La concordance est de 0,8694. Il y a significativement plus de radiographies de pied discordants par rapports à tous les autres. De manière significative, il y a plus d'erreurs chez les < 15 ans que chez les patients > 15 ans. Aucun dossier discordance n'a entrainé de modification de prise en charge ou de retentissement pour le patient. Conclusion : La concordance entre la lecture de l'urgentiste et celle du radiologue est presque parfaite selon la définition du Kappa de Cohen. Malgré tout l'âge < 15 ans et la localisation du pied sont des facteurs prédictifs de discordance. Il paraitrait donc intéressant d'apporter une attention particulière à ces dossiers lors de l'interprétation radiographique.

Sujets: Médecine d'urgence -- Soins hospitaliers -- Saint-Benoît (Réunion)

Radiographie médicale

Traumatologie -- Saint-Benoît (Réunion)

Radiologues -- Saint-Benoît (Réunion

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02983737">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02983737</a>

Titre: Cartographie des maîtres de stage des universités dans la subdivision

Océan Indien.

Auteur: Tadjou, Sami (1990-....) Directeur de thèse : Domercq, Alain

Spécialité : Médecine générale

Date: 2020

Nombre de pages: 104

Bibliographie: 50 références

Résumé: INTRODUCTION: Le stage ambulatoire est essentiel pour la formation des internes en médecine générale. L'objectif était de réaliser une cartographie des terrains de stage ambulatoires pour aider les internes dans le choix de stage. MÉTHODE : Il s'agit d'une étude descriptive observationnelle transversale réalisée auprès des MSU agréés au 11 mars 2019 dans la subdivision Océan Indien. Cette enquête a permis de recueillir des données sociodémographiques, des données relatives au cabinet, à l'organisation du stage, à l'exercice de la médecine et aux spécificités en matière de formation. RÉSULTATS : 168 MSU ont étés inclus, 118 réponses ont été analysées. Il y avait 63,6% d'hommes, l'âge moyen était de 51 ans, la région d'exercice majoritaire était le sud-ouest avec 55.97% des MSU. Il y avait 75,4% de cabinets de groupe, 9,3% de CSNP, 9,3% de PMI.79,7% des internes pouvaient participer à des visites si leur MSU en faisait. 98,3% des MSU effectuaient des actes techniques. 53,1% des internes de niveau 1 avaient une salle de consultation dédiée de même pour 85,8% des SASPAS. Les MSU ayant débuté entre 0 et 5 ans avaient un bassin d'exercice statistiquement différent (p=0,046) des MSU ayant débuté il y a plus de 5 ans. CONCLUSION : Il y a un net déséquilibre du nombre de MSU entre les différentes régions de la subdivision Océan Indien. Certains MSU ont des exercices spécifiques en rapport avec le type de cabinet dans lequel ils exercent. Une carte interactive d'une part et un site web dédié sécurisé d'autre part regroupant les informations obtenues ont été créés au profit des IMG, du DUMG et du CGEOI.

Sujets: Maîtres de stage des universités -- La Réunion (France; île)

Maîtres de stage des universités -- Mayotte

Internes (médecine) -- La Réunion (France ; île)

Internes (médecine) -- Mayotte

Médecine générale -- La Réunion (France ; île)

Médecine générale -- Mayotte

Titre : Médecines alternatives et complémentaires et lombalgie commune, le point de vue des Internes de médecine générale (IMG) de La Réunion.

Auteur : Verrière, Thomas (1990-....)

Directeur de thèse : Leruste, Sébastien

Spécialité : Médecine générale

Date: 2020

Nombre de pages : 55

Bibliographie: 48 références

Résumé: Introduction: La lombalgie est le second motif de consultation chez le médecin généraliste, et depuis 2019 la Haute Autorité de santé (HAS) propose les Médecines alternatives et complémentaires (MAC) en seconde intention dans la prise en charge des lombalgies communes (LC). L'objectif de ce travail était d'estimer le recours aux MAC et de décrire les difficultés d'utilisation des IMG de La Réunion. Méthode : Étude descriptive transversale. Le recrutement a été réalisé par courriel parmi les internes inscrits au Diplôme d'études spécialisées (DES) de médecine générale de l'université de La Réunion. Le recueil des données était effectué à l'aide d'un auto-questionnaire informatisé. L'analyse descriptive des données a été effectuée à l'aide du logiciel R®. Résultats : Le taux de recours aux MAC par les IMG dans la lombalgie commune était de 72,2 %(39/54). Le degré de satisfaction global de prise en charge des LC était significativement supérieur dans le groupe utilisant les MAC (6,4/10 vs 5,6/10 ; p < 0,05). 96,3 % (52/54) des IMG ont souhaité recevoir une formation sur les MAC durant leur cursus universitaire. Conclusion: La satisfaction dans la prise en charge des LC, apparaît dans notre étude être significativement améliorée par l'utilisation des MAC. La mise en place d'un enseignement universitaire sur l'utilisation des MAC serait à même de répondre à un besoin largement exprimé par les IMG de La Réunion et permettrait de mieux encadrer une pratique déjà existante chez une majorité d'entre eux.

Sujets: Lombalgie -- La Réunion (France; île)

Internes (médecine) -- La Réunion (France ; île)

Médecine générale -- La Réunion (France ; île)

Médecines alternatives -- La Réunion (France ; île)

Titre: Caractéristiques cliniques et épidémiologiques des patients dépistés pour la COVID-19 au CHU de Saint-Pierre à l'île de La Réunion du 23 mars au 10 mai 2020.

Auteur : Accot, Frédéric (1989-....)

Directeurs de thèse : Andry, Fanny ; Bertolotti, Antoine

Spécialité : Médecine générale

Date: 2021

Nombre de pages : 73

Bibliographie: 84 références

Résumé: Introduction: Lors de la première vague épidémique liée au nouveau coronavirus (COVID-19), dans un contexte insulaire, il était important de cibler les patients à dépister afin de freiner l'introduction du virus sur le territoire. Notre objectif était de décrire les caractéristiques épidémiologiques et cliniques des patients dépistés pour la COVID-19 pendant le premier confinement. Patients et Méthodes: Pendant la période de confinement de mars à mai 2020, nous avons décrits les patients venus se faire dépister pour la COVID-19 dans notre centre hospitalo-universitaire ainsi que les patients testés positifs. Résultats: L'âge moyen était de 39,4 ans. Les patients présentaient souvent des comorbidités (32,4%) et étaient principalement symptomatiques (75,2 %). Le taux de positivité était de 6,8 %. Ce taux était significativement augmenté en cas de retour de voyage le dernier mois, en cas de contage prolongé avec un voyageur. Le taux de positivité était statistiquement associé à la présence d'une anosmie et d'une agueusie. Conclusion: Les patients dépistés positifs à la COVID-19 en début d'épidémie étaient plutôt jeunes, souvent symptomatiques et de retour de voyage ou ayant été en contact avec des patients positifs symptomatiques.

Sujets : Covid-19 -- Épidémiologie -- La Réunion (France ; île)

Covid-19 -- Dépistage -- La Réunion (France ; île)

Voyages -- Aspect médical -- La Réunion (France ; île)

Médecine générale -- La Réunion (France ; île)

Titre : Quels sont les représentations, motivations et freins face à la prévention solaire chez les parents d'élèves à La Réunion ?

Auteur: Ah-Mouck, Cassie (1993-....)

Directeurs de thèse : Bertolotti, Antoine ; Leruste Sébastien

Spécialité : Médecine générale

Date: 2021

Nombre de pages : 103

Bibliographie : 56 références

Résumé : Importance : L'incidence du mélanome cutané est en augmentation à La Réunion rejoignant ainsi les plus fortes incidences mondiales. Le facteur de risque principal du mélanome est l'exposition solaire pendant l'enfance. Or la prévention solaire reste insuffisante dans les écoles à La Réunion. Objectif: Explorer les représentations, les freins et les motivations face à la protection solaire chez les principaux acteurs de la protection solaire des enfants : leurs parents, les enseignants et les enfants eux-mêmes. Méthode : Étude qualitative par entretiens individuels semi-dirigés chez 14 enfants d'école primaire à La Réunion, 13 parents d'élèves et 13 enseignants. Les données ont été collectées de septembre 2019 à novembre 2020. La suffisance théorique des données a été recherchée. Les entretiens ont été enregistrés, retranscrits, codés, triangulés, analysés puis modélisés utilisant le principe de théorisation ancrée. Résultats : L'ensemble des 40 participants ont exprimé leurs habitudes de protection qui variaient selon leur exposition solaire. La protection était moindre lors des activités quotidiennes y compris en période scolaire. Les contraintes pratiques et financières étaient identifiées par les parents. Les enseignants relevaient le manque de moyens avec des infrastructures inadaptées et une absence de formation. Par ailleurs, la responsabilité de la protection des enfants était un point de désaccord entre parents et enseignants. Les enfants limitaient l'application des mesures protectrices principalement par manque de confort. Conclusion : La protection solaire des enfants en milieu scolaire est sous la responsabilité à la fois scolaire, parentale et sociale. Une amélioration de la communication entre les acteurs scolaires et les parents est nécessaire. Des campagnes de prévention et un aménagement des lieux de vie scolaire pourraient permettre à une meilleure protection de la population infantile.

Sujets: Rayonnement ultraviolet -- prévention et contrôle -- La Réunion (France ; île)

Rayonnement solaire -- Effets physiologiques

Risques pour la santé -- Communication

Médecine préventive

Médecine scolaire

Enfants -- Maladies -- Prévention

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03325611">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03325611</a>

Titre : Dépistage des IST chez les patients âgés de 15 à 25 ans : pratiques des médecins généralistes à la Réunion.

Auteur : Bade, Laurie (1988-....)

Directeur de thèse : Gomard, Philippe

Spécialité : Médecine générale

Date: 2021

Nombre de pages : 60

Bibliographie: 38 références

**Résumé** : Introduction : Les données épidémiologiques existantes sur les infections sexuellement transmissibles (IST) à la Réunion sont basées sur l'activité dans les centres de dépistages, donc non représentatives de la population et de l'activité en médecine générale. L'objectif principal était d'estimer la proportion de prescription d'un dépistage des IST chez les moins de 25 ans en cabinet de médecine générale sur une année. L'objectif secondaire était de déterminer les critères ayant motivé la prescription d'un dépistage. Méthodes : Etude descriptive, transversale, rétrospective qui a été menée dans 3 cabinets de 6 médecins généralistes de l'île. L'échantillonnage a été réalisé par extraction de données sur logiciels informatiques, en sélectionnant les patients âgés de 15 à 25 ans ayant consulté dans l'un de ces cabinets entre octobre 2018 et octobre 2019. Résultats : 1038 patients ont été inclus dont 63% de femmes. 21% des patients ont eu une recherche d'IST complète ou partielle. 36% des bilans prescrits étaient exhaustifs : prescription combinée des sérologies (VIH,VHB,VHC,TPHA) et des PCR (CT et NG). L'infection à CT a été l'IST la plus fréquemment retrouvée (18 PCR positives). Les prescriptions d'un dépistage IST étaient principalement réalisés sur la présence de signes cliniques ou à la demande du patient (37% et 22% respectivement). Conclusion : Cette étude met en évidence une proportion insuffisante de dépistage des IST, par rapport aux recommandations nationales. Peu de dépistages sont prescrits chez les patients asymptomatiques.

Sujets: Maladies sexuellement transmissibles -- Dépistage

Médecins généralistes

Titre : Freins et motivations des médecins généralistes réunionnais dans la prévention des troubles du spectre de l'alcoolisation fœtale.

Auteur: Baelen, François (1990-....)

Directeurs de thèse: Spodenkiewicz, Michel (1983-....); Leruste Sébastien

Spécialité : Médecine générale

Date: 2021

Nombre de pages : 96

Bibliographie: 51 références

Résumé: Introduction: Les troubles du spectre de l'alcoolisation fœtale (TSAF) représentent la première cause de retard mental d'origine non génétique. Les atteintes sont irréversibles et nécessitent un accompagnement tout au long de la vie. Cette cause est évitable. Le médecin généraliste (MG) semble avoir un rôle important dans la prévention des TSAF. Pourtant, l'Agence régionale de santé signale des lacunes dans le repérage des consommations d'alcool notamment chez les femmes enceintes, ainsi qu'un manque d'adhésion aux formations proposées sur les TSAF. Méthode : Une recherche qualitative a été réalisée par entretiens individuels semi-dirigés. L'échantillonnage et le recrutement des MG a été réalisé de manière aléatoire et complété par « effet boule de neige ». Etaient exclus les MG qui exerçaient en structure de soins non programmés exclusifs. Après retranscription, l'analyse des verbatim a été réalisée selon les principes de la théorisation ancrée. Résultats : Vingt entretiens ont été réalisés entre novembre et décembre 2020 par deux enquêteurs. Les MG exprimaient des difficultés dans l'abord même de l'alcool et dans la prise en charge d'une consommation excessive. Ils avaient des connaissances théoriques imprécises sur les TSAF et un manque d'expérience pratique vis-à-vis des TSAF. Il persistait un tabou concernant l'alcool au féminin, tant chez la patiente que chez le MG. Les politiques contradictoires de l'Etat étaient pointées du doigt : campagnes de prévention des TSAF timides par rapport à la promotion de l'alcool. Conclusion : Inciter les MG à ouvrir le dialogue avec la femme et le couple sans tabou par un repérage précoce et une intervention brève. Mieux former les professionnels et clarifier le parcours de soin.

Sujets: Alcoolisme -- Chez la femme enceinte -- La Réunion (France; île)

Médecins généralistes -- La Réunion (France ; île)

Alcoolisme -- Prévention -- La Réunion (France ; île)

Syndrome d'alcoolisme foetal -- La Réunion (France ; île)

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03428836">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03428836</a>

Titre : Les infiltrations à La Réunion : étude des pratiques professionnelles des médecins généralistes libéraux.

Auteur : Baranger, Laura (1992-....)

Directeur de thèse : Lemarchand, Bruno

Spécialité : Médecine générale

Date: 2021

Nombre de pages : 47

Bibliographie: 43 références

Résumé : Introduction : Les consultations en rapport avec les maladies ostéoarticulaires et les troubles musculosquelettiques sont fréquentes en médecine générale. Elles représentent environ 9% des diagnostics et se placent au troisième rang des motifs de consultations après les pathologies cardiovasculaires et pneumologiques. Il existe une prévalence variable de la pratique des infiltrations en médecine générale en France métropolitaine. Elle varie de 35% à 64% selon les études réalisées dans différentes régions ces dernières années. Aucune étude sur les infiltrations articulaires n'a été réalisé à La Réunion. L'objectif principal de cette étude est de décrire la pratique des infiltrations articulaires en médecine générale à La Réunion. Méthode : Il s'agit d'une enquête épidémiologique transversale, élaborée à partir d'un questionnaire numérique. La population cible de cette étude regroupe tous les médecins généralistes libéraux exerçant sur le territoire du Département d'Outre-Mer de la Réunion. L'analyse statistique descriptive de cette étude a été réalisé sur la base des recommandations STROBE. Résultats : Cent soixante-cinq médecins ont répondu à ce questionnaire soit environ 20% des médecins généralistes libéraux de La Réunion. La population ayant répondu au questionnaire est hétérogène. La majorité des médecins ayant répondus exercent en cabinet de groupe et dans une zone de haute densité médicale. La prévalence des médecins généralistes qui réalisent des infiltrations à la Réunion est de 15.8%. La majorité des médecins qui infiltrent sont masculins de manière significative. Conclusion : La prévalence de la réalisation des infiltrations à la Réunion en médecine générale est faible en comparaison avec certains territoires métropolitains. La mise en valeur d'une faible réalisation locale informe sur la nécessité d'adapter les besoins en fonction de la demande. L'éloignement géographique et l'organisation des soins est probablement responsable de cette répartition spécifique.

Sujets: Injections -- La Réunion (France ; île)

Médecins généralistes -- La Réunion (France ; île)

Articulations -- Maladies -- La Réunion (France ; île)

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03428904">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03428904</a>

Titre : Continuité des soins des réunionnais durant le premier confinement lors de la crise sanitaire de la Covid-19 du point de vue de la population de l'Ile de la Réunion.

Auteur : Barjon, Clarisse (1991-....) Directeur de thèse : Legrand, Florian

Spécialité : Médecine générale

Date: 2021

Nombre de pages : 139

Bibliographie: 44 références

Résumé : Introduction : Durant le premier confinement de la crise sanitaire liée à la Covid-19, la continuité des soins de la population a pu être interrompue. L'objectif de cette étude a été de décrire la continuité des soins de la population réunionnaise du 17 mars 2020 au 11 mai 2020.Méthode : Un auto-questionnaire adapté à la médecine ambulatoire et destiné à la population réunionnaise a été élaboré dans ce but puis diffusé en ligne du 17 juin 2020 au 17 juillet 2020 en comparant la perception de la continuité des soins entre la période du premier confinement à la période précédant celui-ci. Les critères d'évaluations étaient l'accès aux services, les interactions médecin-patient, les interactions avec les autres professionnels de santé, l'autoresponsabilisation du patient et la communication. Résultats : 296 répondants ont été inclus dans notre étude parmi les 300 répondants. Pendant le confinement : une annulation des consultations médicales, des difficultés à consulter le médecin traitant, et à accéder aux différents prestataires de service (laboratoires et centres d'imageries) et autres professionnels de santé (médecins spécialistes, kinésithérapeutes, dentistes) ont été constatées ; malgré l'essor de la téléconsultation, le nombre de consultations à distance réalisées a été insuffisant pour répondre aux besoins de santé. Conclusion : Cette étude, en tenant compte de ses limites, a confirmé l'hypothèse d'une détérioration de la continuité des soins de la population réunionnaise durant le premier confinement lors de la crise sanitaire à la Covid-19.

Sujets: Continuité des soins -- La Réunion (France ; île)

Télémédecine -- La Réunion (France ; île)

Covid-19 -- La Réunion (France ; île)

Médecine générale -- La Réunion (France ; île)

Soins médicaux ambulatoires -- La Réunion (France ; île)

Titre : Déterminants du choix des femmes enceintes concernant le professionnel auquel elles confient leur suivi de grossesse.

Auteur: Bekka, Melissa (1991-....)

Directeur de thèse : Plaisantin, Guillaume

Spécialité : Médecine générale

Date: 2021

Nombre de pages : 105

Bibliographie: 44 références

**Résumé**: Introduction: Sages-femmes, médecins généralistes et gynécologues assurent tous le suivi prénatal mais la question du choix des couples concernant le professionnel qui suivra la grossesse interpelle peu. L'objectif de l'étude est d'identifier les déterminants de ce choix. Les objectifs secondaires sont de décrire les connaissances des patientes vis-à-vis des différents praticiens et de préciser la place du médecin généraliste dans le suivi obstétrical. Méthode : Une étude quantitative, transversale, descriptive a été réalisée d'octobre 2020 à janvier 2021 sur l'île de La Réunion par le biais d'un questionnaire distribué aux patientes enceintes se présentant pour l'échographie du premier trimestre. Parmi une liste de caractéristiques proposées, le taux de patientes ayant défini une caractéristique comme « déterminante » dans leur choix était le critère de jugement principal. Résultats : 323 questionnaires ont été analysés. Les compétences médicales et relationnelles du professionnel, sa pratique de l'échographie, du suivi médical ou gynécologique habituel se révèlent déterminantes pour plus de la moitié des patientes. L'étude révèle une franche méconnaissance des femmes vis-à-vis des praticiens. Le médecin généraliste, peu choisi, subit de plus fréquentes remises en question de ses compétences que ses confrères. Conclusion : Les patientes choisissent leur praticien pour des raisons similaires mais ce choix ne s'avère ni éclairé ni libre. L'information dispensée demeure insuffisante et inégale d'un professionnel à un autre. Il incombe à chacun de communiquer sur ses compétences en matière de suivi de grossesse et sur les types de suivis obstétricaux envisageables.

```
Sujets: Femmes enceintes -- Examens médicaux -- La Réunion (France; île)
```

Soins prénatals -- La Réunion (France ; île)

Grossesse -- La Réunion (France ; île)

Médecins généralistes -- La Réunion (France ; île)

Sages-femmes -- La Réunion (France ; île)

Obstétriciens -- La Réunion (France ; île)

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03380247">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03380247</a>

Titre : Connaissances des médecins généralistes libéraux installés à La Réunion en 2020 sur le repérage et le signalement des enfants en danger.

Auteur : Bellay, Florian (1991-...)

Directeur de thèse : Abrial, Françoise

Spécialité : Médecine générale

Date: 2021

Nombre de pages : 74

Bibliographie: 42 références

Résumé: Introduction : Le but de cette étude était d'évaluer la capacité des médecins généralistes à repérer et signaler un enfant en danger. Les objectifs secondaires étaient d'apprécier leurs connaissances concernant le maillage de la protection de l'enfance et leurs attentes envers les services de protection de l'enfance. Méthodes : Un questionnaire numérique anonyme a été diffusé auprès des médecins généralistes libéraux installés à La Réunion. Seuls les médecins généralistes installés étaient inclus dans l'étude. Un score évaluant la capacité des médecins généralistes à repérer et signaler un enfant en danger a été réalisé. Résultats : Le recueil des données s'est effectué du 22/05/2020 au 01/09/2020. Au total 761 médecins ont été sollicités et 75 ont répondu au questionnaire. Parmi les répondants, 20 médecins ont été exclus car ils n'avaient renseigné aucune réponse pour les questions relatives au score de connaissance. La moyenne obtenue au score de connaissance était de 5,82 sur 12, avec un écart-type de 2,72. La médiane était de 5,33. Parmi les participants, 39% ne connaissait pas les besoins fondamentaux d'un enfant et 84% des médecins ignoraient l'existence du médecin référent protection de l'enfance. Conclusion : Les connaissances des médecins généralistes leur permettant de repérer un enfant en danger et d'en alerter les autorités compétentes sont insuffisantes. Ce résultat montre que le déni et la méconnaissance du sujet persiste en dépit des réformes.

```
Sujets: Enfants -- Protection, assistance, etc. -- La Réunion (France; île)
```

Médecins généralistes -- La Réunion (France ; île)

Enfants maltraités -- Protection, assistance, etc. -- La Réunion (France ; île)

Enfants -- Violence envers -- La Réunion (France ; île)

Enfants -- Violence envers -- Signalement -- La Réunion (France ; île)

Titre: La visite de non-contre-indication à la pratique du trail en médecine générale: état des lieux des difficultés rencontrées par les médecins généralistes de l'île de La Réunion.

Auteur: Brénot, Mélanie (1992-....); Collineau, Damien (1993-....)

**Directeur de thèse :** Bouscaren, Nicolas

Spécialité : Médecine générale

Date: 2021

Nombre de pages : 81

Bibliographie: 93 références

Résumé: Introduction: Le trail est une discipline récente, en pleine expansion. L'obtention d'un certificat d'absence de contre-indication au trail délivré principalement par le médecin généraliste lors des visites de non-contre-indication au trail est nécessaire pour sa pratique en club ou en compétition. Peu d'étude dans la littérature évaluent le vécu des médecins généralistes lors de ces visites. Objectif principal : Évaluer les difficultés rencontrées par les médecins généralistes au cours des visites de non-contre-indication à la pratique du trail. Méthode : Nous avons réalisé une étude observationnelle descriptive, transversale, à l'aide d'un questionnaire dématérialisé. La population d'étude était composée de médecins généralistes libéraux, sur l'île de La Réunion. Le questionnaire évaluait les difficultés sur les différents thèmes abordés lors de ces visites, selon une échelle de Lickert. Résultats : Au total, 96 médecins généralistes étaient inclus. Ils rencontraient souvent ou toujours des difficultés principalement pour les thèmes cardiovasculaire (20.4%), digestif (18 %), thérapeutique et dopage (18 %) et locomoteur (13 %). Les médecins formés en médecine du sport rapportaient moins de difficultés que les autres concernant le thème cardiovasculaire (p=0.0074). Concernant leur formation en médecine du sport, 81 % des médecins interrogés, se déclaraient plutôt insatisfait ou pas du tout satisfait. Par ailleurs, 78 % souhaiteraient une formation complémentaire en médecine du sport. Conclusion : Les médecins généralistes rencontrent des difficultés lors des visites de non-contre-indication à la pratique trail. Devant leur demande de formation et les difficultés rencontrées, il semble pertinent de créer des supports d'aide à ces consultations et de développer leur formation.

Sujets: Course nature

Électrocardiographie

Médecins généralistes

Certificats médicaux

Consultation de prévention

Sportifs -- Examens médicaux

Titre: Évaluation des connaissances et des besoins de formation en nutrition et conseils nutritionnels chez les étudiants en troisième cycle de médecine générale de la subdivision de l'Océan Indien en 2020.

**Auteur :** Caussanel, Guillaume (1988-....) **Directeur de thèse :** Montée, Nicolas

Spécialité : Médecine générale

Date: 2021

Nombre de pages : 150

Bibliographie: 157 références

Résumé: Introduction: Les pathologies non transmissibles en lien avec l'alimentation progressent dans le monde depuis 50 ans. La Réunion et Mayotte sont des territoires d'Outre Mer Français sensibles sur ce point. Les médecins sont en première ligne des efforts de sensibilisation nutritionnelle, néanmoins, il n'y a pas d'étude à ce jour évaluant l'état des connaissances en nutrition chez les médecins généralistes en formation sur ces territoires. Objectif : Évaluer l'état des connaissances, les attitudes et pratiques au sujet de la nutrition dans la population des étudiants de troisième cycle de médecine générale de la subdivision Océan Indien ainsi que leurs envies et besoins de formation. Méthode : Une étude transversale descriptive a été réalisée sur la période de novembre 2020 à janvier 2021 par questionnaire auto-administré auprès de la population des étudiants de troisième cycle de médecine générale de la subdivision Océan Indien. Résultats : Le taux de participation chez les étudiants était de 26 %. Le score global moyen médian obtenu pour la partie connaissance était de 56,72/100 [50,23; 58,90]. Les participants réussissaient mieux les questions de « nutrition générale » que celles portant sur les « recommandations nutritionnelles » ou les « spécificités de La Réunion et Mayotte » (p<0,001). Seuls 9 % des participants se déclaraient suffisamment formés pour délivrer un conseil nutritionnel pertinent auprès de leurs patients. Les participants estimaient l'évaluation nutritionnelle comme importante pour 76,9 % et souhaitaient à 97 % se former à la nutrition et au conseil nutritionnel. Conclusion : Les étudiants en troisième cycle de médecine générale de l'Océan Indien rendent compte d'un manque de connaissance au sujet de la nutrition et du conseil nutritionnel et souhaitent être davantage formés.

Sujets: Éducation nutritionnelle -

Formation professionnelle

Internes (médecine)

Alimentation

La Réunion (France; île)

Mayotte

Titre : Les attentes et les besoins des adolescents sur l'abord de leur éducation affective et sexuelle par leur médecin traitant généraliste.

Auteur: Chatelain, Pauline (1993-....)

Directeur de thèse : Ottenwaelder, Christophe

Spécialité : Médecine générale

Date: 2021

Nombre de pages : 75

Bibliographie: 55 références

Résumé: Introduction: Malgré de nombreuses campagnes de prévention, le nombre d'interruption volontaire de grossesse (IVG) et le nombre de maladies sexuellement transmissibles reste stable voir en hausse à La Réunion. Méthode: Étude qualitative par entretiens semi-dirigés, à des adolescents de 18 à 20 ans à l'île de la Réunion. Résultats: Les adolescents ne se sentent pas assez renseignés en termes d'éducation affective et sexuelle. Ils ont besoin d'aide sur des sujets comme les changements physiques lors de la puberté, la contraception, le harcèlement, l'orientation sexuelle, le premier rapport sexuel. Les adolescents sont prêts à parler à leur médecin généraliste traitant si celui- ci crée un climat de confiance au préalable et fait le premier pas. Leurs principaux freins des adolescents sont la timidité, la peur d'être jugé, la présence des parents. Conclusion: Le médecin généraliste traitant n'est au premier abord pas considéré comme une personne ressource en termes de sexualité. Le frein principal est le manque de communication entre les adolescents et le soignant.

**Sujets :** Avortement -- La Réunion (France ; île)

Maladies sexuellement transmissibles -- La Réunion (France ; île)

Adolescents -- Sexualité -- La Réunion (France ; île)

Adolescents -- Santé et hygiène -- La Réunion (France ; île)

Médecins généralistes -- La Réunion (France ; île)

Relations médecin-patient -- La Réunion (France ; île)

Communication en médecine -- La Réunion (France ; île)

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03406777">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03406777</a>

Titre : Vécu d'un projet artistique de photographie par des patients d'une MSP à La Réunion.

Auteur: Chavot, Clémence (1993-....)

Directeurs de thèse : Leruste, Sébastien ; Cochet, Véronique

Spécialité : Médecine générale

Date: 2021

Nombre de pages : 62

Bibliographie: 21 références

Résumé: Contexte: L'art trouve désormais sa place dans des programmes de soins en démontrant son influence positive sur la santé. À La Réunion, en 2019, l'équipe d'une maison de santé pluriprofessionnelle a répondu à un appel à projet proposé par l'agence régionale de santé et la direction des affaires culturelles de La Réunion concernant l'intervention artistique au sein d'une structure de soin. Le projet de photographie « De l'élan au mouvement » s'est déroulé de juin à août 2020 avec dix patients dont deux enfants, usagers de la maison de santé. Dans cette étude, il a été choisi d'explorer le vécu du projet par les patients. Méthode : Une étude qualitative exploratoire a été menée auprès des huit participants adultes du projet, basée sur l'analyse interprétative phénoménologique (IPA) d'entretiens semi dirigés réalisés dans les deux mois suivants la fin du projet. Résultats : Ce projet leur a donné l'opportunité de vivre une expérience initiatique à travers l'art, au sein d'un groupe bienveillant et encadré par une artiste engagée dans une démarche de soin. Cette initiation à l'art a été un moyen pour les participants de se sentir vivant, de se détacher du quotidien, d'accéder à leur intériorité (émotions, imagination, connaissance de soi) et de découvrir leurs qualités et leurs forces. Des difficultés ont aussi été révélées telles que celle de se libérer du mental et celle de s'autonomiser. Conclusion : Ces résultats fournissent un éclairage sur l'intérêt d'une approche holistique du soin prenant en compte les personnes dans toutes leurs dimensions (réalités psychologiques, socioculturelles, familiales...).

Sujets: Maisons de santé -- La Réunion (France; île)

Art-thérapie

Photographie

Soins de santé primaires

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03546589">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03546589</a>

Titre : Caractéristiques sociodémographiques et sanitaires des patients d'une permanence d'accès aux soins de santé (PASS) sur l'île de La Réunion.

Auteur: Colliac-Chirié, Fanny (1993-....)

Directeur de thèse : Arnoulx de Pirey Gravière, Sarah

Spécialité : Médecine générale

Date: 2021

Nombre de pages: 42

Bibliographie: 17 références

Résumé: La création des Permanences d'accès aux soins de santé en 1998 a permis un accompagnement médico-social dans les hôpitaux français des personnes en situation de précarité. A La Réunion, ce dispositif est mis en place au CHU de Saint Denis en 2000. Aucune donnée n'est disponible publiquement pour décrire le profil sociodémographique et sanitaire des patients relevant de cette PASS. Il s'agissait d'une étude descriptive par recueil rétrospectif des données des formulaires sociaux et médicaux de tous les patients ayant consulté à la PASS de Saint Denis de la Réunion en 2019. Le patient type était un homme, de nationalité française, de 38 ans en moyenne. Parmi les patients étrangers, 9 sur 10 était issus de l'immigration de l'Océan Indien. Plus de la moitié des patients avaient des droits ouverts à la sécurité sociale. Dans le formulaire médical, le pourcentage de pathologies chroniques était le même qu'en population générale. Les affections dermatologiques étaient le principal problème médical rencontré. En analyse multivariée, les patients arrivés dans le cadre d'une EVASAN étaient principalement des femmes, d'origine comorienne, sans couverture sociale, plus fréquemment atteintes de pathologies chroniques. A la Boutique Solidarité de la Fondation Abbé Pierre, les patients étaient plus fréquemment sans domicile fixe, consultaient l'assistante sociale pour des problèmes d'hébergement et de finances, avaient plus souvent leurs droits à jour. Une consommation de tabac et d'alcool était plus souvent retrouvée chez ces patients. Les profils des patients consultants à Saint Denis de La Réunion sont différents de ceux consultants traditionnellement dans les PASS métropolitaines.

Sujets : Continuité des soins

Permanence des soins

Prise en charge personnalisée du patient

Médecins généralistes

Inégalités sociales de santé

Permanences d'accès aux soins de santé

Pauvres -- Soins médicaux

Émigration et immigration -- Politique publique -- La Réunion (France ; île)

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03478544">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03478544</a>

Titre: La visite de non-contre-indication à la pratique du trail en médecine générale: élaboration, par méthode Delphi, d'un guide de consultation et d'une fiche d'information patient.

Auteur: Collineau, Damien (1993-....); Brénot, Mélanie (1992-....)

Directeur de thèse : Bouscaren, Nicolas

Spécialité : Médecine générale

Date: 2021

Nombre de pages : 96

Bibliographie: 55 références

Résumé : Introduction : Le trail est une discipline récente, en pleine expansion. Le certificat d'absence de contre-indication au trail délivré principalement par le médecin généraliste est nécessaire pour la pratique du trail en club ou en compétition. En 2020, des difficultés ont été retrouvées chez les médecins généralistes lors de ces visites de non-contre-indication. Objectif principal : Élaborer de façon consensuelle deux supports d'aide pour cette consultation : un guide de consultation destiné aux médecins généralistes et une fiche d'information patient pour les traileurs. Méthode : Une étude semi-qualitative par méthode Delphi a été réalisée. Le panel d'experts était constitué de médecins de spécialités différentes, de l'ile de La Réunion ou de métropole. L'étude s'est déroulée en plusieurs rondes, au cours desquelles la pertinence des propositions à paraître sur les supports était évaluée. Selon la médiane, chaque proposition obtenait un consensus positif, négatif ou pas de consensus. Seules les propositions ayant obtenu consensus positif étaient retenues. Résultats : Vingt-sept médecins experts ont été inclus. Au total 64% des propositions ont obtenu un consensus positif, 16% un consensus négatif et 20% n'ont pas obtenu de consensus. Les thèmes thérapeutique & dopage, cardiovasculaire et réglementation sont ceux ayant obtenu le plus facilement un consensus positif. Les thèmes gynécologie, dermatologie, psychologie et digestif ont quant à eux rencontrer plus de difficultés pour obtenir un consensus. Conclusion : Un guide de consultation et une fiche d'information patient ont été réalisés grâce au consensus trouvé. Une évaluation en conditions réelles serait bénéfique pour permettre leur diffusion.

**Sujets**: Course nature

Électrocardiographie

Médecins généralistes

Certificats médicaux

Consultation de prévention

Sportifs -- Examens médicaux

Titre : Le vécu des médecins généralistes en Isère lors de la première vague de l'épidémie de Covid-19.

Auteur: Cuq, Hélène (1991-....)

Directeur de thèse : Bruchon, Mélanie (1989-....)

Spécialité : Médecine générale

Date: 2021

Nombre de pages : 117

Bibliographie: 81 références

Résumé : Introduction : L'épidémie de Covid-19 et le confinement ont bouleversé le système de soins français, et l'organisation des médecins généralistes, en première ligne. L'objectif principal cette étude était d'explorer leur vécu lors de la première vague de l'épidémie de Covid-19, du 1er janvier au 11 mai 2020, en Isère. Méthode : Une étude qualitative phénoménologique par entretiens individuels semi structurés respectant les critères Coreq a été menée auprès de médecins généralistes thèsés dans le département d'Isère, en France. Résultats : Neuf entretiens de 64 minutes en moyenne, ont été réalisés du 5 mars au 11 juin 2021. Durant la première vague épidémique, les MG d'Isère ont réussi à adapter leur pratique en urgence. Ils ont augmenté leur temps de veille documentaire, multiplier les échanges entre pairs. Ils ont réorganisé leur cabinet, leurs moyens de protection pour lutter contre la transmission virale. Ils ont développé le tri, l'évaluation et le suivi à distance des patients grâce à la télémédecine. Malgré un faible taux d'incidence de Covid en Isère, les MG s'indignaient face à la couverture médiatique anxiogène, au manque d'accompagnement institutionnel, à la pénurie des moyens de protection. Ils notaient une forte diminution de la fréquentation des cabinets, un manque de continuité des soins hors Covid-19, impactant leur organisation et l'état de santé des patients. Conclusion : Durant la première vague d'épidémie, le taux d'incidence de Covid 19 est resté faible en Isère, cependant la crise sanitaire et le confinement ont eu des répercussions négatives sur le vécu personnel et professionnel des MG d'Isère ainsi que sur l'état de santé des patients.

**Sujets:** Covid-19 -- Isère (France)

Médecins généralistes -- Isère (France)

Confinement (politique sanitaire) -- Isère (France)

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03533762">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03533762</a>

Titre : Quel est le vécu des médecins généralistes à l'utilisation de la téléconsultation pendant la première vague de la crise Covid ?

Auteur: Danjou, Julie (1992-....)

Directeurs de thèse : Leruste, Sébastien ; Legrand, Florian

Spécialité : Médecine générale

Date: 2021

Nombre de pages : 220

Bibliographie: 41 références

Résumé: Introduction: En contexte COVID-19, le confinement est décrété le 16/03/20. Les médecins sont encouragés à utiliser la téléconsultation. Le déploiement de la télémédecine est soutenu depuis des années mais la perception des médecins est peu explorée. L'objectif est d'explorer le vécu des médecins généralistes à l'utilisation de la téléconsultation durant la 1ère vague épidémique à XXX dans 5 régions de XXX. Méthode : Réalisation d'une étude qualitative phénoménologique. Les entretiens semi-directifs étaient réalisés en présentiel ou visioconférence par 5 chercheurs entre mai et décembre 2020. Résultats : L'instauration en urgence de la téléconsultation a suscité un sentiment de colère voire d'abandon. Elle a généré une crainte de l'erreur et de pratiques frauduleuses. Elle a permis de travailler, d'assurer une continuité des soins, d'évaluer les situations urgentes. Bien que fiers de maîtriser cette pratique nouvelle, les médecins semblent frustrés. Ils trouvent la téléconsultation inadaptée du fait de l'absence de vision globale et sont indignés de réaliser une « médecine au rabais ». Discussion : Le sujet d'actualité et la méthodologie adaptée à l'exploration du vécu font les forces de l'étude. Le travail par 5 chercheurs a permis d'augmenter la validité externe. Le biais d'interprétation a été limité par la triangulation des données. Néanmoins, il persiste un biais de recrutement et d'investigation. Conclusion : La pandémie représente un tremplin dans l'utilisation de la téléconsultation. Le vécu des médecins mêle colère, peur, frustration mais aussi soulagement et engouement. D'autres travaux pourront explorer si les craintes évoquées sont fondées.

Sujets: Covid-19 -- La Réunion (France; île)

Télémédecine -- La Réunion (France ; île)

Relations médecin-patient -- La Réunion (France ; île)

Médecine -- Pratique -- La Réunion (France ; île)

Médecine générale -- La Réunion (France ; île)

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03565515">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03565515</a>

Titre : Comment les médecins généralistes font-ils pour repérer les troubles du spectre de l'alcoolisation foetale à La Réunion ?

Auteur: Delfarguiel, Louise (1992-....)

Directeurs de thèse : Leruste, Sébastien ; Spodenkiewicz, Michel

Spécialité : Médecine générale

Date: 2021

Nombre de pages : 77

Bibliographie: 59 références

Résumé : Introduction : le troubles du spectre de l'alcoolisation foetale (TSAF) est la première cause de handicap mental non génétique et d'inadaptation sociale de l'enfant. Il est entièrement évitable. Les recommandations nationales préconisent le zéro alcool pendant la grossesse. La Réunion est le département français le plus touché avec une prévalence des SAF estimée de 1,2% naissances. La prévalence du TSAF n'est pas connue. Son pronostic est grandement amélioré par une prise en charge précoce médico-psychosociale. L'objectif de cette étude était de comprendre comment les médecins généralistes (MG) faisaient pour repérer le TSAF à La Réunion. Méthode : étude qualitative utilisant une approche par théorisation ancrée, par entretiens semi-directifs auprès de médecins généralistes. Résultat : Vingt entretiens ont été réalisés. Les MG rapportaient des freins au repérage des TSAF : manque de connaissance, d'expérience, consultations longues, symptômes peu spécifiques et très variables avec une absence de consensus concernant la classification et la méthode de diagnostic impliquant la mobilisation d'une équipe pluridisciplinaire. Ils ne pensaient pas à repérer le TSAF chez l'adulte et doutaient de l'utilité de la prise en charge, ce trouble étant irréversible. A l'inverse, ils se sentaient compétents pour repérer les troubles neurodéveloppementaux toutes causes confondues mais s'inquiétaient du délai long de la charge spécialisée. Ils constataient un déni de l'alcool plus prononcé chez les femmes. Le repérage de leur consommation d'alcool n'était pas toujours réalisé systématiquement pendant la grossesse. Conclusion : la promotion et la formation au repérage et la coordination des parcours de soins des enfants présentant des troubles neuro-développementaux toutes causes confondues sont à privilégier.

Sujets: Alcoolisme -- Chez la femme enceinte -- La Réunion (France; île)

Syndrome d'alcoolisme foetal -- La Réunion (France ; île)

Médecins généralistes -- La Réunion (France ; île)

Dépistage néonatal

Foetus -- Malformations

Prévention

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03543384">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03543384</a>

Titre : Les femmes accouchant sur l'île de Mayotte sont-elles vaccinées contre la coqueluche en 2020 : étude multicentrique.

Auteur : Doucet, Benjamin (1991-....)

Directeur de thèse : Dumez, Jessica

Spécialité : Médecine générale

Date: 2021

Nombre de pages : 37

Bibliographie: 23 références

Résumé: Introduction: Le but de cette étude était de déterminer le taux de vaccination contre la coqueluche des femmes accouchant dans l'ensemble des maternités de Mayotte, et de rechercher les facteurs de non-vaccination. Méthodes : 200 patientes ont été recrutées dans les 5 maternités de Mayotte. Le nombre de patientes incluses dans chaque maternité était au prorata de l'activité des maternités. Le recueil de données a été réalisé en octobre 2020 sur une période de 3 semaines. Le questionnaire comportait 27 questions sur la vaccination contre la coqueluche au cours de la grossesse, le niveau socio-économique, le suivi de grossesse, les différentes vaccinations. Les données ont été collectées par un interrogatoire et par une analyse des dossiers médicaux personnels. Une analyse multivariée a été réalisée pour rechercher les facteurs de non-vaccination. Résultats : Le taux de vaccination contre la coqueluche était de 35 % (IC 95% [28.33-41.66]). L'analyse multivariée a retrouvé 2 facteurs significatifs corrélés à la non-vaccination : l'absence d'échographie au 2ème trimestre de grossesse (OR 12.371, IC à 95% [1.073-142.602]) et l'absence de confort du logement (en tôle sans eau courante ni électricité) (OR 61.944, IC à 95% [1.784 - >999]). Conclusion : La vaccination contre la coqueluche des femmes enceintes à Mayotte est corrélée au niveau socioéconomique, et l'absence de suivi optimal au cours de la grossesse doit alerter sur le risque de non-vaccination.

Sujets: Coqueluche -- Vaccination -- Mayotte

Femmes enceintes -- Mayotte

Grossesse -- Complications (médecine) -- Mayotte

Lien vers la ressource : Intranet de l'Université (accès restreint)

Titre: Expériences des professionnels de soins premiers sur l'accès à la santé des personnes sourdes signantes à La Réunion.

Auteur : El-Maliki, Clémence (1992-....) Directeur de thèse : Franco, Jean-Marc

Spécialité : Médecine générale

Date: 2021

Nombre de pages : 77

Bibliographie: 48 références

Résumé: Introduction: La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, stipule que les services publics doivent pouvoir accueillir les personnes sourdes en langue des signes française (LSF). Cependant, la problématique linguistique pour l'accès à la santé des sourds ne semble pas reconnue, alors que les moyens ne cessent de se développer depuis la mise en place en 1995 de la première Unité d'accueil et de soins des sourds à Paris. L'objectif de ce travail est de décrire les expériences des professionnels de santé de soins premiers sur l'accès à la santé des personnes sourdes locutrices de la LSF à La Réunion. Méthode : Étude qualitative par entretiens individuels ouverts auprès de professionnels de soins premiers identifiés par des personnes sourdes comme soignants de référence, bien que non locuteurs de la LSF. Une analyse phénoménologique interprétative a été menée. Résultats : Six professionnels ont été interrogés : trois médecins généralistes, deux sages-femmes et un dentiste. L'étude a révélé un sentiment d'isolement des professionnels dans leur pratique de façon générale, mis en exergue lors des consultations "extraordinaires". Elle a de plus montrer l'existence d'un flou concernant la définition et la place de la communication en santé. Enfin, alors qu'on s'attendrait à ce que les concepts éthiques et déontologiques soient en particulier mobilisés dans ces situations exceptionnelles, leur mise en pratique semble à l'inverse y être plus complexe. Conclusion : La consultation des personnes sourdes signantes est révélatrice d'une organisation de notre système de santé inadaptée lors de certaines situations de soins de premier recours.

Sujets: Troubles de l'ouïe

Médecine générale

Parcours de soins coordonnés

Surdité

Communication non verbale

Langage par signes

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03472005">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03472005</a>

Titre : Prévalence et facteurs de risque des infections sexuellement transmissibles à gonocoque à La Réunion en médecine générale : étude transversale (PIST-MG).

**Auteur :** Espinasse, Audrey (1991-....)

Directeurs de thèse : Leruste, Sébastien ; Bertolotti, Antoine

Spécialité : Médecine générale

Date: 2021

Nombre de pages : 81

Bibliographie: 86 références

Résumé: Introduction: Neisseria gonorrhoeae (Ng), à l'origine d'infections sexuellement transmissibles (IST), est un problème majeur de santé publique mondiale et notamment à La Réunion. Les formes asymptomatiques sont fréquemment retrouvées. Le but de cette étude était de déterminer la prévalence de Ng en médecine générale à La Réunion ainsi que les facteurs de risques associés en 2020-2021. Méthode : Il s'agissait d'une étude transversale multi-site. Les données ont été recueillies à partir d'un questionnaire anonymisé évaluant le risque d'exposition aux IST. Il était proposé par le médecin généraliste à tous les patients ayant entre 15 et 50 ans, quel que soit le motif de consultation. Au décours du questionnaire, un test de dépistage avec prélèvements biologiques pouvait être proposé. Résultats : Entre décembre 2020 et juillet 2021, 1 030 patients ont participé à l'étude. La prévalence intermédiaire de Ng dans la population générale était de 2,46 % (IC95 % 1,43-2,96). Les formes étaient asymptomatiques dans plus d'un cas sur deux. La prévalence chez les hommes homosexuels était de 30,77 % (IC95 % 8,38-78,78). Les principaux facteurs de risques identifiés étaient : le sexe masculin, l'homosexualité, les antécédents d'IST, la co-infection à d'autres IST et le multi partenariat à deux partenaires. Conclusion : La prévalence en médecine générale de Ng semble plus importante à La Réunion qu'en métropole. L'homosexualité masculine ressort comme un facteur de risque prépondérant.

**Sujets :** Gonocoque -- La Réunion (France ; île)

Maladies sexuellement transmissibles -- La Réunion (France ; île)

Médecins généralistes -- La Réunion (France ; île)

Homosexualité -- Facteurs de risque -- La Réunion (France ; île)

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03537203">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03537203</a>

Titre: Vécu du confinement par les patients diabétiques type 2 à La Réunion.

Auteur: Ethève, Stéphie (1989-....)

Directeurs de thèse : Montée, Nicolas ; Nobecourt-Dupuy, Estelle

Spécialité : Médecine générale

Date: 2021

Nombre de pages : 224

Bibliographie: 48 références

Résumé : Introduction : Le confinement dans le cadre de la pandémie de Covid-19 a été une situation inédite entrainant une modification des comportements des médecins et des patients dans le suivi du diabète. A La Réunion, le DT2 (Diabète Type 2) est fréquent et nécessite un suivi rigoureux. L'objectif de cette étude a été d'explorer le vécu du confinement par les patients diabétiques type 2 Réunionnais. Méthode : Une analyse phénoménologique interprétative a été réalisée à partir d'entretiens semi-dirigés individuels de patients DT2 Réunionnais, recrutés par leur médecin traitant. Résultats : 11 entretiens ont été réalisés. L'impact psychologique a été important avec beaucoup d'anxiété et de peur liée au virus pouvant entrainer la mort, aggravé par une toxicité médiatique. Un sentiment de vulnérabilité liée au diabète a émergé. Le confinement a été sécurisant mais avec beaucoup de contraintes. La rupture socio-familiale a creusé la détresse et l'isolement chez les plus âgés, en plus d'une fracture numérique. L'outil numérique a aidé à la continuité des soins dans un contexte de rupture de l'information médicale. Il y a eu une modification des habitudes de vie avec une majoration de la sédentarité et une fragilité nutritionnelle. Une personnalité positive et un habitat rural ont permis une meilleure résilience. Enfin, le déconfinement était partagé entre soulagement et peur d'une évolution sanitaire pessimiste. Conclusion : Les patients DT2 Réunionnais ont été fortement impactés psychologiquement par le confinement lié à la Covid-19 et le contrôle du diabète a été fragilisé.

Sujets: Confinement (politique sanitaire) -- La Réunion (France; île)

Diabètes -- La Réunion (France ; île)

Covid-19 -- La Réunion (France ; île)

Médecins généralistes -- La Réunion (France ; île)

Titre : Kréolité et médecine générale : représentations et ressentis de la langue créole par les patients créolophones en consultation de médecine.

Auteur: Fontaine, Gilles (1992-....)

Directeur de thèse : Palma, Vanessa Élodie

Spécialité : Médecine générale

Date: 2021

Nombre de pages : 93

Bibliographie: 44 références

**Résumé** : Intérêt : La dualité de langue médecin-français/patient-créole, limite la relation entre ces derniers Ce clivage est accentué par l'existence d'une médecine traditionnelle plurielle qui côtoie la médecine occidentale. Objectif : Nous souhaitons étudier les représentations et sentiments du patient liés à l'utilisation du créole en consultation de médecine générale. Population et méthode : Étude qualitative par théorisation ancrée basée sur 14 entretiens individuels et 1 entretien en binôme, semi-dirigés. Les interrogés ont été recrutés dans le sud de l'île, dans des cabinets de médecine générale par échantillonnage opportuniste. Les entretiens ont été menés de octobre 2018 à juin 2020. Résultats : Les facteurs favorisant la langue créole sont : un âge >60 ans, une catégorie socioprofessionnelle modeste, une vie rurale, une fierté de sa culture, une utilisation d'une langue naturelle et rassurante. Les freins à son utilisation sont : un âge <30 ans, une catégorie socio-professionnelle plus élevée, une vie urbaine, des voyages outre-mer. Le sentiment d'infériorité de la langue et de la personne créole influe sur l'utilisation du créole en consultation. Le non usage du créole lors du colloque singulier inhibe l'expression du patient créolophone. Une « attitude créole » du médecin permet une posture éducative avec un risque de défaut de professionnalisme. Conclusion : La créolité en consultation de médecine générale est un levier pour accéder plus facilement aux ressentis des patients créolophones. Facilitant la posture éducative, elle pourrait être intégrée à la formation d'éducation thérapeutique des internes de médecine générale de la Réunion.

Sujets : Médecine générale

Relations médecin-patient

Créole réunionnais (langue)

Consultation médicale

Multilinguisme

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03429994">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03429994</a>

Titre : Troubles anxio-dépressifs à distance d'une épidémie de Chikungunya : étude exposé-non exposé ancillaire à la cohorte réunionnaise CHIKGene.

Auteur: Fontaine, Jérémy (1991-....)

Directeurs de thèse : Randrianjohany, Andry ; Gérardin, Patrick

Spécialité : Médecine générale

Date: 2021

Nombre de pages : 122

Bibliographie: 184 références

Résumé: Introduction: Les troubles anxio-dépressifs (TAD) ont été peu étudiés en tant que conséquences d'une infection à virus Chikungunya (CHIKV). L'objectif principal était d'authentifier chez les sujets exposés au CHIKV, CHIK+ malades (chroniquement douloureux ou fatigués) ou guéris (indemnes de douleur ou de fatigue), la présence d'une anxiété, d'une dépression ou de TAD mixtes en comparaison d'une population non-exposée (CHIK-) à distance de l'épidémie survenue en 2005-2006 à l'île de La Réunion. Méthode : Parmi les participants à la cohorte de l'étude génome-entier CHIKGene, nous avons comparé les scores d'anxiété (HAD-A) et de dépression (HAD-D) estimés d'après le questionnaire Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), selon l'exposition en distinguant quatre phénotypes : ni anxieux ni dépressif (HAD-A et HAD-D≤10), anxieux mais non dépressif (HAD-A>10 et HAD-D≤10), dépressif mais non anxieux (HAD-A≤10 et HAD-D>10), anxieux et dépressif (HAD-A et HAD-D>10). Résultats : Quatre-cent cinquante et un sujets ont été inclus dont 201 CHIK+ malades, 178 CHIK+ guéris et 72 CHIK- Parmi ceux-ci, les sujets CHIK+ malades présentaient plus fréquemment des TAD mixtes (25,4% versus 3,9% chez les sujets CHIK+ guéris ou 4,2% chez les CHIK-, p<0,001, respectivement). Les sujets CHIK+ malades avaient des scores moyens HAD-A et HAD-D (9,8±4,2 et 8,1±3,7) plus élevés que les CHIK+ guéris (6,8±3,8 et 5,1±3,1, p<0,001, respectivement) ou les sujets CHIK- (7,8±3,8 et 6,0±3,4, p<0,001, respectivement). Conclusion : Les TAD sont plus fréquents et plus profonds chez les sujets ayant présenté des manifestations prolongées du Chikungunya que chez les sujets guéris ou non-exposés.

Sujets: Virus chikungunya -- La Réunion (France; île)

Chikungunya -- La Réunion (France ; île)

Anxiété -- La Réunion (France ; île)

Dépression -- La Réunion (France ; île)

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03548724">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03548724</a>

Titre: Représentations du tiers payant généralisé par les médecins généralistes libéraux de La Réunion en 2020.

**Auteur :** Françoise, Simon (1990-....) **Directeur de thèse :** Montée, Nicolas

Spécialité : Médecine générale

Date: 2021

Nombre de pages : 68

Bibliographie: 75 références

**Résumé**: Introduction: Contrairement à la métropole, où il est plus faiblement pratiqué, le tiers payant est généralisé pour les consultations de médecine générale, à La Réunion, depuis 2002. L'objectif de cette étude était d'explorer les représentations du tiers payant généralisé par les médecins généralistes libéraux de La Réunion. Méthode : Une étude qualitative par entretiens semi-dirigés individuels et focus group avec analyse thématique a été réalisée. Résultats : Quatorze médecins généralistes ont été interrogés du 18 juin au 31 aout 2020. Ils ont des représentations hétérogènes du tiers payant généralisé. Certains en semblent satisfaits, évoquant un système efficace, améliorant l'accès aux soins des patients, désengorgeant les urgences et permettant de séparer la consultation du paiement de celle-ci. A contrario, le tiers payant peut aussi être associé à une augmentation des couts et des charges administratives des médecins, à l'inflation du nombre de consultations, à la dévalorisation de la médecine et à une dépendance accrue aux organismes payeurs. Pour remédier à ces problématiques, ils proposent l'instauration d'un payeur unique ou d'aides financières et l'optimisation de l'efficience et de la communication des organismes complémentaires. Ils prônent l'information, l'éducation et le contrôle des patients et des médecins concernant le cout de la santé. Discussion : La diversité des représentations retrouvée à La Réunion est similaire à celle des médecins métropolitains. Une étude globale auprès des patients, des médecins, de la CGSS et des organismes complémentaires permettrait de faire un état des lieux des 18 années de pratique du tiers payant généralisé à La Réunion.

Sujets: Sécurité sociale -- Participation de l'assuré -- La Réunion (France ; île)

Médecine générale -- La Réunion (France ; île)

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03238332">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03238332</a>

Titre : Enfants et écrans, qu'en savent les parents ? : étude observationnelle en soins premiers à l'île de La Réunion.

Auteur : Gaillard, Céline (1994-....) Directeur de thèse : Gilli, Yvan

Spécialité : Médecine générale

Date: 2021

Nombre de pages : 53

Bibliographie: 17 références

Résumé: Introduction: Les enfants français de plus de 4 ans passent 1 heure et 28 minutes par jour en moyenne devant la télévision. Cette consommation s'est accentuée durant la pandémie de Covid. Les effets délétères des écrans sont reconnus par la communauté scientifique internationale, notamment sur le poids, le sommeil, les apprentissages et le comportement. Ils apparaissent dès 1 h d'utilisation quotidienne. Méthode : Une étude observationnelle descriptive transversale, par questionnaires anonymes auto-administrés, a été menée auprès de 60 médecins généralistes (MG) tirés au sort à l'île de La Réunion. Les résultats étaient interprétés via un score sur 13. Résultats : Deux cent soixante-quinze questionnaires ont été inclus de février à mars 2021. La moyenne était de 10/13. Cinquante-deux pourcents des répondants ignoraient l'âge seuil de 3 ans. Trente-trois pourcents pensaient que les écrans apprenaient à parler et 9 % qu'ils amélioraient les résultats scolaires. Vingt-neuf pourcents ignoraient les effets de la télévision d'arrière-plan. Vingt-huit pourcents ignoraient le lien entre écran et obésité. Vingt-trois pourcents considéraient les écrans comme un bon moyen pour calmer un enfant. Dix pourcents n'étaient pas convaincus d'être des exemples pour leur enfant. Cinquante-trois pourcents estimaient que c'est le rôle du MG de les informer à ce sujet. Le score au quizz était lié au niveau d'étude parental, à la présence de règles au domicile, au fait d'avoir déjà entendu parler du sujet et aux durées d'utilisation parentale et des enfants. Conclusion : Les effets des écrans étaient connus par la population. L'impact sur le poids, le sommeil ou le rôle de la télévision d'arrière-plan restait ignoré par certains parents. Les MG étaient les interlocuteurs privilégiés pour aborder cette prévention au numérique.

**Sujets**: Télévision et enfants

Médias et enfants

Dépendance à Internet

Adolescents

Médecine générale

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03541888">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03541888</a>

Titre : Analyse descriptive rétrospective des soins primaires non programmés en milieu isolé : exemple du cirque de Mafate à la Réunion pour les années 2018 et 2019.

Auteur : Garcia, Nicolas (1992-....)

Directeur de thèse : Aubert, Cyrille

Spécialité : Médecine générale

Date: 2021

Nombre de pages : 92

Bibliographie : 59 références

Résumé: Introduction: Pouvant dans certains cas être rapporté à une « carence » de la médecine générale, les recours non justifiés aux urgences sont une source de tension pour ces services et incitent à réformer en profondeur l'organisation des urgences avec la création prochaine du SAS (service d'accès aux soins). Le cirque de Mafate particulièrement isolé des structures de soins conventionnelle possède la particularité que l'admission aux urgences de ces résidents soit soumise systématiquement à une évaluation médicale téléphonique pouvant de ce fait réduire les passages dits non justifiés. L'objectif principal de cette l'étude était de déterminer le taux d'évacuation apparaissant comme étant non justifiées et de faire un état des lieux des demandes de soins dans le cadre de « l'urgence » en milieu isolé. Méthode : Il s'agit d'une étude observationnelle rétrospective, menée au sein du SAMU 974 sur la base d'un recueil informatique des données médicales concernant les évacuations des patients mafatais ayant fait appel au 15 pour une problématique médicale sur les années 2018 et 2019. Résultats : 121 patients ont été inclus sur un total de 507 appels traités. Le taux d'évacuation non justifiées était de 28%. A noter que 21% des évacuations étaient considérés comme justifiées en raison de l'absence de solution médicale alternative adaptée disponible dans le cirque. Discussion : Le taux de 28% d'évacuation non justifié à Mafate semble se situé dans la moyenne nationale néanmoins on observe que le taux de réalisation des examens complémentaires (70%) ainsi que le taux d'hospitalisation (38%) semble suggérer que la régulation a priori des venues aux urgences puissent être bénéfique en terme de pertinence et de parcours de soins.

Sujets : Soins de santé primaires -- La Réunion (France ; île) -- Mafate, Cirque de (Réunion)

Urgences en médecine générale -- La Réunion (France ; île) -- Mafate, Cirque de (Réunion)

Zones sous-médicalisées -- La Réunion (France ; île) -- Mafate, Cirque de (Réunion)

Médecine en situation d'isolement -- La Réunion (France ; île) -- Mafate, Cirque de (Réunion)

Lien vers la ressource : <u>Intranet de l'Université (accès restreint)</u>

Titre: Pratiques et obstacles à la photo-protection chez les ultra-traileurs du

Auteur : Goube, Charles (1989-....) Directeur de thèse : Dufour, David

Grand Raid de La Réunion.

Spécialité : Médecine générale

Date: 2021

Nombre de pages : 132

Bibliographie: 130 références

Résumé : Introduction : La pratique du sport de plein air expose les pratiquants de manière significative au rayonnement solaire. Ce rayonnement est le facteur de risque principal des cancers cutanés, en particulier en altitude et en zone tropicale. Bien plus qu'une discipline, la pratique du Trail et de la course en montagne revêt une importance sociétale à La Réunion. L'objectif principal était de déterminer les pratiques de photoprotection des ultratraileurs du Grand Raid de La Réunion et les obstacles déclarés à cette protection pendant les épreuves et les entraînements. Méthode : Étude transversale quantitative basée sur un questionnaire électronique transmis à tous les participants des 4 courses. Résultats : Parmi les 5844 ultra-traileurs du programme, 1291 ont répondu à notre étude. Le couvre-chef, porté par 78,1 %, était le moyen de protection le plus utilisé. En revanche, 85,0 % et 56,1 % des athlètes n'utilisaient jamais ou presque jamais de vêtements longs couvrants ni de lunettes de soleil. L'écran solaire n'était jamais ou presque jamais employé pendant les entrainements et lors des compétitions, respectivement dans 67,1 % et 57,5 %. Une protection insuffisante était rapportée dans 59,4 % des cas. Les principaux freins rapportés étaient l'oubli et la gêne liée à la transpiration à propos de l'écran solaire, ainsi que l'inconfort des protections vestimentaires. Conclusion : Cette étude met en évidence une insuffisance de protection solaire chez des traileurs participants à une course située en zone à fort indice ultra-violet, les exposants à un risque carcinologique accru au cours de la course mais aussi pendant les entrainements.

**Sujets :** Course en montagne -- La Réunion (France ; île)

La Diagonale des Fous -- La Réunion (France ; île)

Peau -- Effets du rayonnement solaire -- Protection

Produits de protection solaire -- Utilisation

Rayonnement ultraviolet

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03173054">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03173054</a>

Titre: Expérimentation de la Supervision par observation directe avec enregistrement vidéo (SODEV) pour la formation à la communication en santé en médecine générale.

Auteur: Guérin, Vincent (1991-....)

Directeurs de thèse : Leruste, Sébastien ; Reix, Grégory

Spécialité : Médecine générale

Date: 2021

Nombre de pages : 78

Bibliographie : 51 références

Résumé: Introduction: La SODEV est un outil pédagogique pour l'enseignement à la communication utilisé depuis de nombreuses années dans les pays anglosaxons. En France, cet outil est utilisé seulement dans trois DUMG. L'objectif de notre étude était d'explorer l'acceptabilité, la faisabilité et l'intérêt de la SODEV pour la formation à la communication des internes par retour d'expérience des MSU au sein du DUMG de La Réunion. Méthode : Une étude qualitative inspirée de la théorisation ancrée a été réalisée. Des entretiens semi-dirigés ont été conduits auprès de MSU ayant pratiqué la SODEV avec leur(s) interne(s) de niveau 1 ou SASPAS sur un semestre. Résultats : Neuf entretiens ont été réalisés. La suffisance théorique des données a été atteinte. Les MSU ont souligné l'intérêt de la SODEV dans l'enseignement de la communication. L'autoévaluation initiale de l'interne était privilégiée. Sa mise en place technique fut simple. Le besoin d'une formation spécifique en amont a été mis en avant par les MSU et permettrait de compenser les difficultés d'analyses pédagogiques. L'instauration d'une relation interne-MSU de confiance a permis de réduire les appréhensions des internes. La grille d'évaluation du CNGE couplée à la rétroaction a été peu utilisée du fait de sa mauvaise compréhension, complexité et aspect chronophage. Les MSU étaient favorables à une diffusion de l'outil. Conclusion : La SODEV est un outil pédagogique intéressant et acceptable pour développer les compétences en communication. Ces retours positifs encouragent la généralisation de la SODEV après une sensibilisation des MSU à l'outil coordonnée par le DUMG de La Réunion.

Sujets : Communication en médecine

Enseignement médical

Internes (médecine) -- La Réunion (France ; île)

Médecine générale

Consultation médicale

Personnel -- Supervision

Éducation -- Évaluation

Relations médecin-patient

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03346413">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03346413</a>

Titre : Quel est le vécu du médecin généraliste de l'utilisation de la téléconsultation durant la première vague épidémique de la crise COVID-19 ?

Auteur: Hassimaly, Daniss (1993-....)

Directeurs de thèse : Leruste, Sébastien ; Legrand, Florian

Spécialité : Médecine générale

Date: 2021

Nombre de pages : 127

Bibliographie: 50 références

Résumé : Introduction : durant la COVID-19, le confinement en France est décrété le 16 mars 2020. Les médecins sont encouragés à utiliser la téléconsultation. Le vécu de ces derniers concernant cette pratique est peu exploré. L'objectif de cette étude est d'explorer le vécu des médecins généralistes à l'utilisation de la téléconsultation durant la 1ère vague épidémique dans la zone nord de La Réunion. Méthode : réalisation d'une étude qualitative phénoménologique par le biais d'entretiens semi-directifs, en face à face ou par visioconférence, entre Mai 2020 et Janvier 2021. Triangulation des données effectuée entre les chercheurs. Résultats : La mise en place en urgence de la téléconsultation a suscité des craintes et une résignation, exacerbée par les spécificités sociodémographiques et épidémiques de l'île. Les médecins ont néanmoins été satisfaits de pouvoir assurer une continuité des soins. Malgré cela, nombreux sont les médecins frustrés par la téléconsultation, qu'ils trouvent inadaptée à leur rôle, et sont indignés de réaliser une médecine de qualité moindre. Discussion : l'originalité de l'étude et la méthodologie, adaptée à l'exploration du vécu, sont les forces de l'étude. Le travail par 5 chercheurs permet d'augmenter la validité externe. Le biais d'interprétation a été limité par la triangulation des données. Il persiste un biais de recrutement et d'investigation. Conclusion : la pandémie est un tremplin dans l'utilisation de la téléconsultation, générant chez les médecins des sentiments multiples et ambivalents. Des travaux complémentaires supplémentaires seraient utiles pour explorer et mieux comprendre ces phénomènes.

Sujets: Médecins généralistes -- La Réunion (France; île)

Consultation à distance -- La Réunion (France ; île)

Confinement (politique sanitaire) -- La Réunion (France ; île)

Covid-19 -- La Réunion (France ; île)

Relations médecin-patient -- La Réunion (France ; île)

Médecine -- Pratique -- La Réunion (France ; île)

Titre : La collaboration entre la médecine de ville et la santé mentale : étude de la satisfaction et des besoins des médecins généralistes de l'est de la Réunion concernant l'équipe de liaison enfants et adultes de psychiatrie de l'Est, ELEAPSE.

**Auteur**: Hermann, Sébastien (1989-....) **Directeur de thèse**: Appavoupoulle, François

Spécialité : Médecine générale

Date: 2021

Nombre de pages : 71

Bibliographie: 22 références

Résumé : Introduction : l'équipe de Liaison pour Enfants et Adultes de Psychiatrie de l'Est (ELEAPSE) est un nouvel outil de psychiatrie de liaison intégrée au sein de l'Établissement Public de Santé Mentale de la Réunion (EPSMR). L'équipe a pour objectif d'optimiser le parcourspatient à travers des soins de premiers recours ambulatoires au sein du territoire de l'Est de la Réunion, en partenariat avec tous les acteurs de santé mentale locaux. L'efficacité d'ELEAPSE n'a jamais été évaluée en terme de satisfaction et de coordination des soins. Notre objectif principal était d'évaluer la satisfaction des médecins généralistes libéraux de l'est de la Réunion vis-à-vis de ELEAPSE. Méthode : étude observationnelle par des questionnaires autoadministrés aux médecins généralistes installés et remplaçants de l'est de la Réunion, du 01/10/2019 au 31/08/2020. Le critère de jugement principal était la satisfaction sur une échelle de 1 à 5, évaluée sur 5 axes. Résultats : Sur 118 médecins généralistes installés, 43 ont répondu (36%) ainsi que 7 remplaçants. 22 d'entre eux avaient déjà utilisé ELEAPSE avec une satisfaction moyenne supérieure à 4 sur 5. Conclusion : les médecins généralistes de l'est semblent satisfaits de ELEAPSE sur les axes explorés. ELEAPSE est un outil pertinent face aux problématiques de santé mentale rencontrées par les médecins généralistes de l'est de la Réunion.

**Sujets**: Médecins généralistes

Psychiatrie de liaison

Consultation psychiatrique

Coopération médicale

Soins médicaux -- Évaluation

Relations interprofessionnelles dans le domaine de la santé

Soins médicaux ambulatoires

Lien vers la ressource : Intranet de l'Université (accès restreint)

Titre : Quelle pourrait être la consultation de prévention annuelle chez le patient de 16 à 25 ans en médecine générale ?

Auteur : Hervé-Body, Clémence (1991-....)

Directeur de thèse : Cheymol, Lucas

Spécialité : Médecine générale

Date: 2021

Nombre de pages : 102

Bibliographie: 69 références

Résumé: Introduction: La prévention est bien organisée chez les enfants jusqu'à l'âge de 16 ans. Au-delà, les examens de prévention en santé (EPS) gérés par les organismes d'Assurance Maladie prennent le relais dans la plupart des régions de métropole. Cependant, ils sont absents du territoire réunionnais. Le médecin généraliste peut-il effectuer la prévention pour cette tranche d'âge ? Comment alors faciliter ce rôle ? L'objectif de ce travail était donc d'envisager une consultation-type de prévention adaptée pour les 16-25 ans à La Réunion et à réaliser au cabinet de façon annuelle par le médecin traitant. Méthode : L'étude réalisée était une étude qualitative de type méthode de consensus utilisant la méthode Delphi®. Une consultation-type a été rédigée à partir d'un travail bibliographique puis soumise à un groupe d'experts pour avoir leurs avis. Les résultats du premier tour ont permis de rédiger une deuxième consultation-type. Trois tours ont été effectués. Les items retenus étaient ceux qui avaient obtenus un consensus auprès du groupe d'experts. Résultats : Dix-huit items ont obtenu l'accord des experts pour intégrer la consultation de prévention chez les 16-25 ans en médecine générale. Conclusion : Ce travail a permis d'établir une consultation-type de prévention chez les 16-25 ans. Il conviendrait d'étudier l'acceptabilité et la faisabilité de cette consultation auprès des médecins interrogés et des patients, ainsi que son efficacité.

Sujets: Médecine générale -- La Réunion (France; île)

Consultation de prévention -- La Réunion (France ; île)

Adolescents -- Santé et hygiène -- La Réunion (France ; île)

Adolescents -- La Réunion (France ; île)

Jeunes adultes -- La Réunion (France ; île)

Médecine préventive -- La Réunion (France ; île)

Titre : L'accompagnement proposé par le médecin généraliste en matière d'allaitement maternel à l'île de la Réunion.

Auteur : Hoarau, Marion (1992-....)

Directeur de thèse : Plaisantin, Guillaume

Spécialité : Médecine générale

Date: 2021

Nombre de pages : 107

Bibliographie : 61 références

Résumé: Introduction: L'OMS recommande un allaitement maternel exclusif pendant les 6 premiers mois de la vie. Actuellement, moins de 70% des nouveaux nés sont allaités en France. Les taux sont à 78% sur l'île de la Réunion. L'objectif primaire est d'explorer l'accompagnement à l'allaitement maternel proposé par le Généraliste à l'île de La Réunion. L'objectif secondaire est d'identifier l'existence de particularités locales conduisant à des taux d'allaitement plus élevés. Méthode : L'étude est qualitative, menée par 2 focus group. Le recrutement des médecins généralistes s'est fait par convenance à l'occasion du congrès de Pédiatrie de l'Océan Indien Edition 2020. Résultats : Il y a eu 18 participants. La parentalité du médecin donne une expérience personnelle d'allaitement maternel. Elle s'enrichie par l'autoformation et la résolution des problèmes rencontrés, de façon proportionnelle. Les représentations des médecins résultent de ce vécu personnel et de l'influence de la société. Aidé par la relation médecin patient, ce vécu concède des compétences au généraliste. Motivateur et éclaireur, il est un professionnel de confiance et de premier recours. Cette étude ne permet pas d'expliquer les taux d'allaitement plus élevés à la Réunion. Le Pr L.Pourchez émet l'hypothèse que cela serait dû au contexte insulaire et aux formations des professionnels de santé se voulant intenses et prolongées, menées en vase clos à la Réunion. Conclusion : L'autoformation, d'abord mise au service de leur expérience personnelle, constitue la base théorique et pratique de l'accompagnement à l'allaitement maternel proposé par les médecins généralistes réunionnais.

Sujets: Allaitement maternel -- La Réunion (France; île)

Médecins généralistes -- La Réunion (France ; île)

Relations médecin-patient -- La Réunion (France ; île)

Titre : Vécu des patients participants au programme d'éducation thérapeutique Reucare.

Auteur : Jeanneau, Caroline (1993-....) Directeur de thèse : Palma, Vanessa Élodie

Spécialité : Médecine générale

Date: 2021

Nombre de pages : 69

Bibliographie: 44 références

**Résumé**: Introduction: L'éducation thérapeutique a pour but de transmettre des compétences et d'autonomiser les patients vis-à-vis de leur pathologie. Reucare est une association locale d'éducation thérapeutique pour les patients diabétiques et atteints de maladie rénale chronique. L'objectif de ce travail est de s'intéresser au vécu des patients inclus dans Reucare. Méthode: L'étude qualitative inductive générale s'est effectuée via douze entretiens individuels semi-dirigés. Résultats: Avant Reucare, les patients étaient fatalistes vis-à-vis de la maladie. Grâce au soutien de Reucare par le suivi téléphonique, les formateurs et l'effet groupe, les patients ont acquis des compétences. Des changements de vie en ont découlés. Après Reucare, les patients ont changé de regard sur leurs pathologies et continuent de se fixer des objectifs. Ils ne manquent pas une occasion pour partager leurs connaissances avec leur entourage. Conclusion: Grâce à l'acquisition de compétences, les patients sont devenus acteurs de leur santé. Ils ont changé de trajectoire de vie afin de prévenir des complications évitables.

Sujets: Éducation des patients

Insuffisance rénale chronique

Diabètes

Diabétiques

Maladies chroniques

Autosurveillance glycémique

Titre : La mise en place d'un protocole aux urgences du CHOR a-t-elle permis une amélioration de l'adaptation des antibiothérapies dans le respect des recommandations pour les patients consultant aux urgences pour une infection urinaire de traitement ambulatoire ?

Auteur: Jossomme Mouton, Albane (1992-....)

Directeur de thèse : Girerd, Rémi

Spécialité : Médecine générale

Date: 2021

Nombre de pages : 54

Bibliographie: 31 références

Résumé: La prise en charge des infections urinaires aux urgences est souvent ambulatoire après la réalisation d'un ECBU et l'instauration d'une antibiothérapie probabiliste. La désescalade thérapeutique contribue à diminuer l'antibiorésistance. Un tiers des médecins ambulatoires reçoivent les ECBU et parmi eux 24% adaptent l'antibiothérapie. Le CHOR a créé un protocole visant à améliorer ce lien (information du patient et envoi systématique et spontané des ECBU). L'objectif principal est d'évaluer l'adaptation post-protocole des antibiothérapies conformément aux recommandations de la SPILF grâce à une étude observationnelle descriptive rétrospective à type d'évaluation des pratiques professionnelles. Les patients consultant aux urgences pour une infection urinaire nécessitant un ECBU et de traitement ambulatoire ont été inclus prospectivement. Les données ont été recueillies par un hétéro-questionnaire. L'analyse a été faite par un Chi2 de conformité avec un seuil de significativité de 0.05. Le projet a fait l'objet d'un engagement de conformité à une méthodologie de référence auprès de la CNIL. Le protocole améliore significativement l'adaptation des antibiothérapies conformément aux recommandations lorsque l'ECBU est réceptionné (47.2% vs <30%, p < 0.008) grâce à une amélioration de la transmission des ECBU (72% vs 24%, p < 0.001) sans amélioration du taux de re-consultation (60% vs 53%, p = 0.5). Cette étude est la seule réalisée en intention de traiter et comptabilisant uniquement les adaptations conformes aux recommandations dans le cadre des infections urinaires. Elle comporte un biais de remémoration. Transmission des ECBU et formation des médecins sont à améliorer.

Sujets: Appareil urinaire -- Infections

Médecine d'urgence

Escherichia coli

**Antibiotiques** 

Antibiogramme

Soins de santé primaires

Titre : Élaboration, par la méthode Delphi, d'une méthode dépistage systématique des violences conjugales faites aux femmes à la Réunion.

Auteur : Laruelle, Léa (1992-...)

Directeur de thèse : Gomard, Philippe

Spécialité : Médecine générale

Date: 2021

Nombre de pages : 79

Bibliographie: 97 références

Résumé: Introduction: Les violences conjugales touchent plus d'une femme sur dix à la Réunion. Elles ont de nombreuses conséquences tant sur le plan médical qu'économique et seraient à l'origine de nombreux motifs de consultations médicales. Le médecin généraliste est souvent la première personne à qui s'adressent les victimes. Or, ils ne posent que rarement la question des violences conjugales à leurs patientes. La Haute Autorité de Santé recommande le dépistage systématique de ces violences depuis juin 2019. L'objectif de cette thèse est de réaliser un prototype de repérage précoce et intervention brève sur le modèle utilisé en addictologie pour aider les médecins généralistes à dépister ces violences chez leurs patientes. Méthode: Étude qualitative par consensus d'experts à l'aide d'une méthode Delphi. Vingt-trois experts ont été recrutés avec comme critère d'inclusion : - l'intérêt par rapport à ce sujet – la confrontation à cette problématique dans la sphère professionnelle. Deux tours Delphi ont été réalisés. Résultats : Plusieurs propositions de dépistage ont été validées par les experts. Certaines de ces propositions ont par la suite été sélectionnées et intégrées pour l'élaboration d'un repérage précoce et intervention brève. Conclusion : La multiplication des moyens de dépistage systématique des violences conjugales pourrait permettre une augmentation de cette pratique par les médecins généralistes et une meilleure prise en charge des femmes victimes.

Sujets: Delphi, Méthode

Femmes victimes de violence

Violence conjugale -- Dépistage

Médecine générale

Consultation médicale

Titre : L'abord du surpoids par les étudiants de troisième cycle en consultation de médecine générale à travers les portfolios.

Auteur : Laurent, Mathilde (1991-....) Directeur de thèse : Reix, Grégory

Spécialité : Médecine générale

Date: 2021

Nombre de pages : 55

Bibliographie: 51 références

Résumé: Introduction: La prise en charge de patients en surpoids par les étudiants est peu décrite dans la littérature, contrairement à celle des médecins généralistes. L'objectif de cette étude est d'analyser la prise en charge des patients en surpoids par les étudiants et leurs difficultés, à travers le portfolio (PF). Méthode: Une étude descriptive puis qualitative inductive thématique a été menée à partir des portfolios de trois promotions d'étudiants de 3ème cycle de médecine générale, de la faculté de médecine de La Réunion. Résultats: Les étudiants rencontraient des difficultés lors de la consultation de patients en surpoids. La démarche réflexive du PF permettait l'acquisition de nouvelles connaissances et compétences. Les étudiants amélioraient ainsi leurs futures prises en charge de patients en surpoids. Conclusion: Le PF est un outil capable d'améliorer les prochaines rencontres avec des patients en surpoids. La compétence « communication en santé » reste difficile à évaluer à la seule lecture du portfolio. Les portfolios proposent un nouveau corpus de données utilisable pour la recherche qualitative en médecine générale.

**Sujets:** Surpoids

Médecine générale

Résidents (médecine)

**Portfolios** 

Consultation médicale

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03548726">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03548726</a>

Titre : Description clinique et biologique de la population pédiatrique atteinte de la dengue à La Réunion durant l'épidémie de 2019.

**Auteur :** Legros, Mathilde (1991-....) **Directeur de thèse :** Ruin, Mahé

Spécialité : Médecine générale

Date: 2021

Nombre de pages : 64

Bibliographie: 70 références

Résumé: Contexte: La dengue est la maladie virale transmise par les moustiques qui se propage le plus rapidement dans les pays tropicaux et subtropicaux. Des millions de personnes sont infectées par la dengue chaque année. L'île de La Réunion a connu d'importantes épidémies de dengue ces dernières années. Objectifs : Décrire les caractéristiques cliniques et biologiques des patients pédiatriques infectés par la dengue à La Réunion. Identifier les éventuels facteurs de risque, signes d'alerte ou facteurs de protection de la survenue d'une dengue sévère afin de favoriser une prise en charge optimale. Méthodes : Étude de cohorte rétrospective monocentrique incluant les cas de dengue récupérés dans les bases de données du CHU de La Réunion entre janvier et juin 2019. Résultats : 1594 patients ont été inclus dans notre étude de cohorte rétrospective. Cinquante-deux enfants et 795 adultes ont été confirmés en laboratoire. Une éruption cutanée liée à la dengue était le seul signe (p = 0,015) qui était plus fréquent chez les enfants que chez les adultes OR=2,41 IC 95 % (1,53-3,82). Par rapport aux adultes, les enfants présentaient moins d'arthralgies (p < 0.001) et de myalgies (p = 0.016). Très peu de cas graves de dengue ont été détectés chez les enfants, aucun décès n'a été enregistré. Conclusion : L'île de La Réunion est toujours une zone épidémique. Très peu de cas sévères et aucun décès n'ont été rapportés chez les enfants par rapport aux études menées en zone endémique.

Sujets: Dengue -- Chez l'enfant -- La Réunion (France; île)

Dengue -- Diagnostic -- La Réunion (France ; île)

Dengue -- Symptômes -- La Réunion (France ; île)

Titre : Quel modèle de prise en charge pour les femmes enceintes en situation de vulnérabilité sociale, en milieu urbain ?

Auteur: M'Roivili, Zaïna (1989-....)

Directeurs de thèse : Adam, Christophe ; Onaisi-Chanterel, Racha

Spécialité : Médecine générale

Date: 2021

Nombre de pages : 123

Bibliographie: 100 références

Résumé : Introduction : Le suivi de grossesse des femmes en situation de vulnérabilité sociale est souvent chaotique. Les complications materno-fœtales sont plus fréquentes dans cette population et les obstacles à l'accès aux soins multiples. L'objectif de notre étude était d'identifier les éléments nécessaires à une prise en charge efficace des femmes enceintes vulnérables en milieu urbain. Méthode : Nous avons réalisé une méta-synthèse en suivant les 7 étapes de la méta-ethnographie telles que décrites par Noblit & Hare. Une revue systématique de la littérature a été réalisé en interrogeant 6 bases de données. Une analyse thématique inductive a ensuite été menée. Résultats : Au total 1829 références ont été récupérées après élimination des doublons et importées dans le logiciel COVIDENCE. Après sélection, 13 articles ont finalement été inclus pour analyse. L'analyse thématique a mis en évidence la nécessité de mobiliser les capacités des patientes en favorisant le développement de leur estime de soi et l'acquisition et le renforcement de compétences. Ceci était permis par la mise en place de dispositif spécifique tenant compte du contexte de vie des patientes et organisés autour de quatre axes principaux qui sont : l'établissement d'une relation de confiance, la disponibilité, une approche pluridisciplinaire, ainsi qu'un objectif d'autonomisation des patientes. Conclusion : Une prise en charge pluridisciplinaire basée sur une relation de confiance avec pour objectif l'empowerment des patientes, à travers du soutien par les pairs ou des groupes de soins prénatals par exemple, semble être un modèle de prise en charge efficace des femmes enceintes vulnérables.

Sujets: Grossesse

Fragilité (médecine)

Adaptation (psychologie)

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03168962">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03168962</a>

Titre : Étude qualitative de l'expérience de la parentalité d'enfant à haut potentiel intellectuel avec des difficultés comportementales.

Auteur: Manikom-Permal, Anne-Sophie (1993-....)

Directeur de thèse : Spodenkiewicz, Michel

Spécialité : Médecine générale

Date: 2021

Nombre de pages : 83

Bibliographie: 80 références

Résumé: Introduction: Les enfants à haut potentiel intellectuel sont caractérisés par un développement neurocognitif et psychoaffectif différent. L'incompréhension de leurs processus peut générer un état de stress du milieu familial. Le médecin généraliste est un interlocuteur privilégié afin de guider cette parentalité particulière. L'objectif principal de l'étude est de décrire l'expérience de la parentalité vécue pendant la période précédant le bilan cognitif de l'enfant. Méthode : Il s'agissait d'une étude observationnelle, transversale, qualitative avec recueil des données sous la forme de neuf entretiens individuels semi-dirigés. L'analyse des données s'inspirait de la méthode IPSE. Résultats : Neuf entretiens se sont déroulés durant la période de mars à mai 2021, à La Réunion. L'analyse interprétative des verbatims a permis de proposer une structure dynamique de l'expérience de la parentalité en trois axes : une appréhension anxiogène du haut potentiel intellectuel par le parent, la détresse du parent confronté aux difficultés comportementales de l'enfant, et l'ajustement de son rôle éducatif. Conclusion: Cette étude a permis de décrire différents temps forts de la parentalité avant le repérage du haut potentiel intellectuel. L'accent a été mis sur le vécu dynamique du parent et sur les possibilités d'interventions ponctuelles du médecin généraliste dans le parcours de soins de l'enfant à haut potentiel intellectuel.

Sujets: Enfants surdoués

Troubles du comportement -- Chez l'enfant

Rôle parental

Médecins généralistes

Titre: Description du parcours de soins des patients hospitalisés pour une insuffisance cardiaque aiguë au CHU Felix-Guyon.

Auteur: Marot, Jérémy (1993-...)

Directeur de thèse : Corré, Jérôme François

Spécialité : Médecine générale

Date: 2021

Nombre de pages : 36

Bibliographie: 53 références

Résumé: Introduction: L'insuffisance cardiaque (IC) est un syndrome clinique associant des symptômes, des signes cliniques et une altération structurelle ou fonctionnelle de l'activité cardiaque. Son évolution est marquée par des épisodes de décompensation (ICA). L'IC est une pathologie fréquente, grave et coûteuse. Elle représente la première cause d'hospitalisation des patients de plus de 65ans. À La Réunion, le taux de mortalité prématurée lié à une IC est deux fois plus élevé qu'en métropole. La prise en charge des patients ayant une IC à fraction d'éjection altérée ou préservée est bien codifiée selon les recommandations de l'ESC. Malgré l'ensemble des thérapeutiques, la mortalité à 2 ans d'un patient hospitalisé pour ICA est de 40%. L'objectif de notre étude est de décrire le parcours de soins des patients hospitalisés pour une ICA. Méthode : L'ensemble des séjours hospitaliers des patients de plus de 18 ans hospitalisés pour une insuffisance cardiaque aigüe sur une période de 3 mois ont été inclus. Un suivi de 6 mois a été réalisé à la sortie d'hospitalisation. Résultats : 129 séjours hospitaliers ont été analysés, 65% des patients ont bénéficié d'une hospitalisation en service spécialisé de cardiologie. Les patients hospitalisés ont une prévalence de facteurs de risque cardio-vasculaire élevée : 85% des patients sont hypertendus, 48% ont un diabète de type 2. La fraction d'éjection moyenne du ventricule gauche est de 41%. À leur présentation clinique initiale, 8,5% des patients se sont présentés en état de choc cardiogénique, 44% des patients ont recours à une unité de soins intensifs. Le retour à domicile reste à améliorer, 0% des patients ont bénéficié du PRADO-IC.

Sujets: Insuffisance cardiaque

Parcours de soins coordonnés

Domicile

Hospitalisation

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03476906">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03476906</a>

Titre : Étude qualitative des représentations, freins et motivations face à la prévention solaire dans les écoles à La Réunion.

Auteur: Marx, Mathilde (1992-....)

Directeurs de thèse : Bertolotti, Antoine ; Leruste, Sébastien

Spécialité : Médecine générale

Date: 2021

Nombre de pages : 96

Bibliographie: 61 références

Résumé : L'incidence du mélanome cutané est en augmentation à La Réunion rejoignant ainsi les plus fortes incidences mondiales. Le facteur de risque principal du mélanome est l'exposition solaire pendant l'enfance. Or la prévention solaire reste insuffisante dans les écoles à La Réunion. Objectif : Explorer les représentations, les freins et motivations face à la protection solaire chez les principaux acteurs de la protection solaire des enfants : leurs parents, les enseignants et les enfants eux-mêmes. Méthode : Étude qualitative par entretiens individuels semi-dirigés chez 14 enfants d'école primaire à La Réunion, 13 parents d'élèves et 13 enseignants. Les données ont été collectées de septembre 2019 à novembre 2020. La suffisance théorique des données a été recherchée. Les entretiens ont été enregistrés, retranscrits, codés, triangulés, analysés puis modélisés utilisant le principe de théorisation ancrée. Résultats : L'ensemble des 40 participants ont exprimé leurs habitudes de protection qui variaient selon leur exposition solaire. La protection était moindre lors des activités quotidiennes y compris en période scolaire. Les contraintes pratiques et financières étaient identifiées par les parents. Les enseignants relevaient le manque de moyens avec des infrastructures inadaptées et une absence de formation. Par ailleurs, la responsabilité de la protection des enfants était un point de désaccord entre parents et enseignants. Les enfants limitaient leur application des mesures protectrices principalement par manque de confort. Conclusion : La protection solaire des enfants en milieu scolaire est sous la responsabilité à la fois scolaire, parentale et sociale.

Sujets: Rayonnement ultraviolet -- prévention et contrôle -- La Réunion (France ; île)

Rayonnement solaire -- Effets physiologiques

Risques pour la santé -- Communication

Médecine préventive

Médecine scolaire

Enfants -- Maladies -- Prévention

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03322537">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03322537</a>

Titre : États des lieux de la supplémentation en vitamine D chez les enfants et adolescents par les médecins généralistes de l'île de La Réunion.

Auteur : Michel, Blandine (1992-....) Directeur de thèse : Mars, Amaury

Spécialité : Médecine générale

Date: 2021

Nombre de pages : 104

Bibliographie: 73 références

Résumé: Introduction: Une connaissance universelle: les enfants ont besoin de vitamine D. au travers de l'histoire et de sa découverte, la vitamine D est un sujet d'étude intarissable car elle a et aurait de nombreux rôles suspectés dans le métabolisme vivant. Une certitude est qu'elle est nécessaire au métabolisme phospho-calcique et la croissance chez l'enfant. Des recommandations internationales européennes et françaises suggèrent une supplémentation tout au long de la croissance. Notre étude vient établir un état des lieux de la supplémentation chez les enfants et adolescents par les médecins généralistes de l'île de la Réunion, dont la particularité est que l'ensoleillement est quasi -annuel. Méthode : Nous avons conduit une étude descriptive transversale au travers d'un questionnaire diffusé à 50 médecins pratiquant sur l'île. Résultats : Nos résultats indiquent que 70% des médecins prescrivent la vitamine D de façon systématique chez les nourrissons. La plupart préconise une supplémentation jusqu'à l'âge de 12 ou 18 mois. Seuls deux médecins préconisent sa prescription jusqu'à l'adolescence. Les facteurs favorisant sa prescription sont l'alimentation, la pigmentation de la peau, les signes de carences cliniques, et l'exposition au soleil, par ordre de fréquence. 10% des médecins interrogés ont déjà prescrit un dosage de vitamine D chez l'enfant. 20% ont déjà suspecté un cas de rachitisme. Pour 90 % des médecins, aucun effet secondaire n'est déclaré en rapport avec la prescription de vitamine D. Et 60% des parents ne présentent aucune réticence à son administration chez leurs enfants. Mais 14 % d'entre eux décrivent une administration difficile. La plupart des médecins généralistes prescrivent la vitamine D sous forme de gouttes chez le nourrisson et en doses journalières, pui s sous forme de dose de charge chez l'enfant et l'adolescent selon des posologies très variées. 16 % utilise Uvedose 100 000UI tous les 3 mois quelques soit la saison, les autres favorisent sa prescription en période d'hiver austral. 78% des médecins généralistes interrogés déclarent ne se référer à aucune recommandation particulière, constituant ainsi un vrai frein à sa prescription. Les autres freins à sa prescription sont la peur des effets indésirables en rapport avec les cas d'intoxication rapportées, les modalités de prescription avec des incertitudes en termes de posologie et de galénique. Conclusion : la supplémentation en vitamine D décline au fur et à mesure de l'âge de l'enfant du fait de recommandations non validées et donc peu suivies. Mais on peut souligner la faible innocuité de la vitamine D et son intérêt grandissant pour la santé des enfants et adolescents : nous proposons d'encourager sa prescription au cours de la croissance pour assurer un bon capital osseux à l'âge adulte et pour tous se s rôles protecteurs notamment en termes d'immunologie avec des études en cours et à venir.

```
Sujets: Vitamines D -- Chez le nourrisson -- La Réunion (France; île)
```

Vitamines D -- Chez l'enfant -- La Réunion (France ; île)

Prescription médicamenteuse -- La Réunion (France ; île)

Rachitisme -- La Réunion (France ; île)

Vitamines D -- Chez l'adolescent -- La Réunion (France ; île)

Prescription médicale -- La Réunion (France ; île)

Médecine -- Pratique -- La Réunion (France ; île)

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03550324">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03550324</a>

Titre : Besoins et attentes des femmes pratiquant la symptothermie vis-à-vis des professionnels de santé en France.

Auteur : Moinard, Charline (1992-....)

Directeur de thèse : Thore, Emmanuelle

Spécialité : Médecine générale

Date: 2021

Nombre de pages : 56

Bibliographie: 51 références

Résumé: Introduction : 5% des femmes françaises se tourneraient vers une méthode de contraception naturelle selon le baromètre santé de 2016. L'objectif de ce travail etait de s'intéresser aux femmes pratiquant la symptothermie, d'étudier leurs besoins et attentes, afin de déterminer quelle place pourraient avoir les professionnels de santé dans leur accompagnement. Méthode : Une étude quantitative épidémiologique à visée descriptive, transversale, a été menée sur 70 femmes. Le recrutement a été fait via les conseillères en symptothermie et s'est déroulé d'avril 2021 à juin 2021. Résultat : Les besoins recueillis ont été un désir d'orientation, d'information et d'accompagnement par les professionnels de santé. En parallèle, ces femmes ont des attentes, elles souhaiteraient avoir accès à des professionnels de santé plus formés et qui les documenteraient sur le réseau de la symptothermie (via des listes de conseillères, des coordonnées d'organismes et d'associations). Conclusion : Quelles que soient les motivations des femmes se tournant vers la symptothermie, elles attendent des professionnels de santé un accompagnement. Une meilleure formation de ces derniers pourrait aider au suivi de ces femmes. Des consultations dédiées permettraient, pour une information claire et entière, de fournir des documentations comme des listes de conseillères en symptothermie, d'organismes ou d'associations.

Sujets: Régulation naturelle des naissances

Contraception

Médecins généralistes

Éducation des patients

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03564269">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03564269</a>

Titre : Place du carnet de vaccination électronique MesVaccins.net dans la pratique des médecins généralistes et pédiatres libéraux à La Réunion.

Auteur: Nedelec, Riwal (1990-....)

Directeur de thèse : Manaquin, Rodolphe

Spécialité : Médecine générale

Date: 2021

Nombre de pages : 63

Bibliographie: 74 références

Résumé : Introduction : Le carnet de vaccination électronique (CVE) MesVaccins.net lancé en 2011 semble peu connu à La Réunion. Les objectifs de cette étude étaient d'évaluer son taux d'utilisation par les généralistes et pédiatres libéraux de l'île et de relever l'utilité de ses fonctionnalités, les freins à son usage ainsi que l'opinion vis-à-vis de sa promotion. Méthode : Enquête observationnelle, descriptive et transversale sous la forme d'un questionnaire dont le lien a été diffusé par liste mél à ces médecins. Un échantillon randomisé de 50 généralistes n'ayant pas répondu en ligne a été interrogé directement. Les données collectées ont été traitées selon les caractéristiques socio-démographiques et par analyses bivariées. Résultats : Sur les 111 médecins interrogés, aucun pédiatre et seuls 2 généralistes (1,8 %) l'utilisaient. Les fonctionnalités étaient estimées utiles par plus des deux tiers des participants sauf pour celle « rappels automatiques au patient » retrouvée à 63,1 %. Les principaux freins étaient l'adhésion payante, le temps et la méconnaissance de l'outil. Environ 4 participants sur 5 étaient favorables à des campagnes d'information et moins de 5 % s'opposaient à d'éventuelles campagnes d'ouverture de CVE. Conclusion : Le CVE est très faiblement utilisé à La Réunion mais un intérêt pour cet outil existe. Le développement de la communication, le financement de son adhésion et la mise en œuvre de campagnes d'ouverture pourraient favoriser son essor dans le but de promouvoir la vaccination.

**Sujets :** Vaccination -- La Réunion (France ; île)

Dossiers médicaux -- La Réunion (France ; île)

Médecins généralistes -- La Réunion (France ; île)

Vaccination des enfants -- La Réunion (France ; île)

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03380229">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03380229</a>

Titre : Parcours de soins préhospitalier des patients hospitalisés pour AVC en 2018 au GHER de la Réunion.

Auteur : Octobre, Cédric (1991-....) Directeur de thèse : Côme, Gérard

Spécialité : Médecine générale

Date: 2021

Nombre de pages : 51

Bibliographie: 38 références

Résumé: Introduction: L'AVC est une pathologie fréquente et complexe à prendre en charge: il faut pouvoir poser le diagnostic dans un délai restreint afin de pouvoir le traiter au mieux. Nous avons voulu étudier le parcours préhospitalier des patients hospitalisés au GHER en 2018 pour AVC. Méthode: étude unicentrique quantitative rétrospective et observationnelle. Étude de 155 dossiers de patients hospitalisés pour AVC en 2018. Résultats: 100% des patients ayant été thrombolysés sont arrivés par ambulance. Tous les patients ayant consulté le médecin traitant avant de venir aux urgences sont arrivés hors délais. Plus le score NIHSS est élevé et plus les patients consultent rapidement. Pas de différence de rapidité de prise en charge en fonction du sexe. Taux de thrombolyse est de 12% pour 2018 au GHER. Conclusion: Le faible taux de thrombolyse est en lien avec le retard de consultation aux urgences. Le score NIHSS ainsi que le transport en ambulance influencent le délai de consultation. L'information au public doit être intensifiée.

Sujets: Maladies cérébrovasculaires -- La Réunion (France; île)

Premiers soins -- La Réunion (France ; île)

Transport sanitaire -- La Réunion (France ; île)

Titre: Expérimentation de la supervision par observation directe par enregistrement vidéo (SODEV) pour la formation à la communication en santé: étude qualitative auprès des internes de médecine générale à La Réunion.

Auteur: Paris, Sarah (1991-....)

**Directeurs de thèse :** Reix, Grégory ; Leruste, Sébastien

Spécialité : Médecine générale

Date: 2021

Nombre de pages : 71

Bibliographie: 52 références

Résumé: Introduction: La SODEV est un outil pédagogique pour l'enseignement à la communication utilisé depuis de nombreuses années dans les pays anglo-saxons. En France, cet outil est utilisé seulement dans trois DUMG par méconnaissance du concept et obstacles matériels et/ou juridiques. L'objectif de cette étude était d'explorer l'acceptabilité, la faisabilité et l'intérêt de la SODEV des internes de médecine générale à La Réunion pour leur formation à la communication en santé. Méthode : Il s'agissait d'une étude qualitative par entretiens semidirectifs, individuels, menés auprès d'internes de médecine générale de niveau un et SASPAS. L'analyse des données utilisait le principe de la théorisation ancrée. Résultats : Onze internes ont été interrogés entre février 2020 et février 2021. L'intérêt des internes a fait l'unanimité sur le caractère innovant, intéressant, et formateur de l'outil vidéo sur le développement de leurs habiletés communicationnelles dans la relation médecin-patient. L'inconvénient principal à sa mise en place était le caractère chronophage de la supervision vidéo. Cet inconvénient était acceptable devant les bénéfices tirés de l'expérience. La mise en place technique était simple. L'acceptabilité des patients était bonne. Les internes ont considéré la SODEV comme un outil privilégié pour aborder les champs de la communication verbale et non verbale au cours des supervisions. Conclusion : La SODEV est un outil pédagogique intéressant, acceptable et dont la mise en place est réalisable au sein du DUMG de La Réunion. Les internes sont favorables à son développement au sein du programme d'enseignement du 3ème cycle des études médicales.

Sujets: Communication en médecine

Enseignement médical

Internes (médecine)

Consultation médicale

Personnel -- Supervision

Éducation -- Évaluation

Relations médecin-patient

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03377094">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03377094</a>

Titre : Application des critères de qualité en régulation lors de la permanence des soins ambulatoires à La Réunion.

Auteur : Peron, Frédéric (1992-....)

Directeur de thèse : Humbert, Patrice

Spécialité : Médecine générale

Date: 2021

Nombre de pages : 40

Bibliographie: 17 références

Résumé: Introduction: Les médecins généralistes participent à la permanence de soins ambulatoires via la régulation libérale. Afin d'améliorer cette régulation, une grille de critères qualité a été instaurée à la Réunion en 2009 par les membres de l'ARRMEL. L'objectif de cette étude est de définir le taux d'application des critères de qualité dix ans après l'élaboration de cette grille. Méthode: Il s'agit d'une étude observationnelle transversale rétrospective de 360 appels reçus entre janvier et février 2019. Résultats: Les critères d'entretien sont appliqués à plus de 75% par opposition aux critères médicaux beaucoup moins bien appliqués. Il faut préciser que certains critères ne sont pas adaptés à la régulation et d'autres sont subjectifs. Conclusion: Afin d'harmoniser la qualité de la régulation libérale, il serait nécessaire de faire évoluer la grille de critère de qualité et de renforcer son application par les médecins régulateurs. Les séances de GAP semblent être le lieu approprié pour effecteur ces changements.

Sujets: Soins médicaux ambulatoires -- La Réunion (France; île)

Soins médicaux -- Qualité -- Contrôle -- La Réunion (France ; île)

Médecins généralistes -- La Réunion (France ; île)

Régulation médicale -- La Réunion (France ; île)

Continuité des soins -- La Réunion (France ; île)

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03323139">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03323139</a>

Titre : Parcours de soins des personnes âgées consultant aux urgences de Saint-

Benoît : étude d'une population évaluée par l'équipe mobile de gériatrie.

Auteur : Prévost, Maëlig (1992-....)

Directeur de thèse : Randrianjohany, Andry

Spécialité : Médecine générale

Date: 2021

Nombre de pages : 49

Bibliographie: 61 références

Résumé: Introduction: Plus jeune mais vieillissant plus rapidement qu'en métropole, la population réunionnaise est aussi en moins bonne santé en restant plus souvent à domicile. La tendance actuelle et de limiter les recours aux urgences des personnes âgées. Le lien villehôpital est fondamental et les équipes mobiles de gériatrie en sont un des éléments principaux. L'objectif de cette étude est de décrire cette population âgée dépendante qui consulte aux urgences, son parcours de soins. Méthode : C'est une étude observationnelle descriptive transversale. Le recueil rétrospectif est effectué sur les patients âgés des urgences de Saint-Benoît en 2019 pour lesquels l'équipe mobile de gériatrie est intervenue. Résultats : Cette population dépendante (GIR 2) âgée de 82,5 ans en moyenne, à prédominance féminine (56 %), vivant entourée (66 %) à domicile (95 %), consulte souvent pour altération de l'état général dans un état stable (87,5 %). L'admission est souvent évaluée non pertinente (52 %). La perte d'autonomie est le syndrome gériatrique le plus fréquent. Discussion : Les principales problématiques soulevées sont l'isolement grandissant associé à la perte d'autonomie, le contournement du médecin traitant, le manque de lien ville-hôpital symbolisé par l'équipe mobile de gériatrie, et la prise en charge trop tardive de la dépendance. Les enjeux à venir vont concerner la coordination du secteur ambulatoire dans une logique de parcours, l'optimisation du rôle de l'équipe mobile de gériatrie et le renforcement de la prévention.

Sujets : Parcours de soins coordonnés

Personnes âgées -- Soins médicaux

Urgences en gériatrie

Médecins généralistes

Hôpitaux municipaux

Soins centrés sur le patient

Titre : Prévalence et facteur de risque de la syphilis dans la population générale à La Réunion.

Auteur: Santucci, Cédric (1986-....)

Directeurs de thèse : Bertolotti, Antoine ; Leruste, Sébastien

Spécialité : Médecine générale

Date: 2021

Nombre de pages : 76

Bibliographie: 44 références

Résumé: Contexte: La syphilis, reste en 2021 un problème majeur de santé publique. Sa prévalence mondiale estimée à 1,11 % augmente depuis l'arrêt de la déclaration obligatoire en 2000. Les dernières données réunionnaises, comme celles obtenus en CeGIDD, montre un décalage inattendu entre les prévalences de La Réunion et celles de métropoles. Objectifs : Déterminer la prévalence de la syphilis en population générale à La Réunion et les facteurs de risque associés. Méthode : PIST-MG : étude observationnelle descriptive transversale, multisite, dans des cabinets de médecine générale à La Réunion, chez les patients de 15 à 50 ans consultant le médecin généraliste, au hasard, indépendamment du motif de consultation. Remplissage d'un hétéro-questionnaire établi sur un algorithme proposant in fine de réaliser un dépistage si nécessaire, selon les recommandations en vigueur. Résultats : Sur les 7 mois de recrutement, 1 030 patients on été inclus. La prévalence de la syphilis était de 0,43 % (95 % IC 0.09 - 1,27). La précarité semblait augmenter le risque (PR 3,74, 95 % IC 0,34-41,28, p = 0.2624), de même que les co-infections avec une autre IST (PR 28,09 95 % IC 2,55-309,75, p = 0.0074) et les antécédent de violences sexuelles, déclarées par 9,6 % des patients (PR 16,7, 95 % IC 1,51-184,2, p = 0.0207). Les personnes positives étaient jeunes, souvent de sexes féminins et hétérosexuelles. Conclusions : Malgré un manque de puissance statistique, cette étude apporte une bonne compréhension des habitudes sexuelles des réunionnais, des risques et d'un flagrant manque de connaissance sur les IST. La prévalence de la syphilis chez les femmes jeunes accroit le risque de syphilis congénitale.

Sujets: Syphilis -- La Réunion (France; île)

Maladies sexuellement transmissibles -- La Réunion (France ; île)

Sexualité -- La Réunion (France ; île)

Médecine générale -- La Réunion (France ; île)

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03546580">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03546580</a>

Titre : État des lieux des connaissances des internes de médecine générale de l'Océan Indien sur le diagnostic et la prise en charge des lésions cutanées mammaires.

Auteur: Selle, Charlotte (1991-....)

Directeurs de thèse : Sultan-Bichat, Nathalie ; Nguyen, Anne

Spécialité : Médecine générale

Date: 2021

Nombre de pages : 106

Bibliographie: 63 références

Résumé: Introduction: Le sein et le mamelon peuvent être le siège de lésions cutanées d'origine infectieuse, inflammatoire et/ou tumorale. Cette partie du corps a une importance fonctionnelle, esthétique, psychologique et sexuelle. Le médecin généraliste représente très souvent le premier contact du patient dans son parcours de soins. L'objectif de cette étude a été d'évaluer le niveau de connaissances des internes de Médecine Générale (IMG) formés à la Réunion et Mayotte dans ce domaine. L'objectif secondaire cherchait à mettre en évidence une différence de connaissances en fonction du cursus universitaire. Matériel et méthode:Nous avons mené une étude quantitative, descriptive et transversale d'octobre 2019 à avril 2020, auprès des IMG de la subdivision Océan Indien en cours d'internat. Nous avons réalisé un questionnaire composé de 12 questions surle profil de l'étudiant et de 10 cas cliniques. Le questionnaire était électronique et anonyme. Résultats:Cent cinq réponses ont été obtenues auprès des 252 internes inscrits en 3èmecycle de médecine générale sur la période de recueil. La note moyenne était de 47,5/100. L'analyse par cas clinique a montré des difficultés plus importantes dans l'identification et la prise en charge des atteintes dermatologiques et/ou bénignes. Les notes concernant les atteintes gynécologiques et/ou tumorales étaient plusélevées. Le manque de puissance de l'étude n'a pas permis de mettre en évidence de différence significative de notes en fonction du parcours universitaire et de l'auto-formation. Conclusion:La formation pour le diagnostic et la prise en charge des lésions cutanées mammaires nécessite des ajustements. Les résultats obtenus montraient une insuffisance de connaissances en dermatologie, notamment pour la prise en charge de lésions bénignes. Une évolution des cours théoriques du troisième cycle pourrait être envisagée, notamment au travers d'un e-learning. Une augmentation du nombre de terrains de stage en dermatologie, ainsi qu'une majoration du temps de formation en ambulatoire pourraient améliorer l'imprégnation des IMG pour ce type de pathologies.

**Sujets :** Résidents (médecine)

Sein -- Lésions et blessures

Prise en charge personnalisée du patient

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03260539">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03260539</a>

Titre : Quels sont les freins et les limitations a la vaccination anti-papillomavirus, dans une population de collégiens ayant été sensibilisée par un programme de promotion de la santé sexuelle et de la vaccination ?

Auteur : Sitthisone, Julien (1994-....)

Directeur de thèse : Tran, Phuong Lien

Spécialité : Médecine générale

Date: 2021

Nombre de pages : 63

Bibliographie: 14 références

Résumé : Contexte : Le Cancer du col de l'utérus (CCU), viro-induit par le Papillomavirus humain (HPV), est trois fois plus mortel à La Réunion qu'en métropole. Sa prévention repose sur le dépistage par frottis et la vaccination, dont la couverture vaccinale à La Réunion est la plus faible de France. Une Etude randomisée en cours de réalisation à La Réunion évalue l'impact d'un programme de prévention de la vaccination et de la santé sexuelle sur une population de collégiens. Les premiers résultats montrent un taux faible d'enfants vaccinés. L'objectif de cette étude est d'avoir une meilleure compréhension des freins à la vaccination afin d'améliorer la couverture vaccinale sur l'ile de La Réunion. Méthodes : Etude qualitative réalisée en mai 2021 dans un collège de La Réunion participant à un essai randomisé, par des entretiens collectifs et semi-dirigés. L'analyse des données a été réalisée selon la méthode par théorisation ancrée. Résultats : malgré les effets positifs d'une campagne de prévention sur la prise de conscience de la problématique autour du HPV, les collégiens avaient une vision péjorative de la vaccination, et manquaient d'intérêt. Leurs décisions étaient influencées en grande partie par leurs parents, sous informés et souvent méfiants, avec qui ils communiquaient peu, mais aussi par leurs médecins traitants en qui ils avaient confiance. Conclusion : l'image négative de la vaccination, ancrée profondément dans l'esprit des collégiens doit être redorée. L'hésitation vaccinale doit être combattue en informant la population. Le dialogue doit être crée entre parents et enfants, notamment sur le sujet de la sexualité. Le médecin traitant devrait être remis au centre de la prise en charge par le biais de la formation continue. Les campagnes de prévention scolaire, qui ont ait leur preuve à l'international, doivent être poursuivies et améliorées, de façon multimodale et sur un public cible étendu.

```
Sujets: Utérus -- Cancer -- Chez l'adolescent -- La Réunion (France ; île)
```

Vaccin antipapillomavirus -- Chez l'adolescent -- La Réunion (France ; île)

Col de l'utérus -- Chez l'adolescent -- La Réunion (France ; île)

Cancer -- Prévention -- Chez l'adolescent

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03639691">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03639691</a>

Titre : Couverture vaccinale antigrippale des infirmiers libéraux de La Réunion.

Auteur: Thomas, Anne-Margaux (1992-....)

Directeur de thèse: Manaquin, Rodolphe

Spécialité : Médecine générale

Date: 2021

Nombre de pages : 46

Bibliographie: 54 références

**Résumé**: Introduction: La grippe est une infection respiratoire virale responsable d'épidémies saisonnières. Bien que souvent bégnine la grippe peut entrainer de graves complications chez les personnes à risque. Les professionnels de santé font partie des recommandations vaccinale antigrippale (VAG). L'objectif de notre étude été d'évaluer la couverture VAG et de déterminer les motivations, les freins et les facteurs associés à la vaccination chez des infirmiers libéraux de l'île de la Réunion. Méthodes : Étude quantitative, observationnelle, descriptive, transversale avec évaluation par questionnaire en ligne diffusé sur les réseaux sociaux du 30 octobre 2020 au 20 Janvier 2021. Les questions portaient sur des généralités sociodémographiques, les connaissances sur le vaccin et la grippe et enfin sur les attitudes de la VAG. Résultats : 136 réponses ont été recueillies. La couverture VAG des infirmiers libéraux est de 19,9%. Les motivations à la VAG sont la protection des patients, la protection de l'entourage et la protection personnelle. Les freins à la VAG sont des doutes sur l'efficacité du vaccin, la peur des effets secondaires. Être une femme, penser que la vaccination est efficace et qu'elle est recommandée pour les PDS sont des facteurs associés à la VAG. Discussion : Étude centrée sur les IDE libéraux afin d'identifier les freins spécifiques à cette population. Faible participation avec cependant une Cvacc, des motivations et freins à la VAG comparables à la littérature. Des campagnes vaccinales spécifiques, une obligation vaccinale et un travail sur l'amélioration de l'acceptabilité vaccinale sont des pistes potentielles afin d'augmenter la couverture VAG

**Sujets :** Vaccin antigrippal -- La Réunion (France ; île)

Infirmiers libéraux -- La Réunion (France ; île)

Titre : Prise en charge par Colchicine d'enthésites résistantes aux traitements antalgiques : étude descriptive sur une cohorte de 31 patients.

Auteur : Tuambilangana, Fabrice (1989-....)

Directeur de thèse : Randrianjohany, Andry

Spécialité : Médecine générale

Date: 2021

Nombre de pages : 62

Bibliographie: 60 références

**Résumé**: Introduction: La Colchicine est un des traitements utilisé en 1e intention dans la prise en charge des crises de goutte. Notre étude s'est portée sur une population de patients adressée en consultation de Rhumatologie/Algologie pour des enthésites résistantes aux traitements antalgiques classiques. Ces patients ont alors été efficacement traités par Colchicine en faisant l'hypothèse d'une étiologie goutteuse à leurs douleurs. Nous avons alors réalisé une étude descriptive de ces patients. Résultats : L'étude descriptive des 31 patients (10 hommes et 21 femmes) de notre population a mis en évidence un âge moyen de 61,387 ans. La durée moyenne des douleurs était de 30 mois. Concernant leurs antécédents médicaux, 22 patients présentaient une HTA, 17 présentaient un surpoids ou une obésité, 16 étaient diabétique de type 2 et 13 présentaient une maladie rénale chronique. Chez 14 patients, on retrouvait un antécédent de pathologie rhumatismale. 13 patients avaient des antécédents familiaux de goutte. Le bilan sanguin réalisé chez ces patients a révélé une uricémie moyenne de 417,81 µmol/L, une créatininémie moyenne de 85,69 µmol/L, une CRP moyenne de 5,16 mg/L et une monocytose moyenne de 659,03/mm³. Le bilan radiologique effectué a révélé des signes d'enthésopathies chez 26 patients. Conclusion : Les caractéristiques décrites dans notre population nous ont amenés à relier ce tableau d'enthésites à une origine goutteuse. Nous avons ainsi proposé de qualifier ce tableau clinique par le terme « Enthésite avec hyperuricémie ». La connaissance de ces caractéristiques clinico-biologique pourrait apporter une aide aux médecins pour la prise en charge de ce type de patients.

**Sujets**: Goutte (maladie)

Hyperuricémie

Enthésite

Urique, Acide

Douleur chronique

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03195789">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03195789</a>

Titre : Épidémiologie de l'AVC à Mayotte : incidence, mortalité, caractéristiques et étiologies.

Auteur : Wolff, Améthyste (1990-....) Directeur de thèse : Angue, Marion

Spécialité : Médecine générale

Date: 2021

Nombre de pages : 67

Bibliographie: 104 références

Résumé: Introduction: Nous souhaitons compléter les connaissances épidémiologiques de l'AVC à Mayotte. Les objectifs de l'étude sont de calculer les taux d'incidence et de mortalité de l'AVC ainsi que d'en étudier les facteurs de risque et les étiologies dans cette population particulière. Méthode : Le recueil de données est rétrospectif, à partir des dossiers informatiques cotés AVC entre 2013 à 2017 au centre hospitalier de Mayotte. Nous avons inclus tous patients majeurs ayant fait un AVC sur le territoire et ayant été admis à l'hôpital dans les suites immédiates. Résultats : 553 patients ont été recrutés dont 463 d'AVC ischémiques. L'incidence standardisée était de 159,9/100.000 habitants. Celle des AVC ischémiques de 125,9/100.000. La mortalité en phase aiguë était de 20,5/100.000. 78% des AVC étaient ischémiques dont 13% de nature cardio-embolique, 15% causé par l'athérome des gros vaisseaux, 42% de cause micro-vasculaire et 30% de cause indéterminée. L'âge moyen de survenue était 62 ans chez l'homme, 63 ans chez la femme. 48% des patients avaient moins de 65 ans. La prévalence de l'HTA était de 88,5%. Un traitement anti-hypertenseur était retrouvé chez 57% des hypertendus et en majorité chez des personnes bénéficiant de la sécurité sociale. L'HTA était plus prévalente dans les AVC lacunaires et les causes micro-vasculaires. La prévalence du diabète était de 33% avec une HbA1c moyenne de 9%. Les complications du diabète touchaient plus les patients sans couverture sociale. Conclusion : La population mahoraise parait particulièrement exposée aux événements vasculaires cérébraux, notamment aux lésions de la micro-circulation. En cause notamment l'importante prévalence des facteurs de risque comme l'HTA et le diabète.

Sujets: Maladies cérébrovasculaires -- Épidémiologie -- Mayotte

Maladies cardiovasculaires -- Facteurs de risque -- Mayotte

Maladies cardiovasculaires -- Mortalité -- Mayotte

Titre : Quels sont les représentations, motivations et freins face à la prévention scolaire chez les enfants à La Réunion ?

Auteur: Yap-Chim, Lindsay (1991-....)

Directeurs de thèse : Leruste, Sébastien ; Bertolotti, Antoine

Spécialité : Médecine générale

Date: 2021

Nombre de pages : 74

Bibliographie: 61 références

Résumé : Importance : L'incidence du mélanome cutané est en augmentation à La Réunion rejoignant ainsi les plus fortes incidences mondiales. Le facteur de risque principal du mélanome est l'exposition solaire pendant l'enfance. Or la prévention solaire reste insuffisante dans les écoles à La Réunion. Objectif: Explorer les représentations, les freins et motivations face à la prévention solaire chez les enfants à La Réunion. Méthode : Etude qualitative par entretiens individuels semi-dirigés chez 14 enfants d'école primaire et à La Réunion. Les données ont été collectées de novembre 2019 à octobre 2020. La suffisance théorique des données a été recherchée. Les entretiens ont été enregistrés, retranscrits, codés, triangulés, analysés puis modélisés utilisant le principe de théorisation ancrée. Résultats : L'ensemble des 14 participants ont exprimé leurs habitudes de protection qui variaient selon leur exposition solaire. La protection était moindre lors des activités quotidiennes y compris à l'école où les enfants relevaient un manque d'accès à l'ombre avec des infrastructures inadaptées. Les contraintes pratiques ont été soulevées souvent liées à l'inconfort des méthodes de protection. Un manque de prévention concernant la protection solaire de la part des adultes comprenant parents et enseignants a été relevé. Conclusion : La protection solaire des enfants en milieu scolaire est sous la responsabilité à la fois scolaire, parentale et sociale. La protection était moindre lors des activités quotidiennes ce qu'il faudrait déconstruire. Les meilleurs moyens de protection étaient les automatismes ancrés chez les enfants, acquis grâce à l'éducation parentale majoritairement mais encore insuffisante. Il paraîtrait donc intéressant d'impliquer plus activement les enseignants dans la photo-protection des enfants à l'école, en améliorant les modes de communication entre écoles et parents et en élargissant la prévention aux familles, et plus seulement à l'enfant lui même.

Sujets: Mélanome -- Prévention-- La Réunion (France; île)

Rayonnement ultraviolet -- prévention et contrôle -- La Réunion (France ; île)

Rayonnement solaire -- Effets physiologiques

Risques pour la santé -- Communication

Médecine préventive

Médecine scolaire

Enfants -- Maladies -- Prévention

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03407264">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03407264</a>

# ANESTHÉSIE RÉANIMATION

Titre: ECMO veino veineuse et contusions pulmonaires.

Auteur : Djemili, Fares (1990-....)

Directeur de thèse : Vidal, Charles

Spécialité : Anesthésie réanimation

Date: 2020

Nombre de pages : 56

Bibliographie: 100 références

Résumé: Introduction: Les contusions pulmonaires chez les traumatisés thoraciques peuvent entrainer un syndrome de détresse respiratoire aigu (SDRA) nécessitant le recours à une assistance respiratoire de type membrane d'oxygénation extracorporelle veino-veineuse (ECMO VV). L'objectif de ce travail est de faire une analyse descriptive des patients assistés par l'ECMO VV pour défaillance respiratoire d'origine traumatique et de comparer leur survie par rapport aux patients non traumatisés. Méthode : Il s'agit d'une étude rétrospective incluant tous les patients hospitalisés en réanimation polyvalente du CHU Félix Guyon de la Réunion sur la période 2011-2018 ayant bénéficié d'une ECMO VV dans les suites d'un traumatisme thoracique compliqué d'un SDRA. Résultats : Durant la période d'inclusion, 124 ECMO VV ont été implantées dont 9 ECMO VV pour SDRA dans les suites d'un traumatisme thoracique. Dans le groupe de patients traumatisés : les traumatismes initiaux étaient des accidents de la voie publique dans 55,6% des cas, le sevrage a pu être effectué chez 88% des patients, l'âge médian était de 45ans (19-55), l'indice de gravité simplifié 2 n'était pas significativement différent (42 vs 48 p=0,96), la mortalité intra hospitalière était significativement inférieure (11,1% contre 48,7% p=0,037), l'incidence de complications hémorragiques n'était pas significativement moindre (11,1% vs 46,1% p=0,07) et l'incidence des pneumonies était significativement supérieure (88,9% vs 29,8% p=0,001). Conclusion : L'ECMO VV est un dispositif de suppléance respiratoire efficace chez les patients présentant un SDRA dans les suites d'un traumatisme thoracique grave et est associé à peu de complications hémorragiques.

**Sujets :** ECMO (médecine)

Circulation extracorporelle

Blessures du thorax

Syndrome de détresse respiratoire aiguë de l'adulte

Polytraumatisés

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03401156">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03401156</a>

Titre : Exacerbation sévère d'asthme nécessitant la ventilation mécanique invasive à l'ère des techniques modernes de réanimation.

Auteur : Binachon, Antoine (1984-....)

Directeur de thèse : Persichini, Romain

Spécialité : Anesthésie-réanimation

Date: 2021

Nombre de pages : 45

Bibliographie: 56 références

Résumé: Les patients présentant une exacerbation sévère d'asthme (ESA) peuvent dans de rares cas nécessiter le recours à la ventilation mécanique invasive (VMI). Cependant, les données récentes sur cette question font défaut. Dans cette étude rétrospective et bicentrique menée sur une période de 10 ans, nous avons étudié la mortalité intra-hospitalière chez les patients atteints d'ESA nécessitant la mise sous VMI. Nous avons comparé cette mortalité à celle des patients souffrant d'autres types de détresse respiratoire à l'aide d'un modèle de ratio standardisé de mortalité (SMR). De nos jours, la mortalité des patients atteints d'ESA nécessitant la VMI est faible. La mortalité est généralement due à une défaillance multiviscérale, un ACR le jour de l'admission étant le facteur de risque principal. Chez les patients qui n'ont pas présenté d'ACR le jour de leur admission, la mortalité est encore plus faible (4%), ce qui suggère d'entreprendre chez ces patients une prise en charge maximaliste, avec notamment le recours aux thérapies de sauvetage si nécessaire.

Sujets: Asthme -- Mortalité

Respirateurs médicaux

Poumon -- Maladies

Réanimation cardiorespiratoire

Soins intensifs en pneumologie

Titre : Détermination des facteurs de risque de développer un premier épisode de pneumonie acquise sous ventilation mécanique à stenotrophomonas maltophilia en soins critiques.

Auteur : Canivet, Clémence (1992-....)

Directeur de thèse : Puech, Bérénice

Spécialité: Anesthésie-réanimation

Date: 2021

Nombre de pages : 27

Bibliographie: 51 références

Résumé : Introduction : L'incidence des pneumopathies acquises sous ventilation mécanique (PAVM) à Stenotrophomonas maltophilia (SM) est en augmentation. Cette pathologie est associée à une augmentation de la morbi-mortalité en réanimation notamment du fait d'une antibiothérapie probabiliste inadaptée et des résistances intrinsèques de ce germe. Le but de cette étude était de déterminer les facteurs de risque de survenue d'un premier épisode de PAVM à SM. Méthode: Etude rétrospective monocentrique réalisée de 2010 à 2018 dans une réanimation polyvalente du CHU de La Réunion. Ont été comparés les patients présentant un premier épisode de PAVM documenté à SM à ceux présentant un premier épisode de PAVM à un autre germe. Résultats: Pendant la période 89 patients ont développé une première PAVM à SM dont 43.8% étaient polymicrobiennes. La mortalité en réanimation était de 49.4%. Après analyse multivariée par régression logistique les facteurs de risque de survenue d'une première PAVM à SM étaient : l'insuffisance respiratoire chronique (OR 4.212 ; IC à 95% : 1.776 – 9.989 ; p = 0.001), l'insuffisance rénale chronique (OR 2.693 ; IC à 95% : 1.356 - 5.352 ; p = 0.005), l'exposition préalable aux céphalosporines de troisième génération actives sur Pseudomonas aeruginosa (OR 2.862; IC à 95%: 1.505 – 5.442; p = 0.001) et le sexe féminin (OR 2.646; IC à 95%: 1.458 – 4.808; p = 0.001). Conclusion: L'insuffisance respiratoire et rénale chronique, l'exposition préalable aux céphalosporines de troisième génération actives sur Pseudomonas aeruginosa et le sexe féminin ont été identifiés comme facteurs de risque de développer un premier épisode de PAVM à SM.

Sujets: Infections à Stenotrophomonas maltophilia

Pneumonie acquise sous ventilation mécanique

Réanimation

Respiration artificielle

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03426295">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03426295</a>

Titre : Embolie gazeuse : épidémiologie au bloc opératoire et analyse des outils de diagnostic.

Auteur : Caro, Pierre (1993-....)

Directeur de thèse : Bonnet, Corentin

Spécialité: Anesthésie-réanimation

Date: 2021

Nombre de pages : 65

Bibliographie: 64 références

Résumé: Introduction: L'embolie gazeuse est définie par une migration suite à une brèche vasculaire, de bulles de gaz dans la circulation sanguine. C'est une problématique connue et bien définie mais dont le diagnostic est difficile. A l'aide de notre étude nous allons mettre en évidence et évaluer des critères cliniques et paracliniques qui seraient spécifiques de l'embolie gazeuse. Ces critères seront associés pour tenter de former un score clinique diagnostic. Méthode: Ce travail est scindé en deux parties précédées d'explications sur la physiopathologie de l'EG. La première est un recueil épidémiologique prospectif, exhaustif et monocentrique réalisé sur une période limitée dans des blocs opératoires centraux, pour des procédures considérées « à risque » d'embolie gazeuse. Il a pour objectif la détermination de l'incidence de l'EG et le recueil de signes associés à l'EG. La deuxième est une analyse cas-témoin des cas recensés d'embolie gazeuse. Les cas recueillis en rétrospectifs sont comparés aux témoins recueillis en prospectif. Résultats : L'association des trois critères cliniques : chute de 25% de l'ETCO2, Désaturation<90% et Collapsus hémodynamique était associé au diagnostic EG avec une VPP de 78%. Les rapports de cotes entre 3 critères et 0 critères et entre 3 critères et 1 ou deux critères étaient aussi significativement (p<0.0001) plus forts témoignant ainsi de la pertinence et l'utilité clinique d'une telle association.

Sujets: Embolie gazeuse -- Épidémiologie

Titre: Comparaison du risque hémorragique sous ticagrelor et du clopidogrel en réanimation chez des patients présentant un syndrome coronarien aigu admis en réanimation.

Auteur: Charpentier, Thibault (1990-....)

Directeur de thèse : Allyn, Jérôme

Spécialité: Anesthésie-réanimation

Date: 2021

Nombre de pages : 57

Bibliographie: 66 références

Résumé: Introduction: Le risque hémorragique en réanimation avec un syndrome coronarien aigu (SCA) traité par double anti-agrégation plaquettaire aspirine et ticagrelor n'est pas connu. L'objectif de cette étude était de comparer le risque hémorragique du ticagrelor et du clopidogrel chez des patients en réanimation présentant un SCA. Méthode : Nous avons mené un étude rétrospective basée sur un score de propension. Tous les patients présentant un SCA hospitalisés dans la réanimation d'un hôpital français entre janvier 2013 et janvier 2017 étaient inclus. Un évènement hémorragique était défini comme un évènement majeur ou mineur selon la classification Thrombolysis In Myocardial Infarction (TIMI). Résultats : 155 patients ont été inclus dans l'étude. Après appariement par le score de propension, 57 patients traités par aspirine et ticagrelor étaient appariés avec 57 patients traités par aspirine et clopidogrel. Durant le séjour en réanimation, un évènement hémorragique est survenu chez 12 patients (21,1%) traités par clopidogrel et chez 35 patients (61,4%) traités par ticagrelor (p<0,0001). Cette association significative était retrouvée pour les TIMI major bleeding (12,3% vs. 35,1%, p=0,004), et les TIMI minor bleeding (8,8% vs. 26,3%, p=0,01). Il na pas été retrouvé de différence significative de la mortalité en réanimation. Conclusion : Les complications hémorragiques sont des évènements fréquents et graves chez les patients présentant un SCA en réanimation. Une double anti agrégation plaquettaire par aspirine et ticagrelor est associée à un risque hémorragique supérieur comparée à une double anti agrégation plaquettaire par aspirine et clopidogrel.

Sujets: Ticagrélor

Clopidogrel

Antiagrégants plaquettaires

Réanimation

Hémorragie -- Prévention

Titre : Effet de l'indice de masse corporelle sur le devenir en réanimation de patients traités par ECMO veino-artérielle pour choc cardiogénique.

Auteur : Girard, Léandre (1990-....) Directeur de thèse : Vidal, Charles

Spécialité : Anesthésie-réanimation

Date: 2021

Nombre de pages : 45

Bibliographie: 73 références

Résumé: Introduction: Le pronostic du patient obèse en réanimation est sujet à débat. L'obésité reste cependant considérée comme une contre-indication relative à l'assistance circulatoire par membrane d'oxygénation extracorporelle veino-artérielle (ECMO VA) lors d'un choc cardiogénique réfractaire. Ainsi, nous avons étudié le lien entre l'indice de masse corporelle (IMC) et le devenir du patient en réanimation. Méthodes : Dans cette une étude rétrospective et monocentrique, tous les patients traités par ECMO VA de janvier 2014 à décembre 2019 étaient inclus. Le critère de jugement primaire était la mortalité en réanimation. Résultats : Parmi les 150 patients inclus et selon les définitions de l'OMS, 10 étaient insuffisants pondéraux (IMC < 18.5), 62 étaient normo-corpulents (IMC = 18.5-24.9), 34 étaient en surpoids (IMC = 25.0-29.9), 34 étaient obèses modérés (IMC = 30.0-34.9) et 10 étaient obèses sévères (IMC = 35.0-39.9). Le taux de mortalité en réanimation était de 62% (insuffisance pondérale, 70%; normo-corpulence, 53%; surpoids, 65%; obésité modérée, 71% ; obésité sévère, 70% ; p = 0.94). Après analyses multivariées, l'IMC n'était pas associé à la mortalité en réanimation (OR 0.991 [0.92-1.07], p = 0.8). L'analyse par classe retrouvait une tendance plus défavorable chez les patients insuffisants pondéraux (OR 3.58 [0.816-19.6], p = 0.11). Il n'y avait pas de différence de taux d'infections nosocomiales, de saignements et d'AVC selon les classes pondérales. Conclusion : L'IMC n'était pas associé à la mortalité dans notre étude. L'obésité sévère seule ne devrait pas exclure l'implantation d'une ECMO VA. Cependant, une tendance plus défavorable se dessinait chez les patients insuffisants pondéraux.

**Sujets:** Circulation extracorporelle

ECMO (médecine)

Obèses

Indice de masse corporelle

Surpoids

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03186333">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03186333</a>

Titre : Évaluation de la réponse au remplissage par le doppler carotidien au bloc opératoire du CHU de la Réunion.

Auteur : Roubertou, Roxane (1993-....) Directeur de thèse : Bonnet, Corentin

Spécialité : Anesthésie-réanimation

Date: 2021

Nombre de pages: 42

Bibliographie: 49 références

Résumé: Introduction: Prédire la réponse au remplissage est un des enjeux majeurs en anesthésie. De nombreux indices hémodynamiques statiques et dynamiques sont utilisés mais nécessitent des techniques invasives. Le but de cette étude était de déterminer si le doppler carotidien pouvait correctement identifier une réponse à un mini remplissage. Méthode : L'étude prospective comprenait 58 mesures chez des patients sous anesthésie générale pour différentes chirurgies. Le pourcentage d'augmentation de l'ITV carotidienne (%ITV250) et de la vitesse systolique carotidienne (%Vc250) étaient comparés au volume d'éjection systolique du doppler œsophagien après un remplissage de 100 et 250 ml de cristalloïdes. Résultats : Une augmentation de plus de 12,2 % du %ITV250 et de 8,5 % du %Vc250 prédit une réponse au remplissage avec une sensibilité de 76 % et 63 %, une spécificité de 75 et 70 %, une AUC de 0,79 et 0,68 respectivement. La corrélation entre le %ITV 250, le %Vc250 et le %SV était positive selon le coefficient de Pearson ( $r^2 = 0.42$  et 0,094, respectivement avec P <0 .001 et p=0,48). On retrouvait également une augmentation des paramètres du doppler carotidien chez les répondeurs, significativement différente de ceux des non répondeurs. Conclusion : les variations de l'ITV et de la vitesse systolique obtenues par doppler carotidien sont un bon reflet de la réponse à un mini remplissage. Cet outil peut donc être une alternative au doppler œsophagien pour les patients sous anesthésie générale.

Sujets: Échographie Doppler

Échocardiographie Doppler

Artères carotides

Coeur -- Débit

Hémodynamique

Anesthésie en cardiologie

# BIOLOGIE MÉDICALE

Titre: Mise en place de la quantification de la mutation NPM1 de type a au CHU de La Réunion: évaluation du kit Ipsogen® NPM1 mutA mutaQuant.

Auteur : Prairat, Pierre-Louis (1992-....)

Directeur de thèse : Mimoun, Aguirre

Spécialité : Biologie médicale

Date: 2021

Nombre de pages: 85

Bibliographie: 100 références

Résumé: Introduction: La mutation du gène NPM1 (Nucleoplasmine) représente l'une des mutations acquises les plus fréquemment observées dans les leucémies aiguës myéloïdes (LAM) (30%), en particulier au sein des LAM à caryotype normal. Parmi les nombreux types de mutants NPM1, la mutation de type A est la plus fréquente et représente 80% des mutants. La mise à jour 2016 de la classification OMS des hémopathies malignes en a fait une entité à part entière, classée parmi les LAM avec anomalies génétiques récurrentes, de par ses caractéristiques cliniques, biologiques et pronostiques. La quantification de la mutation NPM1 constitue une cible moléculaire robuste pour la MRD (Measurable Résidual Disease), outil désormais indispensable pour guider l'attitude thérapeutique et détecter précocement les rechutes au cours du suivi. La technique de référence pour la quantification des mutations NPM1 est la RT-qPCR sur ADN complémentaire. Au CHU sud Réunion, parmi les cent trentetrois LAM diagnostiquées entre janvier 2015 et juillet 2020, vingt sont des LAM NPM1 (15%) et dix-sept sont des mutations NPM1 de type A (85%). La quantification des LAM NPM1 de type A, actuellement externalisé en métropole à l'hôpital Cochin à Paris, représente une activité significative. Ceci justifie sa mise en place à La Réunion, et permettrait ainsi d'obtenir des délais de rendu de résultats plus courts et optimiser le suivi des patients. Méthode : ce travail évalue la faisabilité de la mise en place de la quantification de la mutation NPM1 de type A au CHU de La Réunion par l'utilisation du kit Ipsogen® NPM1 MutA MutaQuant (QIAGEN) sur l'appareil de qPCR du laboratoire (LightCycler® 480 de Roche Diagnostics). Trois axes de travail ont été menés : la validation analytique de la RT-qPCR, la reprise du suivi moléculaire de trois patients pour comparaison avec notre centre de référence et l'évaluation des performances du kit commercial dans les conditions de travail de notre laboratoire de biologie moléculaire. Résultats: Nos manipulations ont validé les critères de validation analytique de la RT-qPCR. Le suivi moléculaire des trois patients est concordant avec les données de notre centre de référence. L'évaluation de l'exactitude, par l'intermédiaire des Evaluations Externes de Qualité (EEQ) auxquelles participent 23 laboratoires en France, montre des résultats discordants avec le groupe de pairs. Conclusion : La mise en place de la quantification de la mutation NPM1 de type A par le kit NPM1 MutA Mutaquant d'Ipsogen est faisable au CHU Sud Réunion dans les conditions actuelles. Cependant, des études supplémentaires sont nécessaires pour expliquer la non-conformité de nos EEQ et satisfaire aux exigences d'accréditation du COFRAC.

Sujets: Leucémie aigüe myéloïde

Maladie résiduelle

PCR (génétique)

Marqueurs biologiques

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03543406">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03543406</a>

Titre : Toxoplasmose maternelle et congénitale à Mayotte : épidémiologie et prise en charge.

Auteur: Kamus, Laure (1991-....)

Directeur de thèse : Vauloup-Fellous, Christelle

Spécialité : Biologie médicale

Date: 2021

Nombre de pages : 75

Bibliographie : 56 références

Résumé: La toxoplasmose (TX), causée par un protozoaire intracellulaire, Toxoplasma gondii, est une infection mondiale. La TX est généralement asymptomatique, mais contractée pendant la grossesse, elle peut provoquer une toxoplasmose congénitale (TC) et être responsable de lésions foetales. Les informations épidémiologiques sur la TX ne sont pas encore disponibles à Mayotte (département français d'outre-mer). Nos objectifs étaient d'évaluer (1) la prévalence de la TX maternelle, (2) l'incidence des TX maternelle et congénital, et (3) la prise en charge à Mayotte. Méthode : entre janvier 2017 et août 2019, toutes les données disponibles au laboratoire central public de Mayotte (Mamoudzou) et relatives au dépistage sérologique de la TX pendant la grossesse ainsi qu'à l'infection maternelle et congénitale ont été recueillies. Résultat : les données sérologiques de TX collectées chez 16 952 femmes enceintes ont été étudiées permettant d'estimer une prévalence de la TX de 67,19% à Mayotte. L'incidence minimale de la TX maternelle a été évaluée à 0,29% en considérant uniquement la primoinfection (PI) maternelle confirmée. L'incidence de la TC a été estimée à 0,09%. La prise en charge était difficile à évaluer en raison des données manquantes, cependant, nous rapportons un meilleur suivi des mères et des nourrissons nés de mères ayant une PI confirmée. Conclusion : la séroprévalence de la TX chez les femmes enceintes et son incidence à Mayotte sont plus élevées qu'en France métropolitaine. Il semble indispensable d'améliorer le dépistage anténatal, la prévention et de renforcer l'information des médecins et de la population afin d'améliorer la prise en charge et le suivi épidémiologique.

Sujets: Toxoplasmose -- Chez la femme enceinte -- Mayotte

Toxoplasmose congénitale -- Dépistage -- Mayotte

Toxoplasma gondii

Dépistage néonatal

Diagnostic prénatal

Lien vers la ressource : <u>Intranet de l'Université (accès restreint)</u>

# CHIRURGIE GÉNÉRALE ET INFANTILE

Titre : La reconstruction endoscopique du ligament anatomique est une option fiable pour traiter l'instabilité chronique de la cheville latérale.

Auteur : Ovigue, Jordan (1990-....)

Directeur de thèse : Cordier, Guillaume

Spécialité : Chirurgie générale

Date: 2020

Nombre de pages : 38

Bibliographie: 53 références

Résumé: Introduction: La reconstruction anatomique du ligament talofibulaire antérieur et du ligament calcanéo-fibulaire est un traitement fiable de l'instabilité chronique de l'arrière-pied. Le but de cette étude était d'étudier les résultats de cette procédure effectuée par une technique endoscopique. Méthodes : Cette étude est une évaluation rétrospective d'une base de données prospective. Les sujets étaient tous des patients ayant subi une reconstruction endoscopique du ligament latéral entre 2013 et 2016. Tous les patients présentaient des symptômes d'instabilité de la cheville avec test de stress manuel positif et échec du traitement conservateur pendant au moins 6 mois. Lors du suivi final, les résultats ont été évalués à l'aide du score visuel analogique (VAS), du score AOFAS (American Orthopaedic Foot and Ankle Society) et des scores de Karlsson – Peterson. Résultats : Après un suivi moyen de 31,5 ± 6,9 mois, tous les patients ont rapporté une amélioration significative par rapport à leur statut préopératoire. Le score AOFAS préopératoire est passé de 76,4 ± 15 à 94,7 ± 11,7 en postopératoire (p = 0,0001). Le score Karlsson – Peterson préopératoire a augmenté de 73,0 ± 16,0 à 93,7  $\pm$  10,6 en postopératoire (p = 0,0001). Le score VAS s'est amélioré de 1,9  $\pm$  2,5 à 0,8 ± 1,7 (p <0,001). Deux patients avaient des plaintes d'instabilité récurrente. Conclusion : La reconstruction ligamentaire endoscopique pour l'instabilité chronique de la cheville latérale est une procédure sûre et donne de bons résultats cliniques avec un minimum de complications. En outre, l'approche endoscopique permet une évaluation de l'articulation de la cheville et le traitement des lésions.

Sujets: Cheville (anatomie) -- Chirurgie

Cheville (anatomie) -- Lésions et blessures - Chirurgie

Ligaments -- Chirurgie

Ligaments -- Lésions et blessures -- Chirurgie

Ténodèse

Titre: Évaluation de la précision du système KneeAlign 2® dans le rétablissement de l'axe mécanique neutre du membre inférieur lors de la réalisation d'une prothèse totale de genou.

Auteur : Younan, M'tanioss (1991-....)

Directeur de thèse : Ballas, Richard (1981-)

Spécialité : Chirurgie générale

Date: 2020

Nombre de pages : 37

Bibliographie : 38 références

Résumé: Introduction: Le système KneeAlign 2® est un accéléromètre portable développé pour la navigation des prothèses totales de genou (PTG). Il a pour but d'associer la précision de la chirurgie assistée par ordinateur (CAO) à l'ergonomie des guides de coupe conventionnels. Hypothèse: Notre hypothèse était que l'utilisation du système KneeAlign 2® permettrait de limiter à moins de 10% les genoux présentant un alignement et/ou un positionnement des implants fémoraux et tibiaux non optimal. Matériels et méthodes : Notre étude était rétrospective, monocentrique. 52 genoux (42 genu-varum, 10 genu-valgum) présentant une gonarthrose tricompartimentale ont bénéficié d'une arthroplastie totale avec le système KneeAlign 2<sup>®</sup>. L'alignement mécanique global postopératoire (HKA) ainsi que l'alignement des implants fémoraux (alpha) et tibiaux (bêta) ont été mesurés sur des radiographies des grands axes de face des membres inférieurs. Les valeurs non optimales ont été définies par une différence de plus de 3° pour l'angle HKA et une différence de plus de 2° pour les angles alpha et bêta par rapport à l'axe mécanique neutre. Résultats : En postopératoire 23,07% des genoux présentaient un alignement mécanique non optimal du membre inférieur, 13,46% des genoux présentaient un positionnement non optimal de l'implant fémoral et 23,07 % des genoux présentaient un positionnement non optimal de l'implant tibial. Discussion : Notre étude a montré que le système KneeAlign 2® permettait un alignement optimal dans 76,92% des procédures. La comparaison aux données de la littérature semble montrer que la précision du système KneeAlign 2® n'atteint pas celle de la CAO mais se rapproche des guides de coupe. Cependant il semble réduire le risque de positionnement non acceptable des implants par rapport à la chirurgie conventionnelle.

Sujets : Prothèses de genou

Chirurgie orthopédique

Arthroplastie -- Genou

Genou -- Chirurgie

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03025275">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03025275</a>

Titre : Stratégie analgésique dans la prise en charge des fractures du col du fémur traitées par prothèses.

Auteur : Chirez, Pierre (1989-....)

Directeur de thèse : Felden, Arnaud

Spécialité : Chirurgie générale

Date: 2021

Nombre de pages : 49

Bibliographie: 39 références

Résumé : Introduction : La prise en charge de la douleur dans les fractures du col du fémur traitées par prothèse est primordiale pour permettre une réhabilitation précoce. L'objectif de cette prise en charge est de permettre aux patients un mobilisation précoce tout en réduisant au maximum la consommation de morphiniques. Les blocs périnerveux et l'infiltration d'anesthésique locale permettent de répondre à ce double objectif. Au CHU Sud Réunion, nous avons comparé 3 techniques analgésiques : Le Bloc Ilio-Fascial, Le PENG bloc et l'Infiltration chirurgicale. Matériels et méthodes : Étude monocentrique et rétrospective incluant tous les patients opérés par Prothèse de hanche sur fracture de mai à septembre 2021 et ayant bénéficié soit d'un Bloc Ilio-fascial, soit d'un PENG bloc, soit D'une Infiltration Chirurgicale d'anesthésique locale. Le critère de jugement principal était l'évaluation de la douleur sur une échelle visuelle analogique, à la mobilisation à 24h. Les critères de jugement secondaires étaient : la consommation de morphiniques à 24h, le délai avant la premier lever, la douleur spontanée à 12, 24 et 48h post opératoire. Résultats : 32 patients ont été inclus dans l'étude. 11 patients ont bénéficié d'un bloc ilio-fascial, 10 d'un PENG bloc et 11 d'une infiltration chirurgicale. La douleur à la mobilisation et au repos étaient moins importantes chez les patients ayant bénéficié d'une infiltration chirurgicale et d'un PENG bloc par rapport à ceux qui ont reçu un Bloc ilio-fascial (p =0,034/p=0,029). La consommation de morphiniques à 24h était faible dans les 3 groupes, 19 patients sur 32 n'en ont pas consommé. Conclusion : L'infiltration chirurgicale et le PENG bloc semblent plus efficaces sur la douleur que le Bloc ilio fascial. Notre étude et les données de la littérature confortent notre hypothèse que l'infiltration chirurgicale est plus efficace que les blocs périnerveux dans la chirurgie prothétique sur fracture. Il est nécessaire de compléter notre travail par des études randomisées prospectives ultérieures.

Sujets : Gestion de la douleur

Col du fémur -- Fractures

Prothèses de hanche

Analgésie

Algologie (médecine)

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03478551">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03478551</a>

Titre : Injection intra-articulaire de moelle osseuse concentrée totale autologue chez des patients atteints de rhizarthrose.

Auteur : Daoudi, Ismaël (1989-....)

Directeur de thèse : Pelissier, Philippe

Spécialité : Chirurgie générale

Date: 2021

Nombre de pages : 74

Bibliographie: 182 références

Résumé: Introduction: La Moelle Osseuse Concentrée Totale (MOCT) contenant, cellules souches mésenchymateuses, plasma riche en plaquettes et divers facteurs de croissance, paraît être une technique intéressante pour traiter l'arthrose. Notre hypothèse était que l'injection intra-articulaire de MOCT permettrait d'améliorer les symptômes chez les patients atteints de rhizarthrose après 1 an de recul. Méthode : Les injections ont été réalisées sur 27 pouces. La moelle osseuse était aspirée au niveau de la crête iliaque, concentrée par centrifugation, puis injectée sous contrôle scopique dans l'articulation pathologique. L'évaluation clinique faite au dernier recul, soit 16 mois post-opératoire en moyenne (8-26), comprenait, la mesure des scores fonctionnels QuickDASH et PRWE, la douleur à l'Echelle Numérique (EN) et l'abduction du pouce en degré. Résultats : Les scores QuickDASH et PRWE étaient respectivement de 59 et 88 en pré-opératoire et de 29 et 50 en post-opératoire. L'EN s'était améliorée en passant de 7 à 4. L'abduction du pouce s'était améliorée de 18° en moyenne par rapport au données préopératoires. Aucune complication post-opératoire n'a été mise en évidence et deux patients ont dû être opérés du fait de l'inefficacité de l'injection. Conclusion : L'injection intra-articulaire de MOCT, de par l'amélioration de la qualité de vie qu'elle entraîne chez les patients atteinst de rhizarthrose, paraît être un moyen efficace de retarder la mise en route d'un traitement chirurgical.

Sujets: Rhizarthrose

Cellules souches

Cellules stromales mésenchymateuses

Thérapeutique cellulaire

Cultures cellulaires

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03401286

Titre : Chirurgie bariatrique en trois temps : anneau, sleeve puis bypass, résultats à moyen terme d'une cohorte rétrospective.

Auteur : Dubus, Valentin (1991-....)

Directeur de thèse : Kassir, Radwan

Spécialité : Chirurgie générale

Date: 2021

Nombre de pages : 53

Bibliographie: 99 références

Résumé : Introduction : La chirurgie bariatrique est le meilleur traitement de l'obésité. Les trois principales interventions chirurgicales pratiquées dans le monde sont la sleeve gastrectomie (SG), le bypass gastrique Roux-en-Y (RYGB) et l'anneau gastrique (LAGB). Toutes les interventions bariatriques comportent un risque d'échec. Les causes de conversion sont une perte de poids insuffisante, des comorbidités non contrôlées, la présence d'effets secondaires. Parfois, la deuxième intervention s'avère également être un échec. Les stratégies en trois étapes ont été peu décrites. L'objectif de cette étude est de mesurer l'excès de perte de poids (%EWL) de trois chirurgies bariatriques consécutives selon le schéma : LAGB, SG et RYGB. Matériels et Méthodes : Dans une cohorte rétrospective ont été inclus tous les patients qui ont subi une triple intervention bariatrique selon le schéma LAGB, SG et RYGB. Résultats : Onze patients ont été inclus, avec un BMI moyen de 48,9 ± 7,7. Lors de la première conversion, l'EWL était de 15,3% ± 23,2 après 6,8 ans ± 3,3 en moyenne. Lors de la deuxième conversion, l'EWL était de 31,6 % ± 12,7 et tous les patients ont eu une perte de poids positive, mais aucun n'a dépassé 50 % d'EWL pour une durée totale de suivi de 9,8 ans ± 1,3 en moyenne. À la fin du traitement, le BMI moyen était de 29,7 ± 3,6 pour 78,8 % d'EWL ± 15,2 en moyenne, tous les patients avaient au moins 50 % d'EWL. Au dernier poids connu, le suivi moyen était de 16,8 ans ± 4,0. Conclusion : La possibilité d'une procédure RYGB ne doit pas être exclue même en cas d'échec de deux procédures antérieures bien menées.

Sujets: Obésité -- Chirurgie

Gastrectomie longitudinale

Dérivation gastrique

Gastroplastie

Obésité -- Thérapeutique

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03469096">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03469096</a>

Titre : Les complications vasculaires de la transplantation rénale : résultats sur 3 ans au centre-hospitalo-universitaire de La Réunion.

Auteur : Mahjoubi, Lilia (1990-....) Directeur de thèse : Khantalin, Ilya

Spécialité : Chirurgie générale

Date: 2021

Nombre de pages : 168

Bibliographie: 71 références

Résumé: Les défis vasculaires de la transplantation rénale ont un impact sur les défaillances et pertes de greffons à court, moyen et long terme. Documenter les complications vasculaires post opératoires de la transplantation rénale afin d'évaluer l'incidence de celles-ci au CHU de La Réunion.178 transplantations rénales ont été réalisées entre le 1er mars 2017 et le 1er mars 2020 au seul centre de transplantation rénale de La Réunion à Saint-Denis. Les dossiers médicaux de tous les patients ont été analysés rétrospectivement. 17 patients ont présenté des complications vasculaires post opératoires (9,6%) dont : 7 sténoses de l'artère rénale du greffon, 3 thromboses de l'artère rénale du greffon, 1 sténose de la veine iliaque, 5 thromboses veineuses du greffon. Parmi ces 17 patients compliqués, 5 avaient reçu un greffon à vaisseaux multiples, aucun n'avait reçu de greffon avec une lésion vasculaire, aucun n'avait de lésion aorto-iliaque préexistante, et 4 patients avaient présenté une complication per opératoire (3 plicatures artérielles et 1 plaie hémorragique). Il y a eu 1 perte de greffon (0,6%), 1 explantation (0,6%) et 10 patients (5,6%) repris chirurgicalement suite à une complication vasculaire. La mortalité opératoire et globale dans la population compliquée était nulle sur un suivi maximum de 3 ans. L'incidence des complications vasculaires post opératoires dans notre centre est comparable à la littérature. La survenue d'une complication vasculaire n'a pas d'impact sur la fonction rénale du greffon au long cours ou sur la survie globale du patient. Le sexe féminin et l'obésité sont des facteurs délétères sur la survenue de complications vasculaires.

Sujets: Rein -- Transplantation

Appareil urinaire -- Chirurgie

Complications chirurgicales

Rejet de greffe

Facteurs de risque

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03462696">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03462696</a>

Titre : Étude rétrospective de deux groupes de patients appariés comparant la cystectomie totale pour cancer de vessie par voie ouverte ou robot-assistée avec dérivation urinaire intra-corporelle.

**Auteur :** Ngo, Léa (1991-....)

Directeur de thèse : Bladou, Franck

Spécialité : Chirurgie générale

Date: 2021

Nombre de pages : 42

Bibliographie: 37 références

Résumé : Introduction : La cystectomie totale (CT) avec curage étendu est le traitement de référence des tumeurs vésicales infiltrantes, idéalement associé à une chimiothérapie néoadjuvante. Les avantages d'un abord mini-invasif robot-assisté pour réaliser l'exérèse et la reconstruction urinaire par rapport à une chirurgie ouverte standard sont débattus. Nous présentons les résultats d'une analyse comparative de deux séries appariées de CT réalisées par voie ouverte (CT-O) et robot-assistée (CT-R). Méthode : Entre 12/2011 et 02/2019, les patients issus de 2 centres (français et canadien) ayant bénéficié d'une CT-R en début d'expérience ont été inclus (CT + dérivation urinaire intracorporelle). Chaque patient CT-R a été apparié à un autre, opéré par CT-O durant la même période, selon l'âge, le sexe, le stade TNM, les comorbidités et le score ECOG. L'objectif était de comparer la CT-O et la CT-R en termes de résultats oncologiques et de données péri-opératoires (durée d'intervention, saignement peropératoire, transfusion, durée d'hospitalisation, taux et types de complications). Les protocoles français et canadien différaient, avec un passage systématique en réanimation post-opératoire pour les patients français. Résultats : Parmi les 24 patients inclus dans le bras CT-R, l'âge médian était de 65 ans (47-83) contre 68 (45-91) dans le groupe CT-O (p=0,3). Les sex-ratio, scores ASA, Charlson, ECOG, et TNM étaient similaires entre les 2 groupes. Les pertes sanguines peropératoires médianes étaient de 350mL (100-900) vs 700mL (200-3200), (p = 0,002) et les taux de transfusion péri-opératoire de 4% vs 62% dans les groupes CT-R et CT-O respectivement (p = 0,001). La durée médiane d'intervention était de 290 min (150-405) dans le groupe CT-O contre 411 min (176-573) dans le groupe CT-R (p=0,002). Les DMS étaient de 13 jours (ET 6,94) dans le groupe CT-R contre 23 (ET 18,45) dans le groupe CT-O (p = 0,013). Les données carcinologiques étaient comparables en termes de nombre de ganglions prélevés, taux de R1, stades pTNM. Discussion : Dans cette étude de début d'expérience de la CT-R, la durée d'intervention était plus longue pour la CT-R que pour la CT-O. Cependant, la CT-R a entrainé un taux de transfusion très faible, avec des DMS nettement plus courtes pour des résultats en termes de morbidité et carcinologiques équivalents au standard que représente toujours la CT-Ο.

Sujets: Cystectomie

Appareil urinaire -- Chirurgie

Tumeurs de la vessie urinaire

Abdomen -- Chirurgie

Urostomie

Interventions chirurgicales robotisées

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03407368">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03407368</a>

Titre : Incidence et facteurs de risque de fistule anastomotique (FA) après Exérèse Totale du Mésorectum (TME) par coelioscopie pour adénocarcinome rectal : évaluation d'un score prédictif de fistule.

Auteur: Pluchon, Alisson (1992-....)

Directeur de thèse : Chaisemartin, Cécile de

Spécialité : Chirurgie générale

Date: 2021

Nombre de pages : 46

Bibliographie : 47 références

Résumé: Objectifs: Les fistules anastomotiques (FA) après proctectomie grèvent le pronostic fonctionnel et oncologique des patients. Une dérivation temporaire est recommandée pour les anastomoses sous-douglassiennes. L'objectif était de définir les facteurs de risque de FA après TME par laparoscopie pour adénocarcinome du rectum dans un centre à haut volume et de tester la reproductibilité d'un score prédictif de FA afin de tenter d'en diminuer l'incidence et de sélectionner les patients chez qui la stomie pourrait être évitée. Matériels et méthodes : Étude monocentrique et rétrospective, incluant les patients opérés d'une exérèse partielle ou totale du mésorectum sur 5 ans pour un adénocarcinome du rectum par laparoscopie. L'incidence et les facteurs de risque de FA ont été étudiés dans la série globale puis plus spécifiquement dans le sousgroupe des TME. Le score prédictif de fistule évalué était celui du registre international des TaTME, comportant 5 critères : le genre, l'IMC, le tabac, le diabète et la taille tumorale (25). Résultats : Entre janvier 2014 et décembre 2019, 434 patients ont été opérés d'une exérèse rectale conservatrice par laparoscopie pour un adénocarcinome. 292patients ont eu une TME, le taux de FA globale était de 16 % et le taux de fistule précoce était de 7,8 %. Les facteurs de risque de FA globale était la dénutrition (p = 0,035), la taille tumorale (p = 0.014), l'abord périnéal premier (p = 0.027), l'anastomose manuelle (p < 0.01). Les facteurs de risque de FA précoce étaient la taille tumorale (p = 0.035) et le tabac (p = 0.012). En analyse multivariée, seuls la taille tumorale (p = 0,038), l'abord périnéal premier (p = 0,044) et le caractère manuel de l'anastomose (p = 0,03) étaient des facteurs de risque indépendants de FA. Le tabac (p = 0,012) était un facteur de risque indépendant de FA précoce. Le score évalué n'était pas prédictif de FA dans notre série. La survenue d'une FA était significativement liée à une augmentation des récidives locorégionales (p < 0,01) et à une diminution de la survie globale (p = 0,023). Conclusion : Avec un taux de FA comparable à la littérature sur une large série, nous n'avons pas validé le score prédictif choisi. La gravité des FA et l'absence de facteur de risque modifiable identifié doivent nous rendre prudents quant à un éventuel changement de pratique sur la dérivation temporaire. Des études prospectives en cours pourraient permettre de mieux sélectionner les patients chez qui il serait licite de proposer l'abstention de dérivation systématique.

Sujets: Désunion anastomotique

Coelioscopie

Tumeurs du rectum

Tumorectomie

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03426446">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03426446</a>

Titre : Reflux vésico-urétéral primaire chez l'enfant : évolution dans l'enfance du traitement conservateur.

Auteur : Kassir, Rani (1989-....)

Directeur de thèse : Michel, Jean-Luc

Spécialité : Chirurgie infantile

Date: 2021

Nombre de pages : 51

Bibliographie: 69 références

Résumé: Introduction : La pathogénie du Reflux Vésico-Urétéral (RVU) persistant asymptomatique n'est pas claire et la littérature scientifique concernant ce sujet est limitée. L'objectif de notre étude est d'évaluer les conséquences sur le rein, du RVU persistant, non opéré et asymptomatique après l'âge de 3 ans. Matériel et Méthodes : Dans le service de chirurgie pédiatrique du CHU de la Réunion, nous avons suivi tous les enfants de moins de 3 ans ayant eu un diagnostic de RVU par cystographie, une scintigraphie rénale au 99mTc-DMSA (scintigraphie 1), et qui n'avaient pas été opérés entre 2004 et 2012. Tous les enfants ont bénéficié d'une surveillance. Lors du suivi, la récidive d'infection urinaire fébrile impliquait un changement de stratégie avec la proposition d'un traitement chirurgical. En absence de récidive d'infection urinaire fébrile, la stratégie conservatrice était poursuivie au-delà de l'âge de 6 ans avec la réalisation d'une nouvelle scintigraphie rénale (scintigraphie 2) qui marquait la fin de l'étude et qui était comparée à la scintigraphie 1. Résultats : Parmi les 60 patients inclus, 42 patients (24 garçons) ont eu une observation complète (18 ont été perdus de vue). 85.7% (36/42) des RVU ont été diagnostiqués suite à une infection urinaire fébrile. 85.2% (52/61 unités rénales) des RVU était de bas grade. La scintigraphie 1 a été réalisée à l'âge médian de 2 ans et 6 mois. Elle était anormale dans 35.7 % (15/42) des cas : 4 cas d'asymétrie fonctionnelle associée à une cicatrice rénale et 11 cas d'asymétrie fonctionnelle isolée. Après une période de suivi médiane de 5 ans 9 mois, 88.1%(37/42) des enfants n'ont pas eu de récidive infectieuse urinaire. La scintigraphie 2 était stable dans 88.2% (30/34) des cas. Elle a montré une nouvelle cicatrice rénale dans un cas, une augmentation de l'asymétrie fonctionnelle dans un cas et dans 2 cas de RVU bilatéral : une apparition, et une augmentation de l'asymétrie fonctionnelle. Conclusion : Les résultats de cette étude montre que la persistance d'un RVU asymptomatique est peu pathologique pour les reins. L'utilité d'une correction chirurgicale dans ces cas reste à prouver.

Sujets: Reflux vésicourétéral -- Chez l'enfant

Appareil urinaire -- Infections-- Chez l'enfant

Scintigraphie rénale -- Chez l'enfant

Cystite -- Chez l'enfant

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03541890">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03541890</a>

# ENDOCRINOLOGIE DIABÉTOLOGIE NUTRITION

Titre: Évaluation de l'impact de la variation du poids au cours du programme multidisciplinaire d'Education Thérapeutique du Patient en pré-Chirurgie Bariatrique sur l'efficacité et les bénéfices de la chirurgie à 1 an post-opératoire.

**Auteur :** Fontaine, Bénédicte (1993-....) **Directeur de thèse :** Bernard, Céline

Spécialité: Endocrinologie, diabétologie, nutrition

Date: 2020

Nombre de pages : 77

Bibliographie: 46 références

Résumé: Introduction: Parallèlement à l'augmentation de la prévalence de l'obésité, la pratique de la chirurgie bariatrique (CB) s'est développée. Les facteurs prédictifs préopératoires d'une bonne réponse à la CB sont multiples et doivent encore être identifiés. L'objectif de cette étude était d'évaluer l'impact de la variation du poids au cours d'un programme multidisciplinaire d'éducation thérapeutique (ETP) de préparation à la CB sur l'efficacité de la chirurgie à 1 an post-opératoire. Méthode : Il s'agissait d'une étude rétrospective, monocentrique (centre hospitalo-universitaire de Saint-Pierre à la Réunion), non contrôlée et non randomisée. Nous avions recruté les patients ayant intégré le parcours d'ETP de préparation à la CB de Octobre 2016 à Avril 2018 et qui avaient été opérés avec un suivi à 1 an post-opératoire avant fin Mars 2020. Les patients ont été séparés en 2 groupes en fonction de l'évolution pondérale entre le début et la fin du parcours d'ETP (groupe 0 = prise de poids ; groupe 1 = maintien ou perte de poids). Résultats : 105 patients avaient intégré le parcours et 83 ont été analysés. Le perte d'excès de poids moyenne à 1 an post-opératoire était comparable dans les 2 groupes (64,27% dans le groupe 0 vs 69,10% dans le groupe 1; p=0,34). Le groupe 1 avait une moindre perte au niveau de la masse musculaire moyenne par rapport au groupe 0 mais la différence n'était significative (11,94% vs 17,63%, respectivement ; p=0,30). Conclusion : La variation seule du poids en préopératoire ne permet pas de prédire une meilleure perte de poids après CB. L'adhésion au programme d'ETP préopératoire ne peut pas être jugée uniquement sur la variation du poids au cours de ce dernier.

Sujets: Obésité -- Chirurgie

Corps -- Poids -- Régulation

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03167353">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03167353</a>

Titre: Évaluation de la prévalence de la stéatose hépatique et de la stéatohépatite non alcoolique chez les patients asymptomatiques dysmétaboliques hospitalisés dans le service de diabétologie CHU Saint Pierre de novembre 2018 à mai 2019.

Auteur: Daubord, Coralie (1990-....)

Directeur de thèse : Nobecourt-Dupuy, Estelle

Spécialité : Endocrinologie, Diabétologie, Nutrition

Date: 2021

Nombre de pages : 53

Bibliographie: 74 références

**Résumé** : Introduction : La NAFLD est aujourd'hui un problème de santé publique mondial dans un contexte de croissance des maladies métaboliques, surtout à La Réunion. Elle est l'expression hépatique de ces troubles. L'objectif était d'évaluer la prévalence de la NAFLD et de ses stades évolutifs chez des patients dysmétaboliques à la Réunion puis d'observer les caractéristiques des patients suspects de NAFLD et de fibrose avancée. Méthode : Une analyse rétrospective de patients dysmétaboliques admis au CHU de St PIERRE a été réalisée. Ils ont bénéficié d'un bilan clinico-biologique, d'une échographie abdominale et d'un Fibroscan pour pouvoir les répartir dans les groupes non NAFLD, NAFLD, NASH associée à une fibrose avancée (NASH+F3) et NAFL sans fibrose avancée (NAFL/SS). La fibrose avancée était définie à l'aide des scores clinico-biologiques ou du Fibroscan. Résultats : 145 patients ont été inclus. La prévalence de la NAFLD dans la population obèse était de 83,9% et celle de la fibrose avancée de 42,8 ou 16% selon la définition. Dans la population diabétique, 78% avait une NAFLD et 43% ou 13 % une fibrose avancée. Dans la population avec syndrome métabolique, 85,5% avait une NAFLD et 52% ou 16,7% une fibrose avancée. Elles sont toutes plus élevées que la prévalence nationale pour la NAFLD et la fibrose avancée quelle que soit la définition. L'obésité de grade 3, la MG, le TT, le syndrome métabolique et l'inactivité physique sont significativement plus importants dans le groupe NAFLD. Conclusion : Dans un contexte de maladies métaboliques très présentes à la Réunion, la NAFLD ne fait pas exception avec une prévalence nettement plus élevée. Un dépistage systématique est indispensable dans le parcours de soin de ces patients.

```
Sujets: Stéatose hépatique -- La Réunion (France; île)
```

Stéatose hépatique non alcoolique -- La Réunion (France ; île)

Troubles du métabolisme -- La Réunion (France ; île)

Diabètes -- La Réunion (France ; île)

Fibrose -- La Réunion (France ; île)

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03350493">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03350493</a>

### GÉNÉTIQUE MÉDICALE

Titre : Le dépistage préconceptionnel génétique (DPCG) : état des lieux clinique et biologique en vue de la mise en place d'une étude pilote sur l'Ile de La Réunion.

Auteur : Deiller, Caroline (1990-....)

Directeur de thèse : Doray, Bérénice

Spécialité : Génétique médicale

Date: 2020

Nombre de pages: 77

Bibliographie: 45 références

Résumé: Introduction: A l'échelle internationale, le Dépistage PréConceptionnel Génétique (DPCG) est intégré aux pratiques courantes afin de promouvoir l'autonomie des couples dans leur projet de grossesse. Notre étude suit l'avis du CCNE et s'articule en deux parties: déterminer la demande des Réunionnais vis-à-vis du DPCG et estimer la fréquence des hétérozygotes pour 7 pathologies graves et récurrentes voire spécifiques à La Réunion. Méthodes: Un questionnaire de 22 items a été distribué en ligne pour recueillir l'opinion des Réunionnais majeurs. Sur le plan moléculaire, nous avons mis au point sur une collection d'ADN issus de 587 individus réunionnais des techniques permettant de rechercher de façon ciblée des 11 mutations récurrentes dans 7 pathologies. Résultats: 129/137 (94%) des sujets interrogés sont favorables au concept de DPCG dont 82 (60%) sont intéressés par un DPCG pour leur bénéfice personnel et 51 (62,2%) en sont demandeurs dans l'optique d'un projet parental. Sur le plan moléculaire, 44/552 (8%) échantillons sont hétérozygotes pour un des variants recherchés. Conclusion: Il existe une demande importante des Réunionnais en faveur du DPCG. Cette demande est étayée par nos analyses qui mettent en évidence une fréquence significative des hétérozygotes dans un échantillon issu de la population générale réunionnaise.

Sujets: Diagnostic préconceptionnel -- La Réunion (France ; île)

Dépistage génétique -- La Réunion (France ; île)

Médecine prédictive -- La Réunion (France ; île)

Maladies héréditaires -- La Réunion (France ; île)

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02952414">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02952414</a>

Titre: Syndrome de Fryns, PIGN, Hernie diaphragmatique congénitale, Océan

Indien, lle de La Réunion.

Auteur : Méleu, Audrey (1991-....) Directeur de thèse : Doray, Bérénice

Spécialité : Génétique médicale

Date: 2020

Nombre de pages : 55

Bibliographie: 45 références

Résumé: Introduction: Le syndrome de Fryns (SF) est un syndrome autosomique récessif, polymalformatif rare, létal. Le symptôme principal de ce syndrome est la hernie diaphragmatique congénitale (HDC). Le gène PIGN constitue le gène d'intérêt dont la délétion récurrente des exons 5 à 7 suggère un effet fondateur dans l'Océan Indien (OI). Méthode : La recherche de la délétion récurrente de PIGN est réalisée par PCR HRM chez 10 patients atteints d'un SF, originaires de l'OI, puis complétée par un séquençage Sanger. Pour déterminer la fréquence des hétérozygotes, la délétion est recherchée dans un échantillon représentatif de la population générale réunionnaise, et chez des patients présentant une HDC. Nous décrivons ensuite le phénotype des patients de la littérature et de notre cohorte avec mutation biallélique de PIGN. Résultats : Sept patients atteints d'un SF ont la délétion récurrente à l'état homozygote, deux patients d'une même fratrie ont la délétion à l'état hétérozygote et une mutation faux-sens. La fréquence des hétérozygotes pour cette délétion est estimée dans la population réunionnaise à 0,735%. Les 24 patients présentant une HDC hors SF ne sont pas porteurs de la délétion recherchée. La présentation clinique la plus fréquente du SF avec perte de fonction biallélique de PIGN est la dysmorphie, l'hypoplasie des phalanges distales et/ou unguéale, l'épilepsie précoce et les malformations congénitales. En anténatal, les signes échographiques sont peu spécifiques, en dehors de la HDC. Conclusion : La recherche de la délétion récurrente de PIGN est indiquée, dans l'OI, chez les patients présentant un tableau évocateur d'un SF. En anténatal, elle peut être proposée devant la seule mise en évidence échographique d'une hernie diaphragmatique.

Sujets: Hernie diaphragmatique -- La Réunion (France; île)

Déficience intellectuelle -- La Réunion (France ; île)

Troubles du comportement -- La Réunion (France ; île)

Variabilité génétique -- La Réunion (France ; île)

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03016142

## GYNÉCOLOGIE MÉDICALE ET OBSTÉTRIQUE

Titre: Impact du terme d'adressage et autres facteurs prédictifs d'issues maternelles, obstétricales et néonatales défavorables chez les patientes obèses.

Auteur : Lepinette, Anaïs (1989-....)

Directeur de thèse : Theobald, Peter von

Spécialité : Gynécologie-Obstétrique

Date: 2020

Nombre de pages: 71

Bibliographie: 29 références

Résumé : Contexte: L'obésité est une des principales causes de morbi-mortalité maternelle et néonatale dans les pays occidentaux. L'objectif de notre étude était d'évaluer l'impact du terme d'adressage sur les issues de grossesse ainsi que d'identifier les facteurs prédictifs maternels de mauvaises issues. Méthode: Il s'agissait d'une étude rétrospective multicentrique sur une cohorte de 1227 patientes avec un indice de masse corporelle supérieur ou égal à 30 kg/m2 et ayant donné naissance à un singleton, à un terme supérieur ou égal à 24 semaines d'aménorrhée courant de l'année 2016. Les complications maternelles, obstétricales et néonatales ont été analysées en fonction du terme d'adressage avec un cut off établi à 28SA, ainsi que des caractéristiques maternelles. 374 patientes ont été exclues pour des données manquantes sur des variables d'intérêt. Une analyse de sensibilité a été réalisée sur cette échantillon de population. Résultats: 873 patientes ont été analysées. 62.7% des patientes ont été adressées après 28 SA. En analyse multivariée, l'IMC (OR = 1.82 [1,23 ; 2,71], p = 0.0067), l'âge (OR = 2.35 [1.57; 3.51], p = 0.0003), l'HTA préexistante (OR = 3.53 [1.69; 7.37], p=0.0008) et le diabète préexistant (OR = 15.60 [5.48; 44.37], p < 0.0001) étaient liés de façon significative à la survenue de complications maternelles. Les complications obstétricales étaient favorisées par la nulliparité (OR = 3.70 [2.63 ; 5.26], p < 0.0001), l'antécédent de césarienne (OR = 2.37 [1.58; 3.55], p < 0.0001), l'HTA préexistante (OR = 2.26 [1.19; 4.27], p = 0.0124), et la présence de complications maternelles de la grossesse (OR = 1.62 [1.19 ; 2.19], p = 0.0021). Seule la nulliparité (OR = 2.50 [1.85; 3.45], p < 0.0001) était associée de façon significative à la survenue de complications néonatales. Le terme d'adressage ne semblait pas significativement associé à une augmentation de ces complications. Conclusion: Les patientes ayant un âge ou un IMC extrême ou souffrant d'une pathologie chronique telle que l'HTA et le diabète devraient être adressées précocement dans les centres d'accouchement du fait de leur risque accru de développer une complication maternelle de grossesse. Une attention particulière doit être portée aux patientes nullipares car en plus d'avoir un risque majoré de complications obstétricales, les difficultés techniques que l'obésité engendre ont tendance également à affecter leurs issues néonatales.

Sujets: Régulation médicale

Obésité -- Femmes

Grossesse

Grossesse à haut risque

Accouchement

Lien vers la ressource : <u>Intranet de l'Université (accès restreint)</u>

Titre : Satisfaction des patientes accouchant à La Réunion concernant la prise en charge de la douleur avec ou sans analgésie péridurale.

Auteur : Louvel, Lauriane (1990-....) Directeur de thèse : Boukerrou, Malik

Spécialité : Gynécologie-obstétrique

Date: 2020

Nombre de pages: 70

Bibliographie: 30 références

Résumé: Introduction: Le taux d'analgésie péridurale (APD) pendant l'accouchement sur l'île de La Réunion est inférieur au taux métropolitain. L'objectif de notre étude était de savoir si les patientes qui accouchaient étaient satisfaites avec ou sans APD et d'identifier les raisons de ce taux inférieur. Méthode: Nous avons réalisé une étude multicentrique prospective observationnelle dans les sept maternités de l'île de La Réunion sur toutes les patientes qui accouchaient à partir de 24 semaines d'aménorrhées et hors césarienne programmée pendant 2 semaines. Les patientes incluables recevaient un questionnaire de satisfaction à remplir en suites de couche. Résultats : Sur les 497 patientes qui ont rempli les critères d'inclusion, 303 questionnaires étaient analysables. L'APD a été reçue dans 71,3 % des cas et 87 patientes (28,7 %) ont accouché sans. Au total, 88,0 % des patientes avec APD étaient satisfaites de la prise en charge de la douleur pendant leur accouchement contre 83,9 % (n=73) sans APD. Il n'existait pas de différence significative entre les groupes (p=0,68). Parmi les patientes qui accouchaient sans APD, cela correspondait à leur décision dans 55,2 % des cas. Le désir d'un accouchement le plus naturel possible représentait 87,5 % des cas. L'accouchement sans APD en dépit du choix des patientes était dû à une dilatation trop rapide dans 90,0 % des cas. Conclusion : Aucune différence significative de satisfaction entre les femmes qui accouchaient avec ou sans APD à La Réunion n'a été retrouvée. Le taux inférieur d'APD régional semble être lié à une volonté d'accoucher le plus naturellement possible et à une dilatation trop avancée au moment de la demande d'APD.

Sujets: Anesthésie péridurale

Accouchement

Douleur

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03014280">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03014280</a>

Titre : Évaluation de la place actuelle de l'HyFoSy à La Réunion et des obstacles à sa diffusion afin d'améliorer le parcours des couples consultant pour infertilité.

Auteur: Pestre, Camille (1990-....)

Directeur de thèse : Levaillant, Jean-Marc

Spécialité : Gynécologie-obstétrique

Date: 2020

Nombre de pages : 96

Bibliographie: 141 références

Résumé: Introduction: Les examens actuellement recommandés pour évaluer la perméabilité tubaire sont invasifs et douloureux. L'HyFoSy est une technique d'imagerie par ultrason disponible depuis 2014, qui est une alternative fiable présentant une innocuité et une meilleure tolérance. Son utilisation dans le bilan d'infertilité pourrait permettre de réduire les abandons de prise en charge liés à la complexité du parcours de soin. Pourtant sa diffusion semble encore limitée. Notre étude s'est intéressée à définir : Quelle est la place de l'exploration tubaire échographique à La Réunion ? Quels sont les obstacles à sa diffusion pour les professionnels de santé susceptibles de réaliser des bilans d'infertilité du couple ? Méthode : Il s'agissait d'une étude épidémiologique, observationnelle, transversale, à recueil prospectif sur le département de La Réunion. Un questionnaire informatique a été envoyé à un ensemble de 1100 médecins généralistes, gynécologues, radiologues et sages-femmes. Résultats : 70 professionnels de santé ont répondu au questionnaire. 69 % des participants prescrivaient des bilans d'infertilité. Parmi eux (N=47), 28 % prescrivaient une échographie pour l'exploration de la perméabilité tubaire. 10 % des participants (N=70) réalisaient des explorations tubaires échographiques. Les causes principales retrouvées étaient dans 50 % des cas la méconnaissance de cet examen et dans 18 % des cas l'absence de correspondant. Conclusion : Les pratiques actuelles, à La Réunion, laissent une place encore marginale à l'échographie dans l'évaluation de la perméabilité tubaire. Les obstacles relevés permettent d'avancer des pistes de réflexions afin d'améliorer sa diffusion à La Réunion.

Sujets: Stérilité

Imagerie pour le diagnostic

Échographie

Tests de perméabilité tubaire -- Dissertation universitaire

Gels -- Dissertation universitaire

Lien vers la ressource: https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03019159

Titre: Apport d'un nouveau compte rendu type pour l'évaluation échographique préopératoire de l'endométriose pelvienne dans un contexte d'autoapprentissage.

Auteur: Langlais, Eva (1992-....)

Directeur de thèse : Eidesheim-Flye Sainte Marie, Hélène

Spécialité : Gynécologie médicale

Date: 2021

Nombre de pages : 108

Bibliographie: 98 références

Résumé: Introduction: L'échographie pelvienne est l'examen de première ligne pour le diagnostic de l'endométriose pelvienne mais une étude secondaire d'expertise est parfois nécessaire. La notion et la formation d'échographistes référents demeurent encore mal définies. Nous avons étudié l'apport d'un nouveau compte rendu en situation d'auto apprentissage dans cette quête de l'expertise échographique pour le bilan des lésions d'endométriose. Méthode : Etude rétrospective, multicentrique, observationnelle conduite entre mars 2019 et mars 2021 sur l'Ile de La Réunion. Utilisation d'un nouveau compte rendu d'échographie issue du consensus de l'IDEA chez 90 patientes adressées pour suspicion d'endométriose. Réalisation d'une étude de corrélation entre les résultats en échographie et en IRM par rapport à la chirurgie (gold standard). Puis étude des facteurs prédictifs issus de l'interrogatoire pour le diagnostic de la maladie. Résultats : Les taux de concordances en échographie sont très bon (>90%) pour les endométriomes, kissing ovaries, et nodule antérieur ; correct (80-90%) pour le sliding sign antérieur, le torus, la lame recto vaginale, et la paroi digestive; faible (80%) pour le sliding sign postérieur. Les résultats étaient similaires en échographie et en IRM pour la plupart des critères du mapping avec une sensibilité légèrement moindre de l'échographie mais une bien plus grande spécificité. Les signes fonctionnels digestifs et la baisse du sliding sign postérieur sont les plus prédictifs d'une atteinte postérieure. La diminution du sliding sign antérieur est souvent associée à un nodule antérieur (VPP 80%), mais pas les signes fonctionnels urinaires (VPP 17%). Les courbes d'auto apprentissage semblent être de 40 cas maximum. Conclusion : Ce compte rendu pourrait être avantageux afin d'améliorer la finesse de notre diagnostique, simplifier le parcours de soin, anticiper une préservation ovocytaire, former des professionnels de santé, et réduire l'impact économique du bilan d'imagerie.

Sujets: Endométriose

Diagnostic clinique

Organes génitaux femelles -- Échographie

Organes génitaux femelles -- Imagerie par résonance magnétique

Gynécologie

Lien vers la ressource : <u>Intranet de l'Université (accès restreint)</u>

Titre : Impact psychotraumatique des césariennes « code rouge » et facteurs de risque impliqués dans le trouble de stress post-traumatique des parturientes.

Auteur : Bodin, Emmanuelle (1992-....) Directeur de thèse : Peretti, Véronique

Spécialité: Gynécologie-obstétrique

Date: 2021

Nombre de pages : 55

Bibliographie: 80 références

Résumé: Introduction: Un trouble de stress post-traumatique (TSPT) est déclaré chez 3 à 6% des femmes en post-partum (PP) et jusqu'à 18,5% en cas de complications de la grossesse ou de l'accouchement. L'objectif de cette étude est d'évaluer la prévalence du TSPT après une césarienne code rouge et d'identifier les facteurs de risque parmi les facteurs de vulnérabilité prénataux, les facteurs de risque de la naissance et les facteurs d'entretien du PP. Méthode : Un questionnaire téléphonique ou informatisé incluant un Questionnaire de stress immédiat et le Posttraumatic Stress Disorder Checklist for DSM-5 a été proposé aux patientes ayant eu une césarienne code rouge entre le 12/05/2015 et le 28/02/2021 au CHU Sud de La Réunion. Résultats : Parmi les 555 césariennes retenues, 329 parturientes ont répondu. La prévalence du TSPT était de 20,1% et était stable dans le temps. Les 2 facteurs de risque retrouvés étaient l'expérience négative de l'accouchement et le vécu traumatique avéré. Les facteurs de vulnérabilité prénataux n'ont pas été retrouvés statistiquement significatifs. Près de 3 femmes sur 4 n'avaient pas été informées du risque de césarienne et plus d'1 femme sur 2 n'ont pas eu d'explications en PP. Conclusion : Les césariennes code rouge entraînent un TSPT chez 1 femme sur 5. Ce trouble pérenne peut durer jusqu'à 6 ans après l'accouchement. Cela signe la gravité de ce trouble et la nécessité de le prévenir. Le risque de le développer est 4 fois plus important en cas de vécu traumatique avéré au Questionnaire de stress immédiat. Proposer ce questionnaire en maternité pourrait être un élément important de prévention secondaire. Le rôle du personnel de santé est primordial.

Sujets : État de stress post-traumatique

Césarienne -- Aspect psychologique

Césarienne -- Aspect physiologique

Césarienne -- Complications (médecine

Accouchement -- Complications (médecine)

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03472466

Titre : Association entre le score d'Aletti et les complications post-opératoires : proposition d'une prise en charge post-opératoire adaptée au risque pour les patientes opérées d'un cancer épithélial de l'ovaire.

Auteur : Castel, Mathilde (1992-....) Directeur de thèse : Hudry, Delphine

Spécialité : Gynécologie-obstétrique

Date: 2021

Nombre de pages : 39

Bibliographie: 32 références

Résumé : Objectif : La chirurgie du cancer de l'ovaire est complexe et agressive. Un score de complexité chirurgicale (SCS) ou score d'Aletti a été décrit pour prédire le taux de complications postopératoires. Ce travail vise à vérifier l'intérêt du SCS en routine. Nous proposons ensuite une prise en charge adaptée au risque. Méthode : Toutes les patientes atteintes d'un cancer épithélial avancé de l'ovaire ayant subi une chirurgie primaire ou d'intervalle au Centre Oscar Lambret, Lille, France entre 2006 et 2017 ont été incluses. Les caractéristiques des patientes, de la maladie et de la chirurgie ont été recueillies ainsi que les complications postopératoires à 30 jours. Des analyses univariées et multivariées ont été réalisées pour établir l'association entre le SCS et les complications postopératoires. Résultats: Deux cent quatre-vingt-huit patients ont été inclus. Parmi eux, 73,3% présentaient des séreuses de haut grade. Un SCS élevé (≥8) a été retrouvé chez 40,3% des patients. Le taux de complication était de 27,8%, principalement de grade 3 selon Clavien Dindo. Le SCS était significativement associé au risque de complications postopératoires en analyse univariée (OR=2,87 p<0,0001) et multivariée (OR=2,10 p<0,02). Perspectives : Nous proposons une prise en charge adaptée au risque de complications afin de réduire la morbidité induite pour les patientes à bas risque et de dépister a plus tôt les complications pour les patientes à haut risque. Conclusion : Le SCS est associé à la survenue de complications postopératoires dans notre cohorte. Ce résultat confirme son utilisation en pratique pour proposer une prise en charge individualisée.

Sujets: Ovaire -- Cancer -- Chirurgie

Cancérologie

Complications (médecine)

Complications chirurgicales

Chirurgie gynécologique

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03477175">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03477175</a>

Titre: Rôle du médecin gynécologue non spécialisé en médecine légale dans la prise en charge en urgence des victimes d'agression sexuelle en zone dépourvue d'UMJ.

Auteur: Guichardière, Elisabeth (1990-....)

Directeur de thèse : Laffitte, Annick

Spécialité : Gynécologie-obstétrique

Date: 2021

Nombre de pages : 94

Bibliographie: 110 références

Résumé: L'agression sexuelle est une urgence médico-légale dans les 7 premiers jours. En France 24600 plaintes pour viols et tentatives de viols ont été enregistrées en 2020. Seules 30% des victimes de viol ou tentative de viol ont été suivies médicalement à cet effet. La prise en charge médicale précoce se devra de prélever et conserver les preuves. L'objectif est d'améliorer la prise en charge en urgence des victimes d'agressions sexuelles, dans les zones dépourvues d'UMJ par les gynécologues non spécialisés en médecine légale. METHODES : Réalisation d'une revue de la littérature, les relevés épidémiologiques, le référentiel CNGOF de 2016, les ouvrages de référence en médecine légale, les recommandations de groupe d'experts en infectiologie, les lignes directrices sur l'analyse criminalistique des drogues facilitant l'agression sexuelles et du code pénal. RESULTATS : Un set de prise en charge en urgences des victimes femmes d'agressions sexuelles, proposé aux gynécologues non spécialisé en médecine légale, dans les zones dépourvues d'UMJ constitué d'un référentiel vidéo, un document ressource et des formulaires de synthèse. CONCLUSION : La prise en charge précoce diminue le risque de complications, améliore l'efficacité des traitements post-exposition et augmente les chances d'apport de preuves issues de l'examen. La prise en charge doit être holistique et menée avec des équipes spécialisées, dans des structures dédiées. Cependant dans l'attente du développement de ces structures dans les territoires français dépourvus d'UMJ, le gynécologue hospitalier doit pouvoir être le premier intervenant en urgence de cette prise en charge pour les femmes victimes d'agression sexuelle.

**Sujets:** Victimes d'abus sexuels

Médecine légale

Violences sexuelles

Viol

Soins hospitaliers

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03548725">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03548725</a>

Titre : Évaluation des pratiques de prise en charge des cancers du sein localisés HER2 positif en Côte-d'Or : étude rétrospective à partir du registre des cancers du sein et gynécologiques de Côte-d'Or.

Auteur : Jacinto, Sarah (1992-....) Directeur de thèse : Costaz, Hélène

Spécialité : Gynécologie-obstétrique

Date: 2021

Nombre de pages : 37

Bibliographie: 47 références

Résumé: Introduction: La prise en charge standard des cancers du sein localisés HER2-positifs repose sur une association de chirurgie, chimiothérapie et thérapie anti-HER2 (Trastuzumab). Cette chimiothérapie était réalisée en néoadjuvant (CNA) jusqu'en 2019 dans le seul but de permettre un geste conservateur du sein. Depuis, le test de chimio-sensibilité tumorale qu'elle procure permet une amélioration du pronostic des patientes non en réponse histologique complète (pCR) par une intensification thérapeutique (TDM-1 adjuvant). L'objectif de cette étude était de réaliser un bilan des pratiques de prise en charge pour ces patientes et d'identifier une modification depuis le changement de paradigme de 2019. Méthode : Il s'agit d'une étude rétrospective observationnelle réalisée à partir des données du registre des cancers du sein et gynécologiques de Côte-d'Or incluant les patientes prises en charge pour un tumeur du sein localisée HER2-positive entre 2005-2015 et 2019-2020. Résultats : Sur la période 2005-2015, 480 patientes ont été incluses avec un taux de CNA de 14% et de pCR de 54%. Un protocole taxane, Trastuzumab était utilisé pour la majorité des CNA (65%). La SG était de 83% et significativement meilleure chez les patientes en pCR (HR= 0,2 IC95% (1.06-23.7), p= 0,02). Sur la période 2019-2020, 63 patientes ont été incluses avec un taux de CNA de 73% et de pCR de 37%. Le protocole anthracycline, taxane, Trastuzumab était utilisé en majorité pour la CNA (91%) et le protocole taxane, Trastuzumab pour la chimiothérapie adjuvante (75%). Conclusion : Un réel changement de pratique s'est effectué depuis 2019 tant sur la séquence thérapeutique que sur les protocoles de chimiothérapie pour les patientes atteintes d'un cancer du sein localisé HER2-positif.

Sujets: Sein -- Cancer

Chimiothérapie anticancéreuse

Chimiothérapie néoadjuvante

Immunité cellulaire

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03519157">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03519157</a>

Titre: Issues maternelles et fœtales des grossesses avec malformation utérine: une cohorte de 111 patientes et 191 accouchements sur 19 ans, au CHU de Saint Pierre de La Réunion.

Auteur : Khaled, Samy (1992-....)

Directeur de thèse : Tran, Phuong Lien

Spécialité : Gynécologie-obstétrique

Date: 2021

Nombre de pages : 36

Bibliographie: 35 références

Résumé: Objectif: évaluer l'association entre les malformations utérines et la morbidité materno-foetale dans une étude de 19 ans. Méthode : étude observationnelle conduite à la maternité Sud de l'île de La Réunion, comparant les grossesses sur utérus malformé aux grossesses sur utérus normal. Résultats : en 19 ans, sur 79517 grossesses, 111 femmes ayant une malformation utérine congénitale (MUC) ont été répertoriées, donnant lieu à 191 grossesses au total (0,24%). Dans cette cohorte, 53% des femmes ayant une MUC ont eu un seul accouchement (après 22 SA), 23,7% ont eu 2 grossesses, 13,5% ont eu 3 grossesses et 3,6% plus de 4 grossesses (dont une femme, 7 enfants). Le terme moyen d'accouchement est de 36,9 SA contre 38,4 SA dans le groupe témoin ; le poids moyen néonatal est de 2762g contre 3084g dans le groupe témoin (p<0,001). 71% des femmes ayant une MUC ont accouché à terme (entre 37 et 42 SA). Relativement spécifique des grossesses sur utérus malformé, la présentation du siège représente 24% des cas. Un taux de césarienne de 48,6% a été également rapporté. Sur la cohorte des utérus malformés, 8,1% des femmes avaient une malformation rénale. 79% de ces femmes ont donné naissance à un nouveau-né de poids supérieur à 2500g. Dans notre cohorte, les MUC sont significativement associées à un accouchement prématuré (avant 37 SA) (OR=3.78 [2.76-5.19], p<0.001) (terme < 33 SA (OR= 4.51 [2.77-7.34], p<0.001)), à une césarienne (OR=4.51 [3.06-6.65], p <0.001) et à une présentation du siège (OR 12.3 [8.7-17.1], p<0.0001). Les MUC présentent également une augmentation significative du risque de mort foetale in utero (MFIU), de fausses couches (OR = 2,5 ; p=0,08) et de mortalité périnatale chez les singletons (OR = 1,6; p=0,14). Conclusion : les femmes atteintes de MUC nécessitent durant leur grossesse une surveillance rapprochée, au vu des risques plus élevés de morbimortalité périnatale (MFIU, fausse couche, prématurité), de césarienne et de présentation du siège. Cependant, dans la majorité des cas les issues sont favorables, donnant à ces patientes de l'espoir sur leur pronostic obstétrical et foetal.

Sujets: Malformations -- Chez la femme enceinte

Grossesse -- Complications (médecine)

Accouchement -- Complications (médecine)

Comorbidité

Césarienne

Présentation du siège

Présentation foetale

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03649316">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03649316</a>

Titre : Place de l'exploration endoscopique dans la prise en charge de l'infertilité idiopathique : données de la littérature et méta-analyse de 25 études.

Auteur: L'hirondel, Blandine (1990-....)

Directeur de thèse: Gabriel, Marc (1960-....)

Spécialité : Gynécologie-obstétrique

Date: 2021

Nombre de pages : 121

Bibliographie: 85 références

Résumé : De nos jours, il n'existe pas de recommandation clairement établie concernant la réalisation d'une Exploration Endoscopique (EE) dans la prise en charge de l'Infertilité Idiopathique (II) . L'objectif principal est de définir l'intérêt de la réalisation d'une EE après bilan d'infertilité minimum normal. L'objectif secondaire est d'en évaluer le bénéfice-risque et d'élaborer une stratégie thérapeutique dans la prise en charge des couples avec II. Une revue de la littérature a été faite sur 25 études. Elles concernaient des couples avec une II après bilan complet. Toutes les femmes ont bénéficié d'une exploration endoscopique. Le critère de jugement étudié était le taux de pathologie retrouvée et/ou l'incidence de grossesse obtenue, au cours de la période d'étude. Au total, 3827 patientes ont été inclues dans l'étude. L'EE a permis de retrouver un facteur d'infertilité chez 66% des couples étudiés. La réalisation d'une EE augmente de façon significative les taux de grossesses ultérieures (OR = 1,70 et [IC95% 1,3 -1,94]). L'infertilité primaire et la durée d'infertilité de moins de 3 ans augmenteraient les chances de retrouver une pathologie à l'EE (OR= 1,78 et 1,6). La réalisation d'une EE en 1ère intention, augmenterait l'incidence de grossesse (OR = 1,44 et [IC95% 1,14 -1,97]). Enfin, le taux de grossesse semble meilleur lorsqu'une attitude expectative ou la réalisation d'IA est faite après EE (OR=4,9 et 1,8 respectivement). L'intérêt de l'EE devrait être reconsidéré dans la prise en charge des II. La stratégie thérapeutique et donc la place de cet examen dans le bilan d'infertilité et le parcours en AMP des couples concernés dépendra de plusieurs paramètres.

**Sujets**: Endoscopie

Stérilité féminine -- Lutte contre

Stérilité féminine -- Dépistage

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03207708">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03207708</a>

Titre : Évaluation des effets tératogènes et du taux de transmission maternofœtale de la dengue en cours de grossesse : étude rétrospective.

Auteur : Lemoine, Luna (1990-....) Directeur de thèse : Lafont, Marine

Spécialité : Gynécologie-obstétrique

Date: 2021

Nombre de pages : 39

Bibliographie: 88 références

Résumé: Introduction: La dengue est l'arbovirose la plus fréquente au monde. Malgré sa forte expansion récente, ses conséquences au cours de la grossesse sur le plan fœtal sont encore mal évaluées. L'objectif principal de notre étude était de décrire les effets tératogènes du virus de la dengue pendant la grossesse et secondairement de mesurer le taux de transmission materno-foetale (TMF) de la dengue. Méthode : Nous avons mené une étude rétrospective à la maternité de niveau III du CHU de Saint Pierre, à la Réunion (France) entre le 1er janvier 2019 et le 31 janvier 2021, incluant les patientes enceintes qui ont présenté une dengue clinique, confirmée biologiquement. Elles ont bénéficié d'un suivi échographique spécialisé et de prélèvements au cordon ombilical à l'accouchement. Résultats : Dans notre cohorte de 215 patientes, 179 (83,3%) ont eu un suivi échographique et 186 (86,5%) ont accouché au CHU Saint-Pierre. Nous avons constaté 21.2% d'anomalies échographiques (38/179) dont 15.0% (27/179) pourraient être en lien avec une fœtopathie infectieuse : 20 cas de PAG (11.1%) dont 9 RCIU (5.0%), 1 cas de calcification intra-hépatique (0.6%), 1 cas d'hépatomégalie (0.6%), 3 cas d'anomalies cérébrales (1.8%) et 1 cas d'hydramnios (0.6%) sans transmission verticale du virus pour ces cas. Le taux de transmission materno-fœtale de la dengue dans notre étude est de 4.8%, sans cas de dengue néonatale. Conclusion : Le virus de la dengue semble ne pas présenter d'effet tératogène, cependant le taux légèrement plus élevé de PAG/RCIU dans notre cohorte ainsi que le taux de TMF du virus de la dengue pendant la grossesse nécessite de réaliser de nouvelles études sur de plus larges effectifs.

Sujets: Dengue

Grossesse

Virus de la dengue

Tératogènes

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03218912">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03218912</a>

Titre : Devenir global à 2 ans des enfants diagnostiqués RCIU isolés en anténatal au centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal de La Réunion.

Auteur : Mariani, Lola (1992-....)

Directeur de thèse : Lafont, Marine

Spécialité : Gynécologie-obstétrique

Date: 2021

Nombre de pages : 94

Bibliographie: 110 références

Résumé : Introduction : Le RCIU (Retard de Croissance Intra Utérin) est un enjeu majeur en santé publique, en effet c'est la deuxième cause de morbi mortalité périnatale en France et même si le devenir des RCIU diagnostiqués en post natal est bien connu, nous avons peu de données sur le devenir de ceux diagnostiqués en anténatal. Il nous est donc difficile d'apporter des informations précises aux parents concernant le devenir de leur enfant quand nous les voyons en échographie de DAN (Diagnostic Anté Natal). Objectif principal : Évaluer le devenir psychomoteur à l'âge de 2 ans des RCIU isolés diagnostiqués en anténatal par des échographistes référents. Objectif secondaire : Évaluer l'apparition de pathologies associées en post natal. Méthode : Nous avons inclus toutes les patientes dont les fœtus étaient diagnostiqués RCIU isolés au diagnostic anténatal et présentés au CPDP (Centre Pluridisciplinaire de Diagnostic Prénatal) entre le 1er décembre 2015 et le 31 juillet 2019. Nous avons ensuite appelé les parents afin qu'ils répondent à un questionnaire validé qui évaluait le devenir neuro développemental de leurs enfants à 2 ans, puis nous avons recueilli toutes les pathologies découvertes en post natal. Résultats : 110 enfants ont été inclus parmi lesquels seuls 6,4 % (n=7/110) avaient des scores anormaux avec des scores plus faibles dans le champs du langage (77,2 % de score optimal). A 2 ans 70,9 % (n=78) étaient de poids normal comparé aux autres enfants de leur âge. Il avait été découvert des pathologies en post natal chez 11,8 % (n=13) d'entre eux et 20 % (n =22) avaient été réhospitalisés, dans la plupart des cas pour des bronchiolites. Conclusion: L'évolution de ces enfants RCIU isolés diagnostiqués en anténatal est globalement bonne à 2 ans ; ainsi l'information faite aux parents lors du diagnostic de RCIU isolé en anténatal, même si elle doit exposer le risque d'une origine infectieuse ou génétique du RCIU, se doit malgré tout d'être rassurante sur le devenir global à 2 ans.

**Sujets**: Hypotrophie foetale

Troubles de la croissance -- Foetus

Diagnostic prénatal

Foetus -- Croissance

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03550314">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03550314</a>

Titre : Le dépistage multiparamétrique de la maladie vasculaire placentaire au premier trimestre de la grossesse au Centre Hospitalier Ouest Réunion.

Auteur : Odelin, Natacha (1991-....)

Directeur de thèse : Lefebvre, Sophie

Spécialité : Gynécologie-obstétrique

Date: 2021

Nombre de pages : 22

Bibliographie: 28 références

Résumé: Objectif de l'étude: Les maladies vasculaires placentaires regroupent les pathologies obstétricales supposées liées à une origine ischémique placentaire, tel que la prééclampsie, l'éclampsie, l'hématome retro-placentaire, le retard de croissance in utéro et la mort foetale in utero. Elles sont une cause majeure de morbi-mortalité maternelle et néonatale. Depuis une vingtaine d'année, un dépistage précoce a été proposé par la Fetal Medicine Foundation selon un algorithme prenant en compte des caractéristiques maternelles, biophysiques et biologiques. Nous décrivons la population bénéficiant de ce dépistage multiparamétrique au Centre Hospitalier Ouest Réunion, nommé PRIMA FACIE, et nous étudions la performance de ce dépistage dans la prévention précoce de la maladie vasculaire placentaire. Matériel et méthode : Le PRIMA FACIE est un protocole de dépistage et de prévention de la maladie vasculaire placentaire mis en place au Centre Hospitalier Ouest Réunion, accessible à toutes femmes enceintes consultant entre 11SA et 13+6SA. Nous comparons la performance de ce dépistage à une population ayant accouché au Centre Hospitalier Ouest Réunion mais n'ayant pas bénéficié du dépistage par le PRIMA FACIE au premier trimestre de la grossesse. Résultat : 794 femmes enceintes bénéficient du PRIMA FACIE entre le 1er avril 2017 et le 30 novembre 2019. Nous observons que les patientes consultant au Centre Hospitalier Ouest Réunion dès le premier trimestre ont plus de facteurs de risque de développer une maladie vasculaire placentaire. Cette étude montre la performance du dépistage par le PRIMA FACIE, ramenant le risque de MVP d'une population initialement plus à risque, à un risque équivalent à celui de la population générale (p=0,01). Conclusion : Les résultats du protocole PRIMA FACIE montrent la faisabilité de cette démarche de soin dans la pratique courante, et sa performance en termes de dépistage et de prévention de la maladie vasculaire placentaire.

Sujets: Toxémie gravidique

Éclampsie

Hématome rétroplacentaire

Grossesse -- Complications (médecine)

Hypotrophie foetale

Mortalité fœtale

Lien vers la ressource : ttps://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03578527

Titre : La voie d'éjection gauche en échocardiographie fœtale de dépistage : audit des pratiques et critères de qualité.

Auteur : Regouin, Maud (1990-....) Directeur de thèse : Quarello, Edwin

Spécialité : Gynécologie-obstétrique

Date: 2021

Nombre de pages: 85

Bibliographie: 69 références

**Résumé**: Introduction: Les cardiopathies congénitales (CC) sont des malformations fréquentes et représentent la première cause de mortalité infantile. Cependant, le taux de détection est seulement acceptable. Depuis 2016, avec les mises à jour des recommandations de la CNEOF (Conférence Nationale de l'Échographie Obstétricale et Fœtale), l'inclusion de l'étude de la voie d'éjection gauche (VEG) en échographie de dépistage est devenue obligatoire aux 2e et 3e trimestre de la grossesse afin de tenter d'améliorer, entre autres, le dépistage des cardiopathies cono-troncales. L'objectif de cette étude est d'une part d'effectuer un audit des pratiques, et d'autre part d'étudier les éventuelles modifications des pratiques secondaires à la mise en place de critères de qualité de la coupe de la VEG dans le champ de l'échocardiographie de dépistage. Matériels : Nous avons réalisé une étude multicentrique, rétrospective et prospective, descriptive, longitudinale scindée en 3 périodes distinctes : avant 2016, en 2017, et en 2020. 7 critères de qualité ont été étudiés et côtés de 0 à 1 sur la coupe de la VEG. Des dossiers ont été extraits au hasard, issus de trois centres, et les moyennes des scores totaux, des scores par trimestre, par période, par centre, par praticien, et en fonction de la position cardiaque ont été calculés. Nous avons aussi procédé aux analyses des variabilités intra et inter opérateurs dans l'utilisation de ces critères de qualité. Résultats : La coupe de la VEG est présente dans les comptes-rendus d'échographie avant 2016, en 2017, et en 2020 dans 95,3%, 94,3%, et 93,3% des cas pour les 3 centres. Avant 2016, la moyenne des scores de qualité est de 5,49/7 ; IC95% [5,36 ; 5,62], en 2017 de 5,91/7 ; IC95% [5,80 ; 6,03], et en 2020 de 5,70/7; IC95% [5,58; 5,82] pour les 3 centres. Il y a une différence statistiquement significative entre les moyennes des scores issues des périodes avant 2016 et en 2017 (p <0,001) et entre la période avant 2016 et en 2020 (p = 0,039). Nous constatons également une différence statistiquement significative entre les scores obtenus dans certaines positions du dos fœtal. Les critères de qualité 5 et 6 sont les moins représentés, respectivement dans 60,9% et 63,2% des cas. Les coefficients kappa des variabilités inter et intra opérateur sont tous compris entre 0,601 et 1. Conclusion : L'ajout des critères de qualité proposés n'est pas associé à une modification significative des pratiques en ce qui concerne la réalisation de l'étude de la VEG fœtale. L'essor d'outils modernes comme l'intelligence artificielle avec le Deep Learning pourrait y contribuer.

Sujets: Échocardiographie

Foetus -- Appareil cardiovasculaire -- Échographie

Foetus -- Maladies cardiovasculaires – Diagnostic

Diagnostic prénatal

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03430283">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03430283</a>

Titre : L'interruption volontaire de grossesse entre 9 et 12 semaines d'aménorrhée par méthode médicamenteuse à La Réunion.

Auteur: Remy, Agathe (1994-....)

Directeur de thèse : Theobald, Peter von

Spécialité : Gynécologie-obstétrique

Date: 2021

Nombre de pages : 35

Bibliographie: 80 références

Résumé: Introduction: Un trouble de stress post-traumatique (TSPT) est déclaré chez 3 à 6% des femmes en post-partum (PP) et jusqu'à 18,5% en cas de complications de la grossesse ou de l'accouchement. L'objectif de cette étude est d'évaluer la prévalence du TSPT après une césarienne code rouge et d'identifier les facteurs de risque parmi les facteurs de vulnérabilité prénataux, les facteurs de risque de la naissance et les facteurs d'entretien du PP. Méthode : Un questionnaire téléphonique ou informatisé incluant un Questionnaire de stress immédiat et le Posttraumatic Stress Disorder Checklist for DSM-5 a été proposé aux patientes ayant eu une césarienne code rouge entre le 12/05/2015 et le 28/02/2021 au CHU Sud de La Réunion. Résultats : Parmi les 555 césariennes retenues, 329 parturientes ont répondu. La prévalence du TSPT était de 20,1% et était stable dans le temps. Les 2 facteurs de risque retrouvés étaient l'expérience négative de l'accouchement et le vécu traumatique avéré. Les facteurs de vulnérabilité prénataux n'ont pas été retrouvés statistiquement significatifs. Près de 3 femmes sur 4 n'avaient pas été informées du risque de césarienne et plus d'1 femme sur 2 n'ont pas eu d'explications en PP. Conclusion : Les césariennes code rouge entraînent un TSPT chez 1 femme sur 5. Ce trouble pérenne peut durer jusqu'à 6 ans après l'accouchement. Cela signe la gravité de ce trouble et la nécessité de le prévenir. Le risque de le développer est 4 fois plus important en cas de vécu traumatique avéré au Questionnaire de stress immédiat. Proposer ce questionnaire en maternité pourrait être un élément important de prévention secondaire. Le rôle du personnel de santé est primordial.

Sujets : Avortement médicamenteux -- Complications (médecine) -- La Réunion (France ; île)

Douleur

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03519441">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03519441</a>

Titre: Prise en charge du cancer du col de l'utérus à la Réunion de 2016 à 2020.

Auteur : Turpin, Adeline (1990-....)

Directeur de thèse : Tran, Phuong Lien

Spécialité: Gynécologie-obstétrique

Date: 2021

Nombre de pages : 48

Bibliographie : 25 références

Résumé : A la Réunion, le taux de mortalité standardisé du cancer du col de l'utérus est de 4,8/100 000 femmes, alors qu'il est de 2,2/100 000 en France métropolitaine. Une étude précédente antérieure à 2016 avait montré que l'absence de curiethérapie et le non-respect des recommandations pouvaient contribuer à cette mortalité élevée. L'objectif de l'étude était d'analyser les schémas de diagnostic et de traitement du cancer invasif du col de l'utérus depuis 2016 à La Réunion. Méthodes : patientes diagnostiquées avec un cancer invasif du col de l'utérus dans l'un de nos centres de santé à La Réunion, entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020. Les recommandations de 2018 de la SFOG (société Français des oncogynécologues) 2018 ont été considérées comme la référence pour évaluer les pratiques professionnelles. Résultats : nous avons identifié 209 femmes au cours de la période d'étude, dont 94,3% ont bénéficié d'une IRM lors de l'évaluation initiale. L'atteinte lymphatique a été évaluée par TEP scanner chez 54,8% des patients de stade FIGO IB2 à IVA et 10% d'entre eux n'ont subi aucun examen lymphatique (TEP, scanner ou lymphadénectomie). Par rapport aux années précédentes, le délai pour les examens complémentaires s'est rallongé (52,9 jours pour l'IRM et 71,6 jours pour la TEP), bien qu'il y ait eu une amélioration des présentations en réunions de consultation multidisciplinaire (100%) et que plus de 80% du traitement administré était conforme aux directives de la SFOG. Conclusion : Depuis la mise en place de la curiethérapie à La Réunion en 2016, le traitement du cancer invasif du col de l'utérus à La Réunion s'est amélioré. Cependant, le manque d'évaluation de l'atteinte lymphatique peut affecter la survie globale et le délai des examens initiaux doit être réduit. Prochainement, un dossier médical partagé devrait harmoniser les transmissions d'informations entre les centres de soins réunionnais et contribuer à améliorer nos pratiques.

Sujets: Utérus -- Cancer -- La Réunion (France ; île)

Curiethérapie -- La Réunion (France ; île)

Lien vers la ressource : <u>Intranet de l'Université (accès restreint)</u>

## MÉDECINE D'URGENCE

Titre : Étude du transfert de compétence médecin-infirmier à travers la pose de voies veineuses périphériques échoguidées.

Auteur : Chabaud, Vincent (1992-....) Directeur de thèse : Nativel, Frédéric

Spécialité : Médecine d'urgence

Date: 2020

Nombre de pages: 106

Bibliographie: 99 références

**Résumé**: Introduction: La pose d'une perfusion est un acte courant cependant de nombreuses caractéristiques de la population de l'Océan Indien rendent ce geste parfois difficile. Il nous est apparu indispensable de proposer une alternative : l'échoguidage. Matériel et méthode : Nous avons proposé une formation dans les services d'accueil des urgences du centre hospitalier nord de la Réunion et de Mayotte via le COOP-PS « Réalisation d'échographies des veines et/ou artères des membres supérieurs par une infirmière en lieu et place d'un médecin ». La formation théorique puis pratique sur des phantoms échographiques, s'est complétée par un suivi des 15 premiers gestes sous forme d'un compagnonnage. La progression des IDE a été évaluée à partir de questionnaires ainsi que par l'analyse des 15 premiers gestes en situation réelle. Résultats : Sur la période du 29 mars 2019 au 13 octobre 2020 nous avons formé 32 IDE au total. En fin de formation 75% maitrisaient suffisamment le geste et 71,8 % l'anatomie du membre supérieur. A terme, 78,2 % des IDE se sont sentis autonomes et 93,3% estimaient la formation comme suffisante. Suite à la pose de 10 VVPE, les IDE réussissaient à perfuser après 1,2 essais en moyenne et ne présentaient plus aucune anxiété face à la réalisation du geste. Le temps total, installation comprise, pour perfuser était de 12,3 minutes. Conclusion : Cette formation est apparue efficace pour la majorité des IDE avec une progression dans tous les domaines de compétence enseignés. Ce programme a réussi à répondre à un besoin identifié dans nos services d'urgence en apportant aux équipes une modernisation des pratiques et un gain en autonomie, tout en libérant du temps médical.

**Sujets**: Transfert d'apprentissage

Relations interprofessionnelles dans le domaine de la santé

Cathétérisme intraveineux -- Technique

Hôpitaux -- Services des urgences -- France

Soins médicaux -- Évaluation

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03167724

Titre: Evaluation des délais de prise en charge des accidents vasculaires cérébraux bénéficiant d'une thrombolyse intraveineuse aux urgences de Saint-Pierre du CHU de la Réunion.

Auteur : Folio, Benjamin (1993-....)

Directeur de thèse : Poupel, Antoine

Spécialité : Médecine d'urgence

Date: 2020

Nombre de pages : 60

Bibliographie: 32 références

Résumé: Introduction: La thrombolyse doit être la plus précoce possible dans le traitement des AVC ischémiques pour permettre une meilleure efficacité. Les recommandations internationales préconisent un délai entre l'arrivée aux urgences et la thrombolyse, door-toneedle time, de moins de 60 minutes pour plus de 50% des patients. L'objectif principal était d'évaluer le door-to-needle time médian des patients ayant bénéficié d'une thrombolyse dans le cadre d'un accident vasculaire cérébrale ischémique aux urgences de St-Pierre du CHU de la Réunion. Méthode : Il s'agissait d'une étude observationnelle monocentrique. Nous avons recueilli les données de l'ensemble des patients qui se sont présentés aux urgences pour suspicion d'AVC dans un délai compatible avec une thrombolyse en 2019. Parmi ces patients, nous avons analysé le door-to-needle time de ceux ayant bénéficié d'une thrombolyse. Les patients ayant présenté des signes d'AVC après leur arrivée à l'hôpital étaient exclus de l'analyse. Résultats : Parmi les 417 suspicions d'AVC, 62 patients ont bénéficié d'une thrombolyse en 2019. Le door-to-needle time médian était de 65 minutes. 25 patients ont eu une thrombolyse en 60 minutes ou moins et 37 en plus de 60 minutes. Le délai médian était de 180 minutes entre le début des symptômes et la thrombolyse et de 30 minutes entre l'arrivée et l'imagerie. Conclusion : Des efforts restent à faire afin de diminuer le door-to-needle time. La coopération entre les différents acteurs de la prise en charge de ces patients doit être optimiser afin d'accélérer le circuit du patient. Différentes mesures restent applicables afin de permettre une diminution des délais de prise en charge.

Sujets: Accident vasculaire cérébral

Médecine d'urgence

Thrombolyse

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03042844">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03042844</a>

Titre : Étude descriptive rétrospective d'une cohorte de patients pédiatriques noyés de 2014 à 2020.

Auteur : Laval, Alexandra (1989-....)

Directeur de thèse : Perruchetti, Damien

Spécialité : Médecine d'urgence

Date: 2020

Nombre de pages : 55

Bibliographie: 28 références

**Résumé** : Introduction : La noyade est un problème de santé publique majeur, c'est la principale cause de décès par accident chez les moins de 14 ans. . L'étude de Szpilman recense la plus grande population de patients noyés. Décrite en 1997 sur une cohorte de 1831 patients, elle propose une classification intégrant les trois grandes défaillances d'organe ainsi que la mortalité respective. L'objectif principal de notre étude était d'analyser une population pédiatrique selon cette classification et d'évaluer les modifications significatives. L'objectif secondaire était de décrire cette population sur le plan démographique et clinico-biologique. Méthode : Nous avons inclus de façon rétrospective 159 patients de 0 à 14 ans, de Grade Szpilman 2 à 6, transférés vivants vers les 5 Centres Hospitaliers de Taone, Pointe-à-Pitre et Marseille dans les services d'urgence et de réanimation, de Janvier 2014 à Juillet 2020. Résultats : Dans notre population pédiatrique : Le Grade 4 est totalement absent. Concernant l'objectif secondaire, les facteurs de mauvais pronostic sont l'arrêt cardiaque et l'absence de témoin qualifié. Notre cohorte a un meilleur pronostic de survie que la population de Szpilman en 1997 (12,3% de mortalité contre 30%). Les troubles ioniques semblent dépendre du type d'eau, mais sans conséquence pronostique. Les patients de Grade inférieur à 6 semblent avoir une bonne évolution clinique. Conclusion : les résultats poussent à améliorer la prévention (protection des piscines, formations nage/secours, sensibilisation dans les zones les plus touchées). Il serait intéressant de réaliser des études de plus grande puissance pour proposer une classification pédiatrique.

Sujets: Noyade

**Enfants -- Accidents** 

Syndrome de détresse respiratoire

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03168953">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03168953</a>

Titre: Prévalence du Mycoplasma genitalium, facteurs de risque de contamination et signes cliniques associés à l'infection: étude au sein d'un centre de dépistage de La Réunion.

Auteur : Torregrossa, Emilie (1989-....) Directeur de thèse : Bertolotti, Antoine

Spécialité : Médecine d'urgence

Date: 2020

Nombre de pages: 49

Bibliographie: 48 références

Résumé: Introduction: Le dépistage du Mycoplasma genitalium (MG) en population générale n'est pas recommandé à l'heure actuelle, pourtant les complications de ce pathogène ainsi que le traitement éventuel sont bien documentés. L'objectif de l'étude était d'évaluer la prévalence, les facteurs de risque et la symptomatologie de MG chez les patients se rendant dans un centre de dépistage d'IST de La Réunion. Méthode : Une étude transversale, a été menée de juin 2014 à août 2015, chez tous les patients consultant dans un centre de dépistage au Sud de La Réunion. Une PCR triplex recherchant Chlamydia trachomatis (CT), Neisseria gonorrheae et MG était réalisée systématiquement. Les variables recueillies par un autoquestionnaire anonyme en première consultation ont été analysées par régressions logistiques. Résultats: La prévalence du MG au niveau uro-génital était de 2,69 % (0,88 %; 6,16 %) chez les femmes ≤25 ans et de 2,36 % (0,77 %; 5,42 %) chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des femmes ≤30 ans. La prévalence du MG au niveau rectal était de 3,70 % (0,09 % ; 18,97 %) chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Dans l'analyse multivariée, les facteurs associés au MG uro-génital étaient la co-infection avec le CT (OR 4,62, p=0,02) et la présence d'anticorps anti-Hbc (RC 7,61, p<0,01). Aucune infection symptomatique n'a été observée. Conclusion : La prévalence de l'infection à MG et le risque de co-infection par CT sont élevés à La Réunion. Pour garantir un traitement adapté de l'infection à MG tout en limitant la résistance aux antibiotiques, le dépistage systématique du MG doit être effectué dans les populations à haut risque.

Sujets : Dépistage

Maladies sexuellement transmissibles -- Prévention

Maladies sexuellement transmissibles -- Facteurs de risque

Lien vers la ressource : <u>Intranet de l'Université (accès restreint)</u>

Titre : Les diagnostics différentiels de COVID-19 graves en zone tropicale lors de la première vague : l'expérience de La Réunion.

**Auteur :** Krol, Pauline (1993-....) **Directeur de thèse :** Allyn, Jérôme

Spécialité : Médecine d'urgence

Date: 2021

Nombre de pages : 30

Bibliographie: 42 références

Résumé: Introduction: Au début de la pandémie de COVID-19, les diagnostics différentiels du COVID-19 spécifiques aux zones tropicales n'étaient pas connus. L'objectif de cette étude était d'identifier les diagnostics différentiels des cas graves de COVID-19 à La Réunion et de définir des critères de tri pertinents pour une prise en charge optimale des patients atteints de COVID-19 en zone tropicale. Méthode : Cette étude rétrospective a été conduite du 11 mars au 4 mai 2020, dans le seul service de Réanimation Polyvalente autorisé à l'époque à prendre en charge des patients atteints de COVID-19 graves à la Réunion. Tous les patients suspects de COVID-19 étaient directement admis dans l'unité dédiée «COVID-19» et testés par PCR ; ceux testés négatifs étaient transférés dans l'unité conventionnelle du service. Résultats : Au cours de la période d'étude, 99 patients ont été admis en Réanimation Polyvalente. Parmi eux, 33 patients ont été hospitalisés dans l'unité COVID-19. Sur les 33 patients, 11 étaient positifs au COVID-19. Les principaux diagnostics différentiels de COVID-19 grave étaient : les pneumopathies infectieuses virale ou bactérienne, la dengue, la leptospirose (hémorragies intra-alvéolaires) et l'oedème aigu pulmonaire. Aucun critère clinique, biologique ou radiologique ne permettait de distinguer les deux groupes de patients. La notion de voyage était l'élément clé pour caractériser les patients COVID-19. Conclusion : La Réunion, la dengue et la leptospirose sont les principaux diagnostics différentiels tropicaux des cas sévère de COVID-19 et la notion de voyage est le seul critère de tri permettant de distinguer les patients positifs au COVID-19. Nos résultats ne s'appliquent que dans notre contexte insulaire, au tout début de la pandémie.

```
SARS-CoV-2 (virus)

Diagnostic différentiel

Dengue -- Épidémiologie -- La Réunion (France ; île)
```

Sujets: Covid-19 -- Épidémiologie -- La Réunion (France; île)

Leptospiroses -- Épidémiologie -- La Réunion (France ; île)

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03472204">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03472204</a>

Titre: Prévalence et cinétique d'évolution de la dysfonction diaphragmatique échographique chez le patient âgé admis aux urgences pour détresse respiratoire aiguë.

Auteur: Le Corre, Mathieu

Directeurs de thèse : Mathieu, Daniel ; Groseil, Thomas

Spécialité : Médecine d'urgence

Date: 2021

Nombre de pages : 87

Bibliographie : 165 références

**Résumé** : Introduction : La détresse respiratoire (DRA) aiguë représente un des motifs les plus fréquents d'admission aux urgences chez les patients âgés de plus de 75 ans. La dysfonction diaphragmatique (DD) pourrait représenter un facteur déclenchant, précipitant ou encore une cause à part entière de la défaillance respiratoire chez ces patients. Matériel et méthode : Étude observationnelle prospective monocentrique réalisée au sein du centre hospitalier Félix-Guyon entre le 24 juin 2020 et le 6 avril 2021. L'excursion diaphragmatique (ED) a été mesurés en moyennant les valeurs obtenues sur 3 cycles respiratoires consécutifs chez un patient en position proclive à 30-45° en ventilation spontané (VS). Les mesures ont été réalisées à J0, J1, J3, J7 et le jour de la sortie d'hospitalisation. La DD était définie par une ED<1cm chez l'homme ou<0,9 cm chez la femme. Nous avons comparé l'évolution de l'ED (en cm) de chaque coupole diaphragmatique au cours du temps et en fonction de la présence ou non de DD à l'entrée (JO) à l'aide d'une ANOVA. Résultats : La prévalence de la DD était de 46 % chez ces patients. L'ED était significativement inférieure pour les côtés avec DD à l'admission et à J1 par rapport au groupe sans DD. Discussion : Première étude sur la prévalence de la fonction diaphragmatique s'intéresse aux patients de plus de 75 ans. La prévalence des morbidités et antécédent notamment cardiovasculaire était globalement plus élevé dans notre cohorte par rapport à la population général du même âge. Conclusion : La DD est fréquente chez le patient âgé de plus de 75 ans admis aux urgences pour détresse respiratoire aiguë.

Sujets : Syndrome de détresse respiratoire aiguë de l'adulte -- Chez la personne âgée

Médecine d'urgence

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03644999">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03644999</a>

Titre: Évaluation d'une méthode de réorientation vers la médecine de ville, pour des patients non urgents consultant aux urgences du Centre Hospitalier Ouest Réunion (CHOR).

Auteur : Thibaud, Joachim (1993-....)

Directeur de thèse : Girerd, Rémi

Spécialité : Médecine d'urgence

Date: 2021

Nombre de pages : 59

Bibliographie : 51 références

Résumé: Introduction: Les patients consultants aux urgences pour des motifs non urgents participent à la surcharge des urgences. Une réorientation de ces patients vers la médecine de ville pourrait améliorer le flux des patients aux urgences. L'objectif principal de cette étude est d'évaluer l'efficacité de cette méthode, en calculant un taux de réorientation. Méthode : Cette étude observationnelle, rétrospective et monocentrique s'est déroulée aux services d'accueil des urgences (SAU) du Centre Hospitalier Ouest Réunion (CHOR), sur l'île de La Réunion. Tous les patients de plus de 18 ans, réorientés du SAU vers la médecine de ville, du 1er décembre 2020 au 29 avril 2021, ont été inclus. Résultats : Au cours de la période d'étude, 580 patients ont été réorientés vers la médecine de ville, résultant en un taux de réorientation de 9 %. Sur l'ensemble de la période, le taux de réorientation a été calculé à 4 %. Les patients réorientés étaient des hommes (48 %) ou des femmes (52 %) avec un âge moyen de 40 ans, pour la plupart consultant spontanément (83 %). Les 3 principaux motifs d'admission étaient les douleurs abdominales/épigastriques, la fièvre et les vertiges/étourdissements. La traumatologie était concernée dans 42 % des cas. Les urgentistes étaient tous satisfaits de la méthode. Conclusion : Une réorientation de patients non urgents vers la médecine de ville, entraîne un taux de redirection de 9%, suggérant son effet significatif sur la réduction du flux de patients aux urgences.

Sujets: Médecine générale

Régulation médicale

Triage (médecine)

Hôpitaux -- Services des urgences -- La Réunion (France ; île)

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03664413">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03664413</a>

Titre : Évaluation de la pertinence des radiographies anticipées dans les traumatismes de cheville chez les adultes aux urgences de Félix Guyon, La

Réunion : étude RATAC.

Auteur: Vincent, Pauline (1992-....)

Directeur de thèse : Lubrano di Scampamorte, Olivier

Spécialité : Médecine d'urgence

Date: 2021

Nombre de pages : 54

Bibliographie : 27 références

Résumé: Introduction: Le traumatisme de la cheville est un motif de consultation fréquent aux Urgences. Un protocole de radiographie anticipée par les infirmiers d'accueil (IOA) est en vigueur depuis 2019. Celui-ci permet une diminution pour le patient, du temps passé aux Urgences. L'objectif de cette étude était d'évaluer si le protocole de prescription de radiographies anticipées par les IOA conduit à une sur-prescription de radiographies réalisées dans les traumatismes de cheville par rapport à ce qu'auraient prescrit les médecins urgentistes (MU) sans le protocole actuel. Matériels/Méthodes : Cette étude prospective transversale incluait les cas de patients majeurs entre 18 et 55 ans, ayant consulté entre le 11 novembre 2020 et le 11 février 2021 aux Urgences de l'hôpital de Saint-Denis pour un traumatisme de cheville isolé. Un questionnaire a été rempli par les MU en aveugle du résultat de la radiographie anticipée. Résultats : Cinquante cas de patients étaient éligibles ; 46 cas ont été inclus. Le pourcentage de radiographies demandées à tort par l'IOA était de 44,4%. L'IOA a demandé 97,8% des radiographies, le MU 54,4%. Dans cette étude, il y a eu 20 entorses simples (43,5%) et 11 entorses graves (23,9%) contre sept cas de fractures (15,2%). Pour les diagnostics non graves, les EP ayant plus de 5 ans d'expérience auraient prescrit le plus grand nombre de radiographies (57,1 % contre 28,6 % pour les résidents). Conclusion : Le protocole actuel de radiographies anticipées montre un pourcentage élevé de radiographies inutiles dans les traumatismes de cheville. Ces travaux suggèrent l'amélioration de ce protocole afin de réduire la prescription excessive de radiographies.

**Sujets**: Entorses

Cheville (anatomie)

Radiographie médicale

Médecine d'urgence

## NEUROLOGIE

Titre : La neuromyélite optique de Devic à la Réunion.

Auteur : Cuvier, Victor (1990-....)

Directeur de thèse : Gradel, Antoine

Spécialité : Neurologie

Date: 2020

Nombre de pages: 126

Bibliographie: 149 références

Résumé : Introduction: La Neuromyélite Optique est une maladie inflammatoire rare, médiée par des anticorps pathogènes anti Aquaporine 4 touchant le Systeme Nerveux Central au niveau du nerf optique et de la moelle épinière. Son pronostic clinique particulièrement sévère est variable en fonction des populations décrites dans la littérature. La population Réunionnaise possède des caractéristiques génétiques et environnementales uniques. Nous avons donc décrit précisément les particularités cliniques et paracliniques de ces patients afin de mieux les connaitre et les prendre en charge au niveau local. Méthode : Nous avons réalisé une étude descriptive retrospective des patients Réunionnais atteints de NMO anti Aquaporine 4 selon les critères de Wingerchuk 2015, ayant été suivi dans le cadre de leur maladie entre Janvier 2010 et Décembre 2018, correspondant à un suivi moyen de 63.4 mois. Résultats : La prévalence des formes "late-onset" était de 44% comprenant 12% de formes "very late-onset", responsables d'une moyenne d'âge de 48.4 ans au début de la maladie. Les névrites optiques initiales isolées représentaient 32% de la population, et 20% présentaient une cécité binoculaire en fin de suivi. Les myélites initiales isolées représentaient 60% de la population et 28% nécessitaient au moins l'utilisation d'un fauteuil roulant pour se déplacer. Les myélites étaient singulierement extensives avec en Moyenne 9 étages médullaires atteints. Conclusion : Les conditions génétiques et environnementales uniques de la population Réunionnaise sont à l'origine d'un développement particulierement sévère et tardif de la maladie.

Sujets: Neuromyélite optique aiguë -- La Réunion (France ; île)

Névrite optique -- La Réunion (France ; île)

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03167602">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03167602</a>

Titre: Description clinique, génétique et électroneuromyographique de 21 patients présentant une maladie de Charcot-Marie-Tooth par mutation du gène de la Périaxine.

Auteur : Martin, Joana (1992-....)

Directeur de thèse : Choumert, Ariane

Spécialité : Neurologie

Date: 2020

Nombre de pages: 86

Bibliographie: 92 références

Résumé: Introduction: La neuropathie de Charcot-Marie-Tooth de type 4F est la forme démyélinisante autosomique récessive la plus représentée à La Réunion. L'objectif est de décrire la cohorte des patients avec la même mutation homozygote c.3253dup [p.(Glu1085Glyfs\*4)]. De plus, nous souhaitions évaluer l'évolution de la pathologie chez les patients déjà décrits par Renouil et al en 2013 et ainsi tenter d'établir l'histoire naturelle de cette pathologie. Méthode: Nous avons décrit le phénotype clinique, génétique et éléctromyographique de 21 patients réunionnais et avons pu établir l'évolution clinique pour 11 d'entre eux entre 2013 et 2019. Résultats: Cette étude confirme un début précoce (avec une évolution sévère aboutissant à une perte de la marche chez 28,6% des patients), des troubles de l'équilibre majeurs et précoces, un taux élevé de déformations orthopédiques, d'atteintes sensorielles et de phénomènes douloureux. Le score CMTNS moyen est de 21,3±8,6 démontrant une atteinte sensitivomotrice sévère. D'autres atteintes sont fréquentes: les dyspraxies, les troubles de la déglutition et les syndromes restrictifs. L'étude des patients en commun avec l'étude de 2013 retrouve l'apparition de diverses atteintes (orthopédiques, sensorielles, pneumologiques). Discussion: Cette étude confirme la présence d'une neuropathie démyélinisante sévère de début infantile avec une atteinte ataxiante majeure et des déformations ostéo-articulaires. Elle souligne une variabilité phénotypique alors que les patients sont porteurs de la même mutation homozygote. Il parait indispensable, dès l'enfance, d'instaurer une prise en charge multidisciplinaire avec ophtalmologique et ORL systématique.

Sujets: Maladie de Charcot-Marie-Tooth

Atrophie musculaire progressive

Maladies neuromusculaires

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03195737">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03195737</a>

# PÉDIATRIE

Titre : Évaluation de l'utilisation de la mesure du glucose interstitiel sur l'équilibre glycémique de la cohorte pédiatrique de patients diabétiques suivie dans l'unité d'endocrinopédiatrie du CHU Sud Réunion.

Auteur: Andral, Léna (1991-....)

Directeur de thèse : Houdon Nguyen, Laure

Spécialité: Pédiatrie

Date: 2020

Nombre de pages : 86

Bibliographie : 47 références

Résumé : Introduction : L'enjeu de prise en charge du diabète pédiatrique est le maintien d'une qualité de vie acceptable et la prévention de complications. Ces dernières sont corrélées au taux de surveillance glycémique. De nouvelles technologies permettant la mesure en continu du glucose par port de capteur de glucose interstitiel (CGI) sont aujourd'hui de plus en plus utilisées en pédiatrie. Ces dispositifs nécessitent l'évaluation de leur utilisation. Méthodes : étude monocentrique observationnelle incluait 81 insulinorequérants suivis au CHU Sud Réunion, porteurs ou anciens porteurs d'un CGI. Les HbA1c 6mois avant et 6 mois après la pose et leurs moyennes annuelles ont été comparées. Une évaluation de l'utilisation, de la tolérance et du niveau d'éducation thérapeutique (ETP) a été réalisée par questionnaire. Résultats : La pose d'un CGI n'améliorait pas l'équilibre glycémique : l'HbA1c passait de 8.47% à 8.42% 6 mois après la pose et la moyenne annuelle passait de 9.11% à 8.33% (p value 0.85). Peu de patients atteignent le niveau 3 d'ETP, l'utilisation du capteur n'est donc pas optimale. Un des points majeurs qui ressort de notre étude est l'amélioration de la qualité de vie grâce au port de ces capteurs. 44% des enfants ont présenté une réaction cutanée au CGI, constituant un frein à l'utilisation du capteur. Discussion : Ces CGI apportent une amélioration de la qualité de vie des patients même s'ils n'améliorent pas l'équilibre glycémique. Les problèmes de tolérance cutanée sont à prendre en charge car constituent un frein à l'utilisation des capteurs. Une optimisation de la prise en charge passe par une amélioration des niveaux d'ETP.

Sujets: Endocrinologie pédiatrique -- La Réunion (France; île)

Enfants diabétiques

Diabètes -- Thérapeutique

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03109768">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03109768</a>

Titre : Anémie hémolytique due au déficit en G6PD chez les enfants à Mayotte : une complication fréquente et sévère.

Auteur : Boyadjian, Marie (1991-....) Directeur de thèse : Blondé, Renaud

Spécialité : Pédiatrie

Date: 2020

Nombre de pages : 28

Bibliographie: 38 références

Résumé : L'anémie hémolytique est une complication rare chez les patients atteints de déficit en G6PD. Elle est surtout décrite chez les patients porteurs de la mutation Méditerranéenne qui sont décrits par l'OMS comme ayant une activité G6PD sévèrement altérée. A Mayotte, la majorité des patients sont porteurs du variant Africain connu pour avoir une activité G6PD modérée. Nous observons à Mayotte beaucoup d'anémies hémolytiques sévères avec une hémoglobine inférieure à 6g/dL. Dans cette étude nous avons voulu décrire l'épidémiologie, la clinique, la biologie et la prise en charge des enfants présentant une crise hémolytique sévère secondaire à un déficit en G6PD. Le second objectif était d'analyser leur génotype quand il était disponible. Les données de patients ayant présenté une anémie hémolytique sévère entre le 1er Avril 2013 et le 16 septembre 2020 ont été recueillies de manière rétrospective. 73 enfants ont présenté une anémie hémolytique sévère durant cette période à Mayotte. La médiane de l'hémoglobine était de 3,9g/dL. Tous les patients ont bénéficié d'une transfusion et d'une hospitalisation. Vingt enfants ont eu un génotype : 11 étaient porteurs de la mutation Africaine et 9 de la mutation Méditerranéenne. Des éléments déclenchant habituellement retrouvés, la prise de médicaments ne faisait pas partie des éléments déclenchant de notre cohorte, et l'ingestion de fèves a été retrouvée chez un seul enfant. La médecine traditionnelle est très présente et l'une des plante souvent utilisées est Acalypha Indica. Les anémies hémolytiques sévères dues au déficit en G6PD sont fréquentes à Mayotte. L'atteinte clinique est sévère mais n'est pas correlée au génotype.

Sujets: Anémie hémolytique -- Chez l'enfant-- Mayotte

Glucose-6-phosphate déshydrogénase

Déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase -- Chez l'enfant -- Mayotte

Maladies héréditaires métaboliques -- Chez l'enfant -- Mayotte

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03322907">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03322907</a>

Titre: Prise en charge diagnostique de la fièvre chez le nourrisson de moins de 3 mois: étude observationnelle rétrospective au Centre Hospitalier de Mayotte entre janvier 2016 et décembre 2018.

Auteur: Haji, Soumeya (1989-....)

Directeur de thèse : Chamouine, Abdourahim

Spécialité: Pédiatrie

Date: 2020

Nombre de pages : 66

Bibliographie : 55 références

Résumé: Introduction: La fièvre du nourrisson de moins de 3 mois peut révéler une infection bactérienne sévère ou invasive (IBS/IBI). La distinction entre fièvre virale bénigne et fièvre bactérienne potentiellement grave est complexe à identifier. L'objectif de notre étude était d'évaluer la performance des biomarqueurs dans la détection des IBS/IBI et de décrire l'épidémiologie de ces infections à Mayotte. Méthodes : 594 nourrissons fébriles de moins de 3 mois ont été inclus entre janvier 2016 et décembres 2018. Résultats : Les seuils optimaux des biomarqueurs étaient de 12 G/L pour les globules blancs (GB), 5 G/L pour les polynucléaires neutrophiles (PNN), 40 mg/L pour la CRP et 0.9 ng/mL pour la PCT. La CRP et la PCT avaient une meilleure sensibilité (Se) et spécificité (Sp) pour classer les patients malades comparativement aux GB et PNN (respectivement Se 73.4% et 75% et Sp 89.2% et 84%). La valeur prédictive négative était pour la CRP de 92.1% et pour la PCT de 91.3%. En analyse multivariée seules la CRP et la PCT étaient des facteurs prédictifs significativement associés à une IBS. La prévalence des IBS/IBI dans notre population était de 22.4% avec 1.34% de méningite. Notre première source d'IBS était respiratoire (11.6%), venait ensuite les infections du tractus urinaire (ITU) (6.2%). Hors contamination, les principaux germes étaient Escherichia Coli pour les ITU (51.2%), Streptocoque Groupe B pour les méningites (62.5%) et Staphylocoque aureus pour les bactériémies (64%). Conclusion : Notre étude rétrospective a permis de montrer des seuils diagnostiques de CRP à 40 mg/L et de PCT à 0.9 ng/mL pour détecter les IBS/IBI. Une évaluation clinique de ces résultats dans une étude prospective est nécessaire.

Sujets: Fièvre -- Chez le nourrisson -- Mayotte

Nourrissons -- Mayotte

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03018649">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03018649</a>

Titre : Les infections invasives sévères à Staphylococcus aureus sécréteur de la toxine de Panton et Valentine à La Réunion.

Auteur : Lacoste, Rosalie (1992-...) Directeur de thèse : Ramful, Duksha

Spécialité : Pédiatrie

Date: 2020

Nombre de pages : 20

Bibliographie : 10 références

**Résumé**: Étude rétrospective bicentrique (2014-2019) décrivant 24 cas d'infections pédiatriques sévères à Staphylococcus aureus sécréteur de la toxine de Panton-Valentine à la Réunion. Pneumonie nécrosante (54%), infections cutanées et des tissus mous (25%) et infections ostéoarticulaires (13%) étaient les présentations cliniques principales. Les souches communautaires étaient sensibles à la méticilline. Une intervention chirurgicale avait été réalisée chez 19 patients (79%). Des complications étaient survenues chez 10 enfants (42%), et 2 d'entre eux étaient décédés (8%).

Sujets: Staphylocoque doré -- La Réunion (France; île)

Staphylocoque doré sensible à la méticilline -- Chez l'enfant -- La Réunion (France ; île)

Infections à staphylocoque doré -- Chez l'enfant -- La Réunion (France ; île)

Peau -- Infections -- Chez l'enfant -- La Réunion (France ; île)

Toxines de staphylocoque doré -- La Réunion (France ; île)

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02732763">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02732763</a>

Titre : Étude de la croissance staturale de la cohorte réunionnaise de patients atteints du syndrome de Larsen de La Réunion : analyse de la réponse et tolérance au traitement par hormone de croissance.

Auteur: Périer, Elodie (1990-....)

Directeur de thèse : Houdon Nguyen, Laure

Spécialité: Pédiatrie

Date: 2020

Nombre de pages : 76

Bibliographie : 62 références

Résumé : Introduction : Le Syndrome de Larsen de La Réunion est une dysplasie squelettique rare, endémique de l'île. Les patients ont une dysmorphie faciale, des luxations articulaires par hyperlaxité ligamentaire et un retard statural sévère. Il est dû à une mutation homozygote du gène ß4GALT7. La croissance de ces patients est mal connue. L'objectif de cette étude est d'analyser la croissance staturale de la plus grande cohorte de Larsen de La Réunion, ainsi que d'évaluer le traitement par hormone de croissance et la tolérance. Méthode : Il s'agit d'une étude de cohorte observationnelle, rétrospective et monocentrique sur l'île de La Réunion, de 1927 à 2020. Les critères d'inclusion sont cliniques et génétiques. Résultats : 37 patients ont été inclus. La taille moyenne adulte est de 127,1 cm (-8 DS) +/- 10,4 (114-139 soit -10 à -6 DS) et de 120,6 cm (-7,5 DS) +/- 7,6 (110-134,5 soit -9,5 à -5 DS) respectivement pour les hommes (n=4) et les femmes (n=8). Sous hormone de croissance, elle est de 137,4 cm (-6 DS) +/- 10,1 (121-146 soit -9 à -4,5 DS) et 125 cm (-7 DS) +/- 14 (101-135 soit -11 à -5 DS) respectivement pour les hommes (n=5) et les femmes (n=5). Sur le plan clinique, une fille a eu une aggravation de scoliose qui a continué à progresser après l'arrêt du traitement. Sur le plan biologique, deux ont développé un diabète de type 2 post arrêt du traitement. Conclusion : Les patients Larsen de La Réunion présentent un retard statural sévère qui doit bénéficier d'une exploration endocrinologique. Un traitement par hormone de croissance peut être discuté avec la famille et l'enfant pour améliorer le pronostic de taille finale et la composition corporelle.

**Sujets**: Maladies rares

Troubles moteurs-- Chez l'enfant -- La Réunion (France ; île)

Troubles de la croissance -- Chez l'enfant -- La Réunion (France ; île)

Somatropine

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02926788">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02926788</a>

Titre : Fiabilité des paramètres échocardiographiques chez des patients porteurs de ventricule droit systémique : étude prospective multicentrique.

Auteur : Pommier, Victor (1993-....) Directeur de thèse : Amedro, Pascal

Spécialité : Pédiatrie

Date: 2020

Nombre de pages : 68

Bibliographie : 71 références

Résumé : Introduction : le ventricule droit (VD) systémique est une forme rare et complexe de cardiopathie congénitale avec un pronostic lié à un dysfonctionnement du VD et à une capacité physique altérée. Le suivi clinique de routine repose sur l'échographie cardiaque, mais la valeur pronostique des paramètres échocardiographiques reste en débat. Le suivi réel des patients implique différentes machines d'échographie. Nous visons à évaluer la fiabilité des paramètres échographiques pour les VD systémiques, en termes de reproductibilité, à l'aide d'un logiciel indépendant et pour la prédiction de la déficience de la capacité physique. Méthode : Des adultes porteurs d'une transposition des gros vaisseaux (d-TGV) ou d'une double discordance (DD) ont été inclus dans cette étude prospective multicentrique. Les paramètres échographiques actuels ont été analysés à l'aide du logiciel TomTec-Arena ™. Les coefficients de corrélation intraclasse ont permis d'évaluer la fiabilité inter et intra-observateur. Les associations entre les paramètres échocardiographiques les plus reproductibles et la capacité à l'effort (pic VO2, pente VE/VCO2) ont été explorées. Résultats: Au total, 47 patients ont été inclus dans l'étude (85% d-TGV, âge médian 36,4 ± 8 ans). Les paramètres d'échocardiographie conventionnelle et de 2D strain ont indiqué l'existence d'un dysfonctionnement du VD systémique (ESPAT 12,8 ± 3,1 mm; 2D longitudinal strain de la paroi libre VD 13,6 ± 3,9%). Une bonne reproductibilité (ICC> 0,75) concernant les variabilités intra et inter-observateur a été observée dans 9 paramètres d'échocardiographie VD. Parmi eux, le TAPSE et le 2D strain de la paroi libre VD, utilisant l'algorithme du logiciel TomTec-Arena ™ spécifique au VD, ont été associés au pic de VO2 (r = 0,4 et 0,26, respectivement). Conclusion: À l'aide d'un logiciel indépendant du fournisseur, le TAPSE et le strain longitudinal de la paroi libre du VD étaient les paramètres d'échocardiographie les plus fiables dans cette étude prospective, qui tentait de refléter le suivi en vie réelle des patients atteints de VD systémique.

Sujets: Échocardiographie

Coeur -- Malformations

Ventricule droit

Pathologie

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03046475">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03046475</a>

Titre : Étude descriptive de la première cohorte pédiatrique et néonatale traitée par assistance extracorporelle de type ECMO à la Réunion et mise en place d'un programme de formation spécifique médico-paramédicale.

Auteur: Reynaud, Alexandre (1990-....)

Directeur de thèse : Levy, Yaël

Spécialité: Pédiatrie

Date: 2020

Nombre de pages: 130

Bibliographie : 183 références

Résumé: Introduction: L'extra-corporeal membrane of oxygenation ou ECMO est une technique d'assistance respiratoire et/ou cardio-circulatoire utilisée en Réanimation s'appuyant sur le principe de la circulation extracorporelle. L'activité d'assistance extracorporelle pédiatrique et néonatale sur l'ile de la Réunion est récente (depuis 2014). Il n'y a encore jamais eu d'étude effectué sur l'expérience Réunionnaise autour de cette activité. La mise en place d'un programme de formation spécifique médico-paramédicale portant sur l'assistance extracorporelle pédiatrique et néonatale a vu le jour en 2018. L'objectif principal était de décrire la population pédiatrique et néonatale réunionnaise ayant eu recours à une assistance extracorporelle de type ECMO. L'objectif secondaire était de décrire le programme de formation mis en place en 2018 et d'évaluer son impact en terme de morbi- mortalité. Méthodes: Nous avons réalisé une étude observationnelle, rétrospective et monocentrique réalisée à partir d'une cohorte de patients pédiatriques et néonataux ayant nécessité une assistance extracorporelle entre Janvier 2014 et Décembre 2019 en Réanimation pédiatrique à La Réunion. Nous avons analysé les données clinico-biologiques et d'imagerie des patients avant et au cours de l'assistance extracorporelle, pour définir leurs caractéristiques générales, pré-implantatoires et leur évolution au cours de l'assistance. Nous avons évalué la survie et les comorbidités chez ces patients ainsi que leur surveillance au cours de l'assistance. Le programme de formation spécifique médico-paramédical mis en place en 2018 comprenait une formation théorique sous forme de cours magistraux, de mise en situation (« Water-Drills – basic session and emergency session ») et une mise en situation pratique concernat le corps médical en cas d'UMAC (« Bedside training »). Enfin, l'évolution de la morbi-mortalité avant 128 et après la mise en place du programme de formation ainsi que l'évolution de la surveillance clinico-biologique de ces patients étaient analysés. Résultats : Vingt-cinq patients ont nécessité la réalisation d'une assistance extracorporelle du type ECMO, dont 20% de patients néonataux, pour un total de 27 ECMO conduites. La survie sous assistance était de 56% et de 52% à la sortie d'hospitalisation avec une survenue non négligeable de complications infectieuses, hémorragiques et neurologiques. Les survenues de complications mécaniques (p=0,004) et neurologiques (p=0,007) au cours de l'assistance étaient associées à une mortalité plus importante. Notre travail suggère une amélioration de la survie au décours de la mise en place d'un programme de formation spécifique (76,9% contre 33,3%, p=0,047). Conclusion : Notre cohorte de patients était une population pédiatrique majoritairement en évolution. La

survie globale sous assistance est de 56% avec une survenue non négligeable de complications infectieuses, hémorragiques et neurologiques. La mise en place d'un programme de formation spécifique à l'assistance extracorporelle de type ECMO pourrait avoir permis une amélioration de la survie sous assistance ainsi qu'une diminution de la survenue de complications neurologiques et infectieuses. L'amélioration des pratiques concernant l'ECMO pédiatrique et néonatale nécessite la poursuite de la formation et la mise en place de simulation haute fidélité.

**Sujets :** Circulation extracorporelle -- Enfants

ECMO (médecine)

Lien vers la ressource : <u>Intranet de l'Université (accès restreint)</u>

Titre: Les troubles du sommeil chez les enfants et les jeunes adultes atteints de pneumopathies interstitielles diffuses.

Auteur: Abdel-Latif Thomasson, Diane (1989-....)

Directeur de thèse : Fauroux, Brigitte

Spécialité : Pédiatrie

Date: 2021

Nombre de pages : 45

Bibliographie: 27 références

Résumé: Objectif: le syndrome d'apnées obstructives du sommeil (SAOS) est fréquent chez les patients adultes atteints de pneumopathie interstitielle diffuse (PID). L'objectif de l'étude est d'évaluer la prévalence du SAOS et la qualité du sommeil chez les enfants et les jeunes adultes atteints de PID. Méthodes : une polysomnographie (PSG) a été réalisée chez tous les patients suivis dans un centre de référence national entre juin 2018 et septembre 2019. Les données cliniques et de PSG ont été collectées. Résultats : les données polysomnographiques de 20 patients (âge médian de 9 ans (0,5 à 20 ans), 12 filles) ont été analysées. Sept (35%) patients avaient une protéinose alvéolaire pulmonaire (PAP), 5 patients (25%) un trouble du métabolisme du surfactant, 3 (15%) une hémorragie pulmonaire diffuse, 4 (20%) une PID d'étiologie inconnue et un patient avait une sarcoïdose laryngée et pulmonaire. L'index médian d'apnée-hypopnée obstructive (IAHO) était normal à 0 événement/heure. Cependant, deux jeunes adultes avaient un IAHO > 4 événements/heure. Un jeune homme de 18 ans atteint de PAP avec une capacité vitale de 27% avait un IAHO à 10,7 événements/heure et un homme de 20 ans atteint de sarcoïdose laryngée et pulmonaire avait une SAOS positionnel avec un IAHO à 19,5 événements/heure. Pour l'ensemble des patients, le temps médian de sommeil total, l'efficacité du sommeil, le temps d'éveil intra-sommeil et les stades du sommeil étaient modérément perturbés. Conclusion : aucun SAOS modéré ou sévère n'a pas été observé chez les patients de moins de 18 ans atteints de PID. Un SAOS léger à modéré a été observé chez deux jeunes adultes atteints de PAP et de sarcoïdose. Contrairement à l'adulte, le SAOS semble rare chez les enfants atteints de PID.

Sujets : Syndromes des apnées du sommeil

Pneumopathie infiltrante diffuse -- Enfants

Sommeil -- Chez l'enfant

Titre : Évaluation de la mise en place des échanges transfusionnels automatisés dans la prise en charge des enfants drépanocytaires à Mayotte.

**Auteur :** Darrieumerlou, Mélanie (1989-....)

**Directeur de thèse :** Chamouine, Abdourahim (1971-....)

Spécialité : Pédiatrie

Date: 2021

Nombre de pages : 73

Bibliographie: 59 références

Résumé: Introduction: L'objectif de notre étude est d'évaluer la mise en place de l'érythraphérèse dans la prise en charge des enfants drépanocytaires suivis à Mayotte en comparant les méthodes manuelles et automatisées d'échange transfusionnel (ET). Méthode : Tout enfant drépanocytaire bénéficiant d'ET entre janvier 2015 et avril 2019 est inclus. Des données cliniques, biologiques et variables propres aux modalités transfusionnelles sont recueillies rétrospectivement pour chaque séance. Les données des échanges manuels (EM) et automatisés (EA) sont comparées. Résultats : Quarante-sept enfants sont inclus et 452 séances sont recueillies (298 EM et 154 EA). La majorité des séances (97,6%) sont réalisées sur voie veineuse périphérique. Bien que les taux d'hémoglobine S (HbS) pré-transfusionnels soient comparables entre les deux méthodes, l'EA permet une décroissance du taux d'HbS plus efficace. Chez les patients inscrits dans des programmes de longue durée les taux d'HbS prétransfusionnels en EA sont significativement plus bas (42,6% vs 46,5%; p=0,008). La consommation en concentrés érythrocytaires est augmentée en EA (35ml/kg vs 12ml/kg; p < 0,001) sans majoration des complications transfusionnelles : la surcharge martiale est mieux prévenue en EA et la survenue d'allo-immunisation reste comparable entre les deux techniques. L'EA n'entraine pas de surcoût économique et apporte un avantage en termes de qualité de vie (durée de procédure plus courte et séances plus espacées). Conclusion : L'érythraphérèse apporte de nombreux avantages dans la prise en charge de notre population. Sa mise en place dans notre centre semble avoir apporté une amélioration de la qualité des soins.

Sujets: Drépanocytose -- Enfants -- Mayotte

Sang -- Transfusion -- Enfants -- Mayotte

Érythrocytes -- Transfusion -- Enfants -- Mayotte

Maladies cardiovasculaires -- Enfants -- Mayotte

Titre : État des lieux sur la population pédiatrique, originaire de l'Océan Indien, ayant bénéficié d'un transfert en France métropolitaine au cours d'une prise en charge de pathologie hématologique ou oncologique.

Auteur: Dréan-Papin, Maureen (1993-....)

Directeur de thèse : Reguerre, Yves

Spécialité: Pédiatrie

Date: 2021

Nombre de pages: 84

Bibliographie : 34 références

Résumé: Introduction: L'île de La Réunion héberge le centre de référence d'Onco-hématologie pédiatrique de l'Océan Indien. Il accueille des patients réunionnais mais aussi des patients de Mayotte et d'autres enfants originaires des pays avoisinants. Néanmoins, un quart de cette population nécessitera un transfert médical secondaire vers la France métropolitaine. Méthode: Étude rétrospective, descriptive et mono centrique réalisée sur 5 ans (2015-2019) incluant tous les enfants transférés vers la France métropolitaine. Résultats: 105 enfants ont été inclus. Parmi eux, 66 étaient réunionnais, 17 étaient mahorais et 22 étaient de nationalité étrangère. Des difficultés familiales sont objectivées pour 25.71% des familles. La barrière linguistique reste importante à intégrer puisque 9.52% des familles ne parlent pas français. Des difficultés sociales sont rapportées dans 11.43% des cas, en lien avec la prise en charge de mineurs isolés principalement. Des difficultés médicales ont été retrouvées dans 9.52% des dossiers médicaux. Conclusion: De nombreuses difficultés surviennent en lien avec un éclatement familial et sociétal provoqué par ces transferts. Ces différences et difficultés sont importantes à décrire pour mieux accompagner les familles et les soignants dans cette étape obligatoire du parcours médical de ces enfants originaires de l'Océan Indien.

Sujets : Cancérologie pédiatrique -- Indien, Îles de l'océan

Hématologie pédiatrique -- Indien, Îles de l'océan

Transport sanitaire -- La Réunion (France ; île)

Transport sanitaire -- France

Français (langue) -- Fautes de langage

Économie domestique

Titre : Petite taille à 5 ans des enfants nés grands prématurés avec ou sans restriction de croissance fœtale.

Auteur: Euvrard, Coralie (1992-....)

Directeur de thèse : Pigeon-Kherchiche, Patricia

Spécialité : Pédiatrie

Date: 2021

Nombre de pages : 32

Bibliographie: 57 références

Résumé: Introduction: Les enfants nés petits pour l'âge gestationnel (PAG) à terme et prématurés ont un risque plus important de petite taille que leurs pairs nés eutrophes. La plupart des études concernant le rattrapage statural des enfants nés PAG ne prennent pas en compte le statut de restriction de croissance foetale. Le but de cette étude était de comparer la prévalence de la petite taille à 5 ans des grands prématurés nés avec ou sans restriction de croissance foetale. Méthode : 379 sur 924 grands prématurés nés à la Réunion ont été inclus. Des mesures anthropométriques étaient réalisées à la naissance, 2 ans et 5 ans. La restriction de croissance foetale était définie en utilisant des courbes de croissance individualisées par un poids et/ou une taille de naissance < 5ème percentile. La petite taille était définie par une taille < -2 DS pour l'âge. Résultats : Vingt-cinq pourcent des grands prématurés étaient classés dans le groupe restriction de croissance foetale (FGR). La prévalence de petite taille à 5 ans était de 9.6% dans le groupe FGR et 2.1% dans le groupe non-FGR (p = 0.003). Les enfants du groupe FGR étaient plus petits de 3 cm et plus légers de 2 kg que les enfants du groupe non-FGR et l'IMC était moins élevé de 1 kg/m² (p < 0.001). Le taux de maigreur (IMC < IOTF 18.5 kg/m²) dans le groupe FGR était approximativement de 55%. Conclusion : La plupart des grands prématurés montraient un rattrapage statural avant l'âge de 5 ans. Cependant, la prévalence de la petite taille était plus de 4 fois plus élevée chez les enfants ayant présenté une restriction de croissance foetale par rapport à ceux qui étaient nés eutrophes.

Sujets: Prématurés

Biométrie embryonnaire humaine

Troubles de la croissance

Enfants -- Croissance

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03346394">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03346394</a>

Titre: Étude rétrospective descriptive de la première cohorte pédiatrique de patients opérés pour cardiopathies congénitales et acquises à l'île de la Réunion entre 2015 et 2020.

Auteur : Laforest, Gérald (1991-...) Directeur de thèse : Levy, Yaël

Spécialité: Pédiatrie

Date: 2021

Nombre de pages : 70

Bibliographie : 72 références

**Résumé**: Introduction: Avant 2016, les enfants atteints de cardiopathie acquise ou congénitale à La Réunion et Mayotte étaient systématiquement transférés en métropole pour chirurgie cardiaque ou cathétérisme cardiaque interventionnel. Il en résultait une différence de prise en charge par rapport aux enfants nés en métropole en raison des risques d'un long transfert aérien, de l'éloignement des familles et des coûts des évacuations sanitaires. Depuis fin 2015, des sessions mensuelles de chirurgie cardiaque pédiatrique sont organisées au CHU de La Réunion en partenariat avec le CHU de Bordeaux dans le but de créer le premier centre médicochirurgical cardiopédiatrique de l'Océan Indien. Matériels et méthodes : Les dossiers médicochirurgicaux des patients ≤ 18 ans opérés pour cardiopathies congénitales ou acquises au CHU de La Réunion, entre 2015 et 2020, ont été examinés. Résultats : Au total, 96 enfants ont été opérés. L'âge moyen était de 7,4 ans. 16,7 % étaient des nourrissons. La principale cardiopathie congénitale était la communication interauriculaire (24 %). La principale cardiopathie acquise était la cardiopathie rhumatismale (7,3 %). Le score médian d'Aristote était de 6. Tous les patients ont bénéficié d'une chirurgie curative. 87,5 % avec CEC. 20 patients ont présenté des complications majeures: insuffisance rénale aiguë dialysée (2 %), ECMO (2 %), réintervention en urgence (10,4 %), pneumothorax (5,2 %), choc septique (2 %), choc hémorragique (3,1 %), fibrillation ventriculaire (1 %). Une CEC ≥120 minutes était associée à une hospitalisation prolongée, une insuffisance rénale aiguë et aux infections. La durée médiane d'hospitalisation totale et en réanimation était respectivement de 7 jours [6-12] et de 3 jours [2-4]. Le taux de mortalité était de 2 %. La survie à 6 mois était de 97 %. Conclusion : L'analyse de cette cohorte d'enfants opérés, de la zone Océan Indien, montre que la chirurgie cardiaque pédiatrique est possible et sûre au CHU de La Réunion avec des résultats favorables et une faible morbimortalité.

Sujets: Coeur -- Malformations -- Chez l'enfant

Maladies cardiovasculaires -- Chez l'enfant

Coeur -- Chirurgie -- Chez l'enfant

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03430366">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03430366</a>

Titre : Diagnostic échographique des pneumopathies acquises sous ventilation mécanique en réanimation pédiatrique.

Auteur : Uguen, Justine (1989-....) Directeur de thèse : Peipoch, Lise

Spécialité : Pédiatrie

Date: 2021

Nombre de pages : 37

Bibliographie: 62 références

Résumé: Introduction: Les pneumopathies acquises sous ventilation mécanique (PAVM) sont une cause fréquente d'infection nosocomiale en réanimation pédiatrique avec majoration de la morbi-mortalité. L'échographie pulmonaire (EP) a prouvé son intérêt dans le diagnostic des pneumopathies communautaires de l'enfant et dans les PAVM de d'adulte. L'objectif de cette étude est d'évaluer les performances de l'EP dans le diagnostic des PAVM en réanimation pédiatrique (RP). Méthode : Étude mono-centrique prospective réalisée en RP au CHU Saint Denis à La Réunion. Tout patient mineur admis en RP, ventilé depuis plus de 48 heures entre le 1er Novembre 2018 et le 31 Juillet 2020 a été inclus. Une EP a été réalisée quotidiennement et a été comparée au diagnostic de PAVM par le score clinico-radiologique CDC 2018 identifié comme le gold-standard. Résultats : Cinquante-sept patients ont été inclus avec un âge médian de 8 mois. Dix-neuf patients ont développé une PAVM et parmi eux, 9 (47%) ont eu une confirmation microbiologique. L'incidence était de 18,0 [IC 95% 10,8-28,1] PAVM /1000 jours de ventilation. Le signe le plus spécifique était le bronchogramme aérien dynamique (DAB) (94,1 [90.8-96.5] %). La précision diagnostique a été améliorée par l'association de l'EP avec la clinique: le DAB avait respectivement des valeurs prédictives positives et négatives de 80 [28.4-99.5] %, et 96 [93.1-97.9] % et les lignes B, une sensibilité et spécificité de 100 [79.4-100] % et 95.5 [92.4-97.6] %. La présence simultanée de la clinique, de la culture microbiologique et du DAB associée aux consolidations sous-pleurales avait 66,7 [9.2-99.2] % de valeur prédictive positive et 98 [95.7-99.3] % de valeur prédictive négative. Conclusion : Le DAB est le signe échographique le plus performant pour le diagnostic des PAVM de l'enfant associé à un score clinique et à la culture microbiologique.

Sujets: Réanimation en pédiatrie

Poumon -- Maladies -- Chez l'enfant

Appareil respiratoire -- Échographie -- Chez l'enfant

Thorax -- Radiographie -- Chez l'enfant

Respirateurs médicaux -- Chez l'enfant

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03195810">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03195810</a>

### **PNEUMOLOGIE**

Titre : Survie et caractéristiques épidémiologiques des femmes atteintes de cancer pulmonaire à La Réunion.

Auteur : Kienlen, Aurélie (1993-....) Directeur de thèse : Huchot, Eric

Spécialité : Pneumologie

Date: 2020

Nombre de pages: 42

Bibliographie: 77 références

Résumé : Le cancer pulmonaire est une pathologie fréquente dans le monde, représentant la première cause de décès par cancer. Son incidence chez les femmes augmente en France métropolitaine et à La Réunion, le principal facteur de risque reste le tabac. Cependant des facteurs environnementaux, génétiques et hormonaux sembleraient jouer un rôle dans l'oncogenèse bronchique et la survie des femmes serait meilleure que celle des hommes. Nous avons étudié la survie et les caractéristiques d'une cohorte rétrospective à La Réunion diagnostiqués d'un cancer pulmonaire entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018. 501 patients ont été inclus dont 166 femmes. La médiane de survie globale était de 23 mois chez les femmes contre 11 mois chez les hommes (p<0,0005). Le sexe féminin a été identifiée comme facteur de bon pronostic sur la survie globale (HR=1,338 ; IC à 95%=1,007-1,778) indépendamment du stade. Les femmes étaient moins souvent fumeuses, 85,4% d'entre elles présentaient un adénocarcinome avec plus de mutations de l'EGFR que les hommes et leurs expositions environnementales étaient moindres. La population féminine réunionnaise de notre étude présentait donc une meilleure survie globale que les hommes. Le statut tabagique, les expositions environnementales, les caractéristiques histologiques et moléculaires variaient selon le sexe.

Sujets: Poumon -- Cancer -- Femmes -- La Réunion (France; île)

Poumon -- Cancer -- Facteurs de risque

Poumon -- Cancer -- Épidémiologie

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02995104">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02995104</a>

Titre : Le dosage des micro-ARNs plasmatiques pour améliorer le diagnostic des nodules pulmonaire.

Auteur : Morellec, Laura (1989-....)

Directeur de thèse : Mazières, Julien

Spécialité : Pneumologie

Date: 2020

Nombre de pages : 60

Bibliographie: 102 références

Résumé: Introduction: La mise au point de biomarqueurs sanguins en complément de l'imagerie thoracique pour améliorer la spécificité du dépistage du cancer bronchique est aujourd'hui l'objet de nombreuses études. Les micro-ARNs (ou miARNs) sont de petits ARNs simple brin non codants qui régulent l'expression génique et sont impliqués dans de nombreux processus cellulaires. Leur expression a été retrouvée dérégulée dans divers cancers. Notre étude s'intéresse à l'utilisation des miARNs plasmatiques comme biomarqueurs sanguins potentiels dans le cancer bronchique. L'objectif principal est d'évaluer la reproductibilité du dosage plasmatique de 42 miARNs d'intérêt. L'objectif secondaire est d'analyser la capacité des miARNs à distinguer les patients porteurs d'un nodule malin de ceux porteurs d'un nodule bénin. Méthodes : Il s'agit d'une étude bicentrique, prospective. Les patients porteurs d'un nodule pulmonaire dont la malignité reste à prouver sont inclus et suivis pendant au moins un an ou jusqu'au moment du diagnostic histologique. La quantification des miARNs est réalisée par RTqPCR. La reproductibilité est estimée tout d'abord par une analyse intra-observateur puis par une analyse inter-observateurs et inter-laboratoires. Résultats : Les échantillons plasmatiques de 90 patients ont été analysés. Parmi les 42 miARNs sélectionnés, le coefficient de corrélation intra-classe évaluant la reproductibilité intraobservateur était supérieur à 80% pour 24 miARNs. Le statut nodulaire de 60 patients a été déterminé (27 nodules nodules malin, 33 nodules bénins). Les miARN-148a-3p et miARN-2103p ont été retrouvés surexprimés de façon significative chez les patients porteurs d'un nodule malin (p=0,004 et p=0,009 respectivement) par rapport à ceux porteurs d'un nodule bénin. Les AUC des courbes ROC pour discriminer les nodules malins des nodules bénins étaient de 0,72 pour le miARN-148a-3p (IC à 95% [59,2 – 85,6]) et de 0,69 pour le miARN-210-3p (IC à 95% [56,2 – 82,8]). Conclusion : Les analyses de reproductibilité intra-observateur sont satisfaisantes. Elles doivent cependant être complétées par des mesures de reproductibilité inter-observateurs et interlaboratoires, en cours. Nos résultats suggèrent que les miARN-148a-3p et miARN-210-3p pourraient être de potentiels biomarqueurs pour la détection précoce du cancer bronchique. Ceci devra être confirmé par une étude de plus grande ampleur, multicentrique.

**Sujets :** Poumon -- Cancer -- Dépistage

MicroARN

Physiopathologie

Lien vers la ressource : Intranet de l'Université (accès restreint)

Titre: Facteurs prédictifs de réponse au décubitus ventral chez les patients atteints d'un syndrome de détresse respiratoire aiguë sévère lié à la Covid-19.

**Auteur :** Gabenesch, Matthieu (1993-....) **Directeur de thèse :** Timsit, Jean-François

Spécialité : Pneumologie

Date: 2021

Nombre de pages : 48

Bibliographie: 74 références

**Résumé**: Contexte: Les effets sur l'hématose du décubitus ventral (DV) dans les formes sévères de Syndrome détresse respiratoire aiguë (SDRA) sont connues. Cependant, le SDRA induit par la Covid-19 (coronavirus disease 2019) semble présenter des caractéristiques différentes du SDRA « classique ». Objectif : Déterminer les facteurs prédictifs de réponse dans le SDRA lié à la Covid-19. Rechercher une association entre réponse et mortalité à J60. Patients : 43 patients avec un SDRA sévère induit par la Covid-19 (avec un ratio PaO2/FiO2 < 150 mmHg). Matériel et méthode: Etude prospective monocentrique au sein de la Réanimation médicale et infectieuse de l'hôpital Bichat-Claude-Bernard. Les caractéristiques cliniques, de mécanique ventilatoire et les gaz du sang ont été analysés à l'admission et à chaque séance de DV. La réponse était définie comme: [(PaO2/FiO2après DV – PaO2/FiO2 avant DV) / PaO2/FiO2 avant DV] X 100. Un modèle de régression négative binomiale a été utilisé pour évaluer les facteurs prédictifs de réponse. Résultats: La réponse médiane des 137 séances de DV analysées était de 46.96 % [8.22; 125.7]. Un socre SOFA extra-respiratoire haut la diminuait, tandis que l'obésité, la charge virale faible et une compliance respiratoire (Crs) pré-séance de DV comprise entre 25 et 30 ml/cmH2O l'augmentaient. L'obésité était un facteur indépendant de bonne réponse et une Crs préséance < 25ml/cmH2O de réponse basse. La mortalité à J60 était de 77.4% et la réponse n'était pas prédictive de celle-ci. Conclusion : Dans le SDRA induit par la Covid-19, l'obésité augmente la réponse et une compliance sévèrement altérée la baisse. La réponse n'est pas associée à la mortalité J60.

Sujets: Covid-19

SARS-CoV-2 (virus)

Syndrome de détresse respiratoire aiguë de l'adulte

Décubitus

Respiration artificielle

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03426407">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03426407</a>

Titre : Épidémiologie de la tuberculose et sensibilité aux antituberculeux à La Réunion de 2014 à 2018.

Auteur : Moreea, Loukman (1992-....) Directeur de thèse : Allou, Nathalie

Spécialité : Pneumologie

Date: 2021

Nombre de pages : 70

Bibliographie: 53 références

**Résumé** : Introduction : La tuberculose est le premier agent infectieux mortel au monde avec 1,2 million de décès annuels pour 10 millions de cas. L'épidémiologie de la tuberculose et de ses résistances est mal connue à La Réunion, au coeur de flux migratoires de territoires de l'Océan Indien de forte endémie. Méthodes : Nous avons effectué une étude observationnelle rétrospective des cas de tuberculose maladie à La Réunion entre 2014 et 2018. Ont été analysé les caractéristiques épidémiologiques, démographiques, microbiologiques, cliniques et sociales. Résultats : 265 cas de tuberculose-maladie ont été recensés sur la période, soit une incidence de 6,2/100 000 habitants. 114 patients (43%) sont nés ou ont résidé > 6 mois dans le reste de la zone Océan Indien. Le risque d'infection est augmenté si naissance à Madagascar (OR 23,5), aux Comores (OR 8,9) ou à Mayotte (OR 6,8). La prévalence de la co-infection VIH est faible (2,5%). On compte 31 cas (14,4%) de résistance aux antituberculeux dont 3 (1,4%) de tuberculose multirésistante et 0 cas de tuberculose ultrarésistante. Le sexe féminin (61,3% des résistants) et le diabète (30 % des résistants) sont associés à la résistance. Le taux de résistance n'était pas significativement différent en fonction de l'origine géographique. Conclusion : Il s'agit de la première étude épidémiologique exhaustive de la tuberculose à La Réunion. L'incidence y est relativement faible mais accrue pour les personnes en lien avec les îles voisines, notamment Madagascar. La prévalence de multirésistance est faible, sans surrisque associé chez les patients issus de la zone Océan Indien.

Sujets: Tuberculose -- Épidémiologie -- La Réunion (France; île)

Tuberculose multirésistante -- La Réunion (France ; île)

Titre: Grippes graves prises en charge en réanimation à la Réunion de 2010 à

2019.

Auteur : Verdier, Victor (1992-....)

Directeur de thèse : Paganin, Fabrice

Spécialité : Pneumologie

Date: 2021

Nombre de pages : 62

Bibliographie: 78 références

**Résumé**: Introduction: Les formes sévères de grippe nécessitant une admission en réanimation restent un problème de santé publique en raison de leur forte mortalité et de la pression qu'elles exercent sur les hôpitaux. Ce travail présente une large série de patients pris en charge en réanimation pour une infection grippale au cours de la dernière décennie. Méthode : Il s'agit d'une étude rétrospective des patients admis pour une grippe sévère en réanimation entre le 1er janvier 2010 et 31 décembre 2019 à la Réunion. Les données des patients, leurs comorbidités et les données relatives à la prise en charge en réanimation ont été recueillies. Une analyse univariée puis multivariée ont été réalisées afin de déterminer les facteurs de risque de mortalité en réanimation. Résultats : Les données de 350 patients adultes ont été analysées. La mortalité globale était de 25,1%. L'âge supérieur à 65 ans était le seul facteur indépendant de mortalité en réanimation. L'antécédent de cancer, la présence d'une coinfection bactérienne, le recours à l'intubation, l'intubation dans les 48 premières heures de la prise en charge, le syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA), l'utilisation d'amines vasoactives, l'implantation de l'ECMO, l'initiation d'une dialyse, la leucopénie, l'anémie et la thrombopénie étaient des facteurs des facteurs de risque de mortalité en réanimation en analyse univariée. De plus, l'utilisation d'oseltamivir et l'asthme étaient des facteurs protecteurs en analyse univariée. Conclusion : Les comorbidités des patients qui représentent des facteurs de risque d'hospitalisation et d'admission en réanimation en cas de grippe n'ont pas été retrouvées comme facteurs de risque de mortalité en réanimation dans cette étude à l'exception de l'âge supérieur à 65 ans. L'atteinte respiratoire des patients était en premier plan avec un recours fréquent à la ventilation mécanique. Il convient donc de prendre en charge rapidement ces patients en réanimation lorsqu'ils présentent une atteinte respiratoire sévère avec une introduction rapide de l'oseltamivir et des antibiotiques en cas de coinfection bactérienne.

Sujets: Grippe -- Complications (médecine) -- La Réunion (France; île)

Manifestations pulmonaires des maladies -- La Réunion (France ; île)

Réanimation cardiorespiratoire -- La Réunion (France ; île)

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03578335">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03578335</a>

## **PSYCHIATRIE**

Titre: Marqueurs biologiques et cliniques associés à la composition membranaire érythrocytaire en acide gras poly-insaturés dans une population ambulatoire de patients schizophrènes traités et stabilisés.

Auteur : Bosc, Nicolas (1976-....)

Directeur de thèse : Nuss, Philippe

Spécialité: Psychiatrie

Date: 2020

Nombre de pages : 224

Bibliographie: 329 références

Résumé: Introduction: différents biomarqueurs candidats ont été proposés dans la schizophrénie pour mieux caractériser les différentes formes du trouble. Parmi ces biomarqueurs, des facteurs périphériques (par exemple immunologiques, inflammatoires, microbiens) et cérébraux (structurels et fonctionnels) ont été suggérés et pourraient aider à sous-typer la schizophrénie. Un autre biomarqueur potentiel, la teneur en acides gras polyinsaturés membranaires (AGPI), a été étudié à la fois dans les cellules périphériques et les membranes cérébrales des patients. Une augmentation de la sévérité des symptômes associée à une altération cognitive plus sévère s'est avérée associée à une diminution de la teneur en sphingomyéline et en AGPI de la membrane érythrocytaire. Cependant, on sait peu de choses sur l'association entre ce biomarqueur membranaire et ceux liés au sérum.Les résultats présentés ici sont préliminaires et proviennent d'une étude examinant les symptômes cliniques et cognitifs, la teneur totale en acides gras membranaires érythrocytaires et les biomarqueurs sériques dans une population de patients schizophrènes. Nous avons émis l'hypothèse que le sous-groupe de patients avec une teneur réduite en AGPI membranaire présentera également une incidence plus élevée d'anomalies dans certains autres biomarqueurs sériques ou cliniques par rapport aux patients avec une teneur en AGPI membranaire normale. Méthode : Une population de 37 patients atteints de schizophrénie, traités et cliniquement stables a donné son consentement éclairé pour l'examen de leurs antécédents médicaux, psychiatriques et thérapeutiques. Les autres mesures évaluaient la psychopathologie (PANSS, CGI, échelle de Calgary), le fonctionnement et la qualité de vie (GAF, SF36) et la 220 cognition (MOCA, MCST). Divers biomarqueurs biologiques - en particulier ceux liés à l'inflammation, à l'immunité, à l'énergie et au métabolisme hormonal - ont également été examinés. La teneur totale en acides gras membranaires de la membrane des érythrocytes a également été mesurée en utilisant le GC-FID (Chromatographie en phase gazeuse avec détection par ionisation de flamme). Résultats : Sur la base des valeurs standards de l'acide docosahexaénoïque (DHA) (exprimée en pourcentage des acides gras totaux) dans la membrane lipidique des globules rouges, un sousgroupe de 19 patients a présenté une diminution anormale de la teneur en DHA (DHA-), tandis que les 18 autres présentaient une valeur DHA normale (DHAn). Les groupes DHA- et DHAn ont été comparés au niveau des caractéristiques cliniques et biologiques en utilisant une analyse univariée. Nous avons également pu démontrer une diminution des AGPI membranaires totaux dans le groupe DHA- (p=0.004). Il est intéressant de noter que l'IL-6 sérique était

significativement augmentée (p=0.02) dans la population DHA-, ainsi que le taux de cortisol (p=0.04). De plus, le groupe DHA- a eu significativement (p=0.02) plus d'hospitalisations depuis le début du trouble, une perception de la santé générale (p=0.05), et santé physique (p=0.03) de plus mauvaise qualité, des relations sociales plus pauvres (p=0.06). Parallèlement, les résultats concernant la durée de psychose nontraitée bien que non-significatifs statistiquement, ont montré une valeur indicative intéressante à savoir une durée de psychose non-traitée plus longue dans le sous-groupe DHA-.Conclusion : Les données présentées confirment des résultats précédemment obtenus par d'autres études montrant une diminution en DHA dans la membrane érythrocytaire dans un sousgroupe de patients schizophrènes. Il est intéressant de noter que les patients présentant une teneur inférieure en DHA dans la membrane érythrocytaire présentaient également des anomalies dans d'autres biomarqueurs connus décrits dans la schizophrénie, telles qu'une inflammation accrue et une plus grande sévérité de la maladie au niveau clinique. Dans l'ensemble, ces résultats, bien que préliminaires, ouvrent la voie à l'identification de biotypes de patients et potentiellement de sous-types de schizophrénie.

Sujets: Schizophrénie

Transmission nerveuse

Marqueurs biologiques

Acides gras insaturés

Lien vers la ressource : Intranet de l'Université (accès restreint)

Titre : Communiquer un diagnostic de schizophrénie aujourd'hui : une revue systématisée de la littérature.

Auteur: Moreno, Rachel (1992-....)

Directeur de thèse : Blum, Laurent (1978-....)

Spécialité : Psychiatrie

Date: 2020

Nombre de pages: 82

Bibliographie: 150 références

Résumé: Introduction: L'annonce diagnostique de la schizophrénie est un sujet d'actualité pour lequel il n'existe pas de recommandation spécifique. A travers une revue de la littérature scientifique systématisée récente, nationale et internationale, notre travail tente de faire le point sur la pratique de cette annonce, afin de proposer des recommandations. Méthode : Les 17 articles sélectionnés, publiés de 2009 à 2020, en français, anglais ou espagnol, ont été recherchés dans les bases de données MEDLINE, Science Direct, complété par Google Scholar. Résultats: Nos résultats montrent que l'annonce est inconstante (réalisée dans 13.5 à 39% en France selon les études), incomplète, freinée par de nombreuses craintes du psychiatre, attendue par les patients, et généralement mal vécue par les deux. Le terme de schizophrénie n'y est pas systématique. À l'étranger, des équipes recommandent l'utilisation de modèles d'annonce de cancérologie (SPIKES), d'autres s'en inspirent et développent des programmes de formation basés sur des simulations (Compsych). Discussion : La schizophrénie se démarque : elle n'est pas un diagnostic de certitude, son annonce est complexifiée par les troubles cognitifs et de l'insight des patients , son nom est hautement stigmatisé. Conclusion : Nous recommandons la mise en place d'une conférence de consensus, d'une nouvelle analyse de pratique, avec en parallèle, une formation théorique (déontologique, législative, éthique) et pratique (par simulations) de l'annonce aux internes de psychiatrie. À l'issue de ce travail, nous proposons un guide pratique d'annonce diagnostique de schizophrénie destiné aux internes de psychiatrie.

Sujets: Schizophrénie

Relations médecin-patient

Annonce d'une maladie

Maladies mentales -- Diagnostic

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03128090">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03128090</a>

Titre: L'expérience d'une souffrance par le corps à l'adolescence.

Auteur: Merlo, Médérick (1992-....)

Directeur de thèse : Ludot Gégoire, Maude

Spécialité : Psychiatrie

Date: 2021

Nombre de pages : 50

Bibliographie : 37 références

Résumé : Introduction : La souffrance par le corps et sa résonance psychique est vecteur de questionnements depuis longtemps ; une récente revue de la littérature décrit une difficulté nosographique dans le domaine médical qui rend ces troubles compliqués à expliquer. L'adolescence est une période de développement particulière, notamment corporelle mais aussi psychique. L'objectif de cette étude est d'étudier le vécu d'adolescents présentant une souffrance corporelle en lien avec des difficultés psychiques. Méthode: Nous avons constitué une population d'adolescents présentant des troubles à symptomatologie somatique et dérivés, issus du DSM 5. Les participants ont été inclus dans un service de médecine de l'adolescent parisien: « La Maison de Solenn », ils étaient alors dans le circuit de soins de la structure. Chaque adolescent a été interrogé lors d'un entretien semi-dirigé d'environ une heure, avec pour médiation la photo-élicitation. Puis les retranscriptions de ces différents entretiens ont été analysées de manière longitudinale et ensuite transversale, suivant la méthodologie qualitative de l'IPA: Interpretative Phenomenological Analysis. Résultats: Une population de dix adolescentes a été étudiée. Trois méta-thèmes ont émergé de cette étude: un méta thème « on ne me croit pas » concernant la non croyance et l'incompréhension du corps médical comme des pairs et de l'entourage; un autre méta thème « pourquoi mon jeune corps souffre autant? » mettant en lumière les difficultés au quotidien et le handicap vécu dans leur développement adolescent et enfin un autre méta-thème « ce qui m'arrive est un mystère » qui objective une recherche d'explication sur ce ressenti corporel intime et une recherche d'explication médicale. Conclusion: Ces troubles sont très mystérieux pour les adolescents, leurs familles et la médecine, ce qui entraine un nomadisme médical compliqué pour ces adolescents qui ne trouvent pas de réponses concrètes à une difficulté qui les empêche au quotidien dans leur développement adolescent.

**Sujets:** Souffrance -- Chez l'adolescent

Douleur -- Chez l'adolescent

Adolescents -- Psychiatrie

Adolescence

Troubles à symptomatologie somatique -- Chez l'adolescent

Adolescents dépressifs

Titre : Scoping review des outils de dépistage des conduites suicidaires des adolescents en milieu carcéral.

Auteur : Miranne Guivarc'h, Adrien (1992-....) Directeur de thèse : Spodenkiewicz, Michel

Spécialité : Psychiatrie

Date: 2021

Nombre de pages : 46

Bibliographie: 62 références

Résumé: Introduction: plusieurs études récentes ont montré que la santé mentale des adolescents incarcérés est plus dégradée que celle de la population générale du même âge. Les conduites suicidaires restent fréquentes au sein des prisons pour mineurs malgré une surveillance étroite. Notre étude propose de faire un état des lieux des outils de dépistage des conduites suicidaires d'adolescents incarcérés et de discuter de la pertinence de leur systématisation. Méthode : cette scoping review a utilisé les articles issus de la revue de la littérature de Borschmann et collaborateurs publiée en 2020, complétée secondairement par des recherches sur Pubmed/Embase et Google Scholar. Nous avons sélectionné des articles relatifs à des études ayant eu recours à au moins un outil de dépistage des conduites suicidaires d'adolescents incarcérés. Résultats : 25 articles ont été sélectionnés pour l'analyse des données. Parmi eux, nous avons identifié plusieurs outils de dépistage de conduites suicidaires d'adolescents incarcérés avec mis en exergue l'intérêt du Massachusetts Youth Screening Instrument. Nous avons également présenté les principales comorbidités associées au risque suicidaire dans cette population comme la toxicomanie et l'exposition traumatique. Conclusion : la systématisation d'un outil de dépistage du risque suicidaire et des autres comorbidités psychiatriques associées apparait primordial pour mieux repérer et prévenir les tentatives de suicides de ces adolescents à risque. Par ailleurs, au-delà d'un simple outil, des réévaluations régulières par des professionnels qualifiés et une bonne communication entre les différents services travaillant auprès de ces jeunes et leur famille s'avèrent primordiaux au vu de la vulnérabilité pédopsychiatrique de ces adolescents.

Sujets: Prisonniers -- Comportement suicidaire -- Chez l'adolescent

Comportement suicidaire -- Chez l'adolescent -- Prévention

Suicide -- Prévention -- Chez l'adolescent

Titre: L'expérience du confinement à La Réunion: étude qualitative.

Auteur: Roche, Margot (1993-....)

Directeur de thèse : Spodenkiewicz, Michel

Spécialité: Psychiatrie

Date: 2021

Nombre de pages : 61

Bibliographie : 50 références

Résumé: Introduction: Comment le confinement a-t-il été vécu par la population réunionnaise ? Il s'agit d'en saisir les retentissements, sous l'angle de la santé psychique des individus, et son impact potentiel à court et long terme. Méthode : étude qualitative de 15 participants volontaires ayant répondu à un questionnaire en ligne (CONFINAOU). Le recueil des données a été réalisé par des entretiens semi-directifs jusqu'à saturation des données. Les résultats ont été soumis à une analyse phénoménologique interprétative. Résultats : Les thématiques issues de l'analyse s'articulent autour de trois méta-thèmes d'expériences principales : - La transformation des relations pendant le confinement, à la fois à l'intérieur du domicile et des relations de proximité, mais également l'évolution de la perception plus globale des autres - La forte empreinte émotionnelle du confinement par sa dimension brutale et angoissante ainsi que la participation de facteurs externes (médias, réglementations) et leurs retentissements psychologiques ; - L'inscription dans le temps et l'espace à travers les stratégies et activités développées pendant cette période, et modification de la temporalité ressentie. Conclusion : nous avons montré en quoi le confinement est une période de vie potentialisant de nombreux facteurs de stress, avec une diversité des réactions et des vécus s'inscrivant dans une réalité commune.

**Sujets :** Stress -- Aspect psychologique -- La Réunion (France ; île)

Covid-19 -- Aspect médical -- La Réunion (France ; île)

Covid-19 -- Aspect social -- La Réunion (France ; île)

Confinement (politique sanitaire) -- La Réunion (France ; île)

Titre : Electroconvulsivothérapie et anticoagulants : étude naturalistique observationnelle.

Auteur: Saddiki, Salim (1994-....)

Directeurs de thèse : Sauvaget-Oiry, Anne ; Bulteau, Samuel

Spécialité: Psychiatrie

Date: 2021

Nombre de pages : 25

Bibliographie : 35 références

Résumé: L'usage concomitant aux ECT de traitements anticoagulants pourrait majorer le risque hémorragique supposé de l'ECT. Il constitue une contre-indication relative au traitement par ECT. Étude naturalistique observationnelle monocentrique, réalisée au CHU de Nantes, évaluant 38 patients inclus, ayant bénéficié d'ECT entre 2016 et 2020 et prenant de manière concomitante un traitement anticoagulant et/ou antiagrégant plaquettaire. Aucun accident hémorragique grave, en particulier cérébral n'a été relevé. Deux saignements spontanément résolutifs ont été observés chez deux patients durant leur cure d'ECT. Parallèlement, malgré la prise d'un traitement adapté, quatre événements thromboemboliques ont pu être identifiés dans cette étude.

**Sujets**: Électrochoc

Anticoagulants

Dépression -- Thérapeutique

# UROLOGIE

Titre : Étude des facteurs de risque prédictifs de complications post opératoires après cystectomie pour cancer.

Auteur : Le Quellec, Antoine (1990-....) Directeur de thèse : Pignot, Géraldine

Spécialité: Urologie

Date: 2021

Nombre de pages : 51

Bibliographie: 40 références

Résumé : Introduction : La cystectomie est le traitement de référence des tumeurs de vessie infiltrant le muscle. Elle est associée à une morbidité importante. L'objectif de l'étude est d'identifier des facteurs prédictifs de complications post-opératoires. Méthode : Il s'agit d'une étude rétrospective monocentrique portant sur 205 patients opérés d'une cystectomie entre janvier 2015 et octobre 2020. Les données cliniques pré-opératoires et les complications postopératoires précoces (pendant l'hospitalisation) et tardives (entre la sortie d'hospitalisation et 90 jours post-opératoires) ont été recueillies et gradées selon la classification de Clavien-Dindo (majeures si grade III-V). Les facteurs prédictifs de complications identifiés en univariée ont été inclus dans une analyse multivariée. Résultats : Le taux de complications post-opératoires précoces était de 69,8 %. Un score de Charlson ≥ 3 était prédictif de survenue de complications précoces (p=0,041). Concernant les complications majeures (15,6%), les facteurs prédictifs étaient un IMC  $\geq$  35 (p=0,015), un traitement anti-thrombotique (p=0,008). Concernant les complications tardives majeures (18,5%), les facteurs prédictifs significatifs étaient les antécédents cardio-vasculaires (p=0,023). En analyse multivariée, l'IMC ≥ 35 (p=0,021) et la prise d'anti-thrombotiques (p=0,023) étaient des facteurs indépendants associés à la survenue d'une complication précoce majeure. Conclusion : Les facteurs prédictifs de complications sont essentiellement dépendants des comorbidités. L'identification de ces facteurs en préopératoire, peut permettre d'optimiser notre prise en charge par la mise en place de protocoles de pré-habilitation.

Sujets: Cystectomie

Appareil urinaire -- Chirurgie

Tumeurs de la vessie urinaire

Abdomen -- Chirurgie

Complications chirurgicales

Lien vers la ressource : <a href="https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03462730">https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03462730</a>

Titre : Description des délais de prise en charge des cancers de la prostate en pratique courante aux CHU de Bordeaux et de La Réunion.

Auteur : Lonca, Laëtitia (1992-....) Directeur de thèse : Bladou, Franck

Spécialité: Urologie

Date: 2021

Nombre de pages : 70

Bibliographie : 40 références

Résumé: Introduction: Plusieurs travaux confirment que les délais avant prise e n charge du cancer de la prostate (CaP) pourraient avoir un impact pronostic, en particulier pour les formes agressives. L'objectif de ce travail était de décrire les délais observés entre le dosage initial du PSA (PSAi) et les différentes étapes de la prise en charge jusqu'à la mise en œuvre du traitement. Méthode : Une étude rétrospective bicentrique a été conduite aux CHU de Bordeaux et de La Réunion à partir de dossiers discutés en réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) entre le 1er août 2019 et le 1er avril 2020. Ont été inclus tous les nouveaux diagnostics de CaP discutés en vue de l'initiation d'un traitement au sein de l'établissement. Ont été exclus les découvertes fortuites sur anatomopathologie d'adénomectomie, les récidives ou les avis donnés pour des patients pris en charge dans d'autres établissements. Les caractéristiques de la population ont été recueillies ainsi que les dates clef de la prise en charge : dosage de PSA anormal ayant initié l'enquête étiologique (PSAi), examens réal isés (IRM), première consultation d'urologie, biopsie prostatique, discussion en RCP, début du traitement. Résultats : 156 patients ont été inclus, 125 provenaient de la cohorte bordelaise et 31 de la cohorte réunionnaise. Les caractéristiques des patients et des CaP sont détaillées dans le tableau 1 . Les délais médians entre le PSAi et les différentes étapes de la prise en charge figurent dans le tableau 2. 65% des patients étaient adressés par leur médecin traitant et 43% avaient une IRM prostatique avant la consultation spécialisée au CHU. Les délais de prise en charge n'étaient pas significativement différents en fonction du score ISUP. Une différence significative était retrouvée pour un taux de PSAi supérieur à 20 ng/mL (p = 0,01) et un toucher rectal normal (p=0,008). Parmi les différentes étapes du parcours de soin étudiées, les délais les plus longs étaient générés par la réalisation d'une IRM avec un délai médian de 46 jours (12187). Conclusion : Les délais de prise en charge des patients ayant u n primo diagnostic de CaP apparaissent variables et perfectibles avec un délai médian entre le PSAi et le début du traitement de 151 jours quel que soit l'ISUP. L'optimisation des différents délais, notamment l'obtention de l'IRM et du traitement en fonction de l'agressivité tumorale, permettrait d'améliorer le parcours de soin des patients.

Sujets: Prostate -- Cancer -- Dépistage

Antigène spécifique de la prostate

Imagerie par résonance magnétique

## INDEX

#### Α

Abdomen -- Chirurgie, 157, 233

Accident vasculaire cérébral, 189

Accouchement, 169, 170

Accouchement -- Complications (médecine), 173, 177

Acides gras insaturés, 225

Actes administratifs, 67

Adaptation (psychologie), 114

Adolescence, 227

Adolescents, 82, 98, 106

Adolescents -- Psychiatrie, 227

Adolescents dépressifs, 227

Air -- Qualité, 31

Alcoolisme, 75, 89

Algologie (médecine), 152

Alimentation, 81

Allaitement maternel, 35, 108

Allergie respiratoire, 31

Analgésie, 152

Anémie hémolytique, 201

Anesthésie en cardiologie, 144

Anesthésie péridurale, 170

Angine, 18

Annonce d'une maladie, 226

Antiagrégants plaquettaires, 142

Antibiogramme, 110

Antibiothérapie, 43

Antibiotiques, 110

Anticoagulants, 231

Antigène spécifique de la prostate, 234

Anxiété, 96

Appareil respiratoire, 215

Appareil urinaire, 110, 155, 156, 160, 233

Armées -- Services médicaux et sanitaires, 38

Artères carotides, 144

Arthroplastie -- Genou, 151

Articulations -- Maladies, 76

Art-thérapie, 83

Asthme, 31, 138

Atrophie musculaire progressive, 198

Autosurveillance glycémique, 109

Avortement, 82, 185

#### В

Bases militaires, 38

Bibliothérapie, 37

Biométrie embryonnaire humaine, 213

Blessures du thorax, 137

#### C

Cancer, 30, 129

Cancérologie, 174

Cancérologie pédiatrique, 211

Cathétérisme intraveineux -- Technique, 188

Cellules souches, 153

Cellules stromales mésenchymateuses, 153

Certificats médicaux, 80, 85

Césarienne, 173, 178

Cheville (anatomie), 60, 150, 195

Chikungunya, 96

Chimiothérapie anticancéreuse, 176

Chimiothérapie néoadjuvante, 176

Chirurgie gynécologique, 174

Chirurgie orthopédique, 151

Chlamydia trachomatis, 39

Chutes chez la personne âgée, 29

Circulation extracorporelle, 137, 143, 207

Clopidogrel, 142

Coelioscopie, 158

Coeur, 144, 205, 214

Col de l'utérus, **53, 129** 

Col du fémur -- Fractures, 152

Communication en médecine, 82, 102, 123

Communication non verbale, 91

Comorbidité, 178

Complications (médecine), 174

Complications chirurgicales, 155, 174, 233

Comportement suicidaire, 228

Confinement (politique sanitaire), 86, 94, 103, 230

Connaissances, attitudes et pratiques en santé, 57, 64

Consultation à distance, 103

Consultation de prévention, 80, 85, 106

Consultation médicale, 57, 95, 102, 111, 112, 123

Consultation psychiatrique, 105

Continuité des soins, 77, 84

Contraception, 66, 120

Coopération médicale, 105

Coqueluche -- Vaccination, 90

Corps -- Poids -- Régulation, 162

Course en montagne, 46, 100

Course nature, 80, 85

Covid-19, **72**, **77**, **86**, **88**, **94**, **103**, **192**, **220**, **230** 

Coxiella, 20

Créole réunionnais (langue), 95

Cultures cellulaires, 153

Curiethérapie, 186 Cystectomie, 156, 233 Cystite -- Chez l'enfant, 160

D

Décubitus, 220

Déficience intellectuelle, 166

Déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase, 201

Delphi, Méthode, 111

Dengue, **22**, **24**, **113**, **180**, **192** Dépendance à Internet, **98** 

Dépistage, 56, 191

Dépistage génétique, 165 Dépistage néonatal, 89, 148

Dépression, **96**, **231** 

Dérivation gastrique, 154

Déshydratation -- Lutte contre, **24** Désunion anastomotique, **158** 

Diabètes, 63, 94, 109, 163, 200

Diabétiques, 109

Diagnostic clinique, 172

Diagnostic différentiel, 192

Diagnostic préconceptionnel, 165 Diagnostic prénatal, 148, 181, 184

Dispositifs intra-utérins, 66

Domicile, 116

Dossiers médicaux, 121 Douleur, 170, 185, 227

Douleur chronique, 131

Drépanocytose -- Enfants, 209

Droit à la santé, **27** Droit à la vie privée, **49** 

Ε

Échocardiographie, **183**, **205** Échocardiographie Doppler, **144** 

Échographie, 171

Échographie Doppler, 144

Éclampsie, 182

ECMO (médecine), 137, 143, 207 Économie domestique, 211 Éducation -- Évaluation, 102, 123

Éducation des enfants, 33

Éducation des patients, 59, 109, 120

Éducation nutritionnelle -, 81 Éducation physique et sportive, 44

Éducation pour la santé, 47

Effet placebo, 34

Électrocardiographie, 80, 85

Électrochoc, 231

Embolie gazeuse -- Épidémiologie, 141

Émigration et immigration -- Politique publique, 85

Endocrinologie pédiatrique, 200

Endométriose, 172 Endoscopie, 179

Enfants -- Accidents, 190

Enfants -- Croissance, 213

Enfants -- Maladies -- Prévention, 73, 117, 135

Enfants -- Protection, assistance, etc., 79

Enfants -- Violence envers, 79

Enfants diabétiques, **63**, **200** Enfants internautes, **33** 

Enfants maltraités -- Protection, assistance, etc., 79

Enfants obèses, 23, 50

Enfants surdoués, 115

Enseignement médical, 102, 123

Enthésite, 131

Entorses, 195 Environnement -- Qualité, 31

Épidémiologie, 32

Épuisement professionnel, 19

Érythrocytes -- Transfusion -- Enfants, 209

Escherichia coli, 110

Établissements d'hébergement pour personnes âgées

dépendantes, 45

État de stress post-traumatique, 173

Exclusion sociale, 27

F

Facteurs de risque, 155

Femmes enceintes, 78, 90

Femmes nullipares, 66

Femmes victimes de violence, 111

Fibrose, 163

Fièvre -- Chez le nourrisson, 202

Fièvre Q, 20

Foetus, **89**, **181**, **184** 

Formation professionnelle, 81

Fragilité (médecine), 114

Français (langue) -- Fautes de langage, 211

G

Gale, 28

Gastrectomie longitudinale, 154

Gastroplastie, 154

Gels, 171

Genou -- Chirurgie, 151

Gestion de la douleur, 152

Glucose-6-phosphate déshydrogénase, 201

Gonocoque, 68, 92

Goutte (maladie), 131

Grippe -- Complications (médecine), 222

Grossesse, **78**, **114**, **169**, **180** 

Grossesse -- Complications (médecine), 90, 177, 182

Grossesse à haut risque, 169

Gynécologie, 172

Н

Hématologie pédiatrique, 211

Hématome rétroplacentaire, 182

Hémodynamique, 144

Hémorragie, 142 Maladie résiduelle, 147 Maladies cardiovasculaires, 132, 209, 214 Hépatite C, 32, 56 Hernie diaphragmatique, 166 Maladies cérébrovasculaires -- Épidémiologie, 132 Homosexualité -- Facteurs de risque, 92 Maladies chroniques, 26, 109 Hôpitaux -- Services des urgences, 188, 194 Maladies héréditaires, 165, 201 Hôpitaux municipaux, 125 Maladies infectieuses -- Prévention, 39 Hospitalisation, 116 Maladies mentales, 226 Hyperuricémie, 131 Maladies neuromusculaires, 198 Hyponatrémie, 48 Maladies rares, 204 Hypotrophie foetale, 181, 182 Maladies sexuellement transmissibles, 21, 36, 39, 42, 68, 74, 82, 92, 126, 191 Maladies tropicales, 57 Ī Malformations -- Chez la femme enceinte, 177 Îles Éparses de l'océan Indien (France), 38 Manifestations pulmonaires des maladies, 222 Îles Loyauté (Nouvelle-Calédonie), 18, 28 Marqueurs biologiques, 147, 225 Imagerie par résonance magnétique, 234 Mayotte, 47, 54, 58, 70, 81, 90, 132, 148, 201, 202, 209 Imagerie pour le diagnostic, 171 Médecine -- Étude et enseignement, 40, 58 Immunité cellulaire, 176 Médecine -- Pratique, 88, 103, 119 Indice de masse corporelle, 143 Médecine d'urgence, 69, 110, 189, 193, 195 Indien, Îles de l'océan, 211 Médecine en situation d'isolement, 99 Inégalités sociales de santé, 23, 52, 84 Médecine générale, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 49, 51, 54, Infarctus du myocarde, 59 70, 71, 72, 77, 88, 91, 95, 97, 98, 102, 106, 111, 112, Infections à Stenotrophomonas maltophilia, 139 126, 194 Infirmiers libéraux, 130 Médecine légale, 175 Injections, 76 Médecine militaire, 38 Insuffisance cardiaque, 116 Médecine prédictive, 165 Insuffisance rénale chronique, 109 Médecine préventive, 73, 106, 117, 134 Internat (médecine), 58 Médecine scolaire, 73, 117, 135 Internes (médecine), 19, 35, 40, 58, 70, 71, 81, 102, 123 Médecine traditionnelle, 45 Interventions chirurgicales robotisées, 157 Médecines alternatives, 71 Isère (France), 86 Médecins généralistes, 24, 25, 41, 44, 52, 67, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 89, 92, 94, 103, 105, 108, 115, 120, 121, 125 J Médias et enfants, 33, 98 Jeunes adultes, 106 Médiation thérapeutique, 26 Mélanome, 134 MicroARN, 219 Mortalité fœtale, 182 La Diagonale des Fous, 46, 100 Multilinguisme, 95 La Possession (Réunion), 23 Mycoplasma genitalium, 21 La Réunion (France; île), 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 31, 35, 36, 39, 40, 42, 44, 45, 48, 50, 63, 64, 66, 68, 70, Ν 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 85, 88, 89, 92, 94, 96, 97, 99, 100, 102, 103, 106, 108, 113, 117, Neuromyélite optique aiguë, 197 119, 121, 126, 129, 130, 134, 163, 165, 166, 185, 186, Névrite optique, 197 192, 194, 197, 200, 203, 204, 211, 217, 221, 222, 230 Nourrices, 35 Langage par signes, 91 Nourrissons, 202 Leptospiroses, 43, 192 Nouvelle-Calédonie, 43 Leucémie aigüe myéloïde, 146 Noyade, 190 Ligaments -- Chirurgie, 60, 150 Lombalgie, 71 0 Obèses, 143 M Obésité, 154, 162, 168

Obstétriciens, 78

Organes génitaux femelles, 172

Ovaire -- Cancer -- Chirurgie, 174

Mafate, Cirque de (Réunion), 99

Maîtres de stage des universités, 40, 70

Maladie de Charcot-Marie-Tooth, 198

Maisons de santé, 83

226

Papillomavirus humains -- Vaccination, 53
Parcours de soins coordonnés, 91, 116, 125
Parents et enfants, 33, 50

Pathologie, 205

Pauvres -- Soins médicaux, 84

PCR (génétique), 147 Peau, 28, 30, 100, 203 Permanence des soins, 84

Permanences d'accès aux soins de santé, 84

Personnel -- Supervision, 102, 123

Personnes âgées, 45, 125 Pharmacologie clinique, 34

Photographie, 83 Physiopathologie, 219 Phytothérapie, 45 Plantes médicinales, 45

Pneumonie acquise sous ventilation mécanique, 139

Pneumopathie infiltrante diffuse -- Enfants, 208

Politique sanitaire, 23, 44 Polynésie française, 53 Polytraumatisés, 137 Portfolios, 112

Poumon -- Cancer, 217, 219 Poumon -- Maladies, 138, 215

Prématurés, 213

Prescription médicale, 119
Prescription médicamenteuse, 119

Présentation du siège, 178 Présentation foetale, 178

Prévention, 89

Prévention primaire, 56

Prise en charge personnalisée du patient, 29, 84, 128

Prisonniers -- Comportement suicidaire -- Chez

l'adolescent, 228

Prisons, 42

Produits de protection solaire -- Utilisation, 100

Promotion de la santé, 44, 47 Prostate -- Cancer -- Dépistage, 234

Protection de l'information (informatique), 49

Prothèses de genou, 151 Prothèses de hanche, 152 Psychiatrie de liaison, 105 Psychothérapie, 26

R

Rachitisme, 119

Radiographie médicale, 69, 195

Radiologues, 69

Rayonnement solaire, 73, 117, 134
Rayonnement ultraviolet, 73, 100, 117, 134

Réanimation, 139, 142

Réanimation cardiorespiratoire, 138, 222

Réanimation en pédiatrie, 215

Reflux vésicourétéral -- Chez l'enfant, 160 Régulation médicale, 54, 168, 194 Régulation naturelle des naissances, 120

Rein -- Transplantation, 155

Rejet de greffe, 155

Relations interprofessionnelles dans le domaine de la

santé, 105, 188

Relations médecin-patient, 41, 82, 88, 95, 102, 103, 108,

123, 226

Résidents (médecine), 112, 128 Résistance aux antibiotiques, 68 Respirateurs médicaux, 138, 215 Respiration artificielle, 139, 220

Réunion (ouest), 32 Rhizarthrose, 153

Rhumatisme articulaire aigu, 18

Risque, 51

Risques pour la santé, 25, 51

Risques pour la santé -- Communication, 73, 117, 134

Rôle parental, 33, 50, 115

S

Sages-femmes, 78

Saint-Benoît (Réunion), 69

Sang -- Transfusion -- Enfants, 209 Santé publique, 23, 44, 47, 49 SARS-CoV-2 (virus), 192, 220 Schizophrénie, 225, 226

Scintigraphie rénale -- Chez l'enfant, 160

Secret médical, 49 Sécurité sociale, 67, 97 Sein -- Cancer, 176

Sein -- Lésions et blessures, 128

Séries télévisées, 47

Services d'urgence médicale, 54

Sexualité, **41, 126** Sociologie de la santé, **23** Soins centrés sur le patient, **125** Soins de santé primaires, **48, 83, 99, 110** 

Soins de santé primaires -- Renonciation (droit), 27

Soins hospitaliers, 69, 175

Soins intensifs en pneumologie, 138

Soins médicaux, 38 Soins médicaux -- Droit, 27

Soins médicaux -- Évaluation, 105, 188 Soins médicaux ambulatoires, 40, 77, 105

Soins prénatals, 78 Somatropine, 204 Sommeil, 46, 208

Souffrance -- Chez l'adolescent, 227 Sportifs -- Examens médicaux, 80, 86

Staphylocoque doré, 203 Stéatose hépatique, 163

Stérilité, 171

Stérilité féminine, 179 Streptococcus pyogenes, 18 Stress -- Aspect psychologique, 230

Suicide, 64, 228 Surdité, 91

Surpoids, 50, 112, 143 Symptômes, 59 Syndrome d'alcoolisme foetal, 75, 89 Syndrome de détresse respiratoire, 137, 190, 193, 220 Syndromes des apnées du sommeil, 208 Syphilis, 36, 126

T

Télémédecine, 77, 88
Télévision et enfants, 33, 51, 98
Ténodèse, 60, 150
Tératogènes, 180
Terminaux à écran de visualisation, 51
Tests de perméabilité tubaire, 171
Thérapeutique cellulaire, 153
Thorax, 215
Thrombolyse, 189
Ticagrélor, 142
Toulouse (Haute-Garonne), 52
Toxémie gravidique, 182

Toxoplasma gondii, 148
Toxoplasmose -- Chez la femme enceinte, 148

Toxines de staphylocoque doré, 203

Toxoplasmose congénitale -- Dépistage, 148
Transfert d'apprentissage, 188
Transmission nerveuse, 225
Transport sanitaire, 211
Traumatologie, 69
Triage (médecine), 194

Troubles à symptomatologie somatique -- Chez l'adolescent, 227

Troubles de la croissance, 181, 204, 213 Troubles de l'équilibre hydroélectrolytique, 48 Troubles de l'ouïe, 91 Troubles du comportement, 115, 166 Troubles du métabolisme, 163

Troubles moteurs-- Chez l'enfant, 204

Tuberculose -- Épidémiologie, 221 Tuberculose multirésistante, 221 Tumeurs de la vessie urinaire, 157, 233 Tumeurs du rectum, 159 Tumorectomie, 159

U

Urgences en gériatrie, 29, 125 Urgences en médecine générale, 54, 99 Urgences médicales, 29 Urique, Acide, 131 Urostomie, 157 Utérus -- Cancer, 129, 186

٧

Vaccin antigrippal, 130
Vaccin antipapillomavirus -- Chez l'adolescent, 129
Vaccination, 121
Vaccination des enfants, 121
Vaccination des personnes âgées, 57
Variabilité génétique, 166
Ventricule droit, 205
Victimes d'abus sexuels, 175
Viol, 175
Violence conjugale, 25, 111
Violence en milieu scolaire, 61
Violences sexuelles, 61, 175
Virus chikungunya, 96
Virus de la dengue, 180
Vitamines D, 119

Z

Zones sous-médicalisées, 99

Voyages -- Aspect médical, 57, 72





